РЕШЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

Угол в градусах	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
Угол в радианах	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\mathrm{tg}\,\alpha$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	не сущ.	0	не сущ.	0
$\mathrm{ctg}\,\alpha$	не сущ.	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	не сущ.	0	не сущ.

Арккосинус



Арккосинусом числа ***a*** называется такое число (угол) ***t*** из [0;π], что **cos *t* = *a*.**
Причём, | ***a*** |≤ **1**.

arccos(- ***a***) = π- arccos ***a***

Примеры:

1)arccos(-1) **= π**

2)arccos($\frac{\sqrt{3}}{2}$) $= \frac{\pi}{6}$

Арксинус



Арксинусом числа a называется такое число (угол) t из $[-\pi/2;\pi/2]$, что $\sin t = a$.
Причём, $|a| \le 1$.

$$\arcsin(-a) = -\arcsin a$$

Примеры:

$$1)\ \arcsin\frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$$

$$3)\ \arcsin 0 = 0$$

$$2)\ \arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\pi}{4}$$

Арктангенс



Арктангенсом числа ***a*** называется такое число (угол) ***t*** из (-π/2;π/2), что ***tg t = a .***
Причём, ***a*** **Є R.**

arctg(-***a***) = - arctg ***a***

Примеры:

1) arctg√3/3 = π/6

2) arctg(-1) = -π/4

Арккотангенс



Арккотангенсом числа ***a*** называется такое число (угол) **t** из (0;π), что c***tg t = a.***
Причём, ***a*** ЄR .

arcctg(- ***a***) = π – arcctg ***a***

Примеры:

1) arcctg(-1) = 3π/4

2) arcctg√3 = π/6

Формулы корней простейших тригонометрических уравнений

1.cost = *a* , где $|a| \leq 1$

$$\begin{cases} t = arccos a + 2\pi k, k \in Z \\ t = -arccos a + 2\pi k, k \in Z \end{cases}$$

или $t = \pm arccos a + 2\pi k, k \in Z$

Частные случаи

1) cost=0
$t = \pi/2 + \pi k,\ k \in Z$

2) cost=1
$t = 2\pi k,\ k \in Z$

3) cost = -1
$t = \pi + 2\pi k,\ k \in Z$

Формулы корней простейших тригонометрических уравнений

2. $\sin t = a$, где $|a| \le 1$

$$\begin{cases} t = \arcsin a + 2\pi k, k \in Z \\ t = \pi - \arcsin a + 2\pi k, k \in Z \end{cases}$$

или $t = (-1)^k \arcsin a + \pi k, k \in Z$

Частные случаи

1) $\sin t = 0$

$t = \pi k, k \in Z$

2) $\sin t = 1$

$t = \pi/2 + 2\pi k, k \in Z$

3) $\sin t = -1$

$t = -\pi/2 + 2\pi k, k \in Z$

Формулы корней простейших тригонометрических уравнений

3. $tgt = a,\ a \in R$

$t = arctg\ a + \pi k,\ k \in Z$

4. $ctgt = a,\ a \in R$

$t = arcctg\ a + \pi k,\ k \in Z$

Виды тригонометрических уравнений

1.Сводимые к квадратным

Решаются методом введения новой переменной

$$a\cdot\sin^2 x + b\cdot\sin x + c=0$$

Пусть $\sin x = p$, где $|p| \le 1$, тогда $a\cdot p^2 + b\cdot p + c = 0$

Найти корни, вернуться к замене и решить простые уравнения.

Пример. Решить уравнение: $2\cos^2(x+\pi/6) - 3\sin(\pi/3 - x) + 1 = 0$.

Решение. Используя формулы приведения, имеем:

$$2\cos^2(x+\pi/6) - 3\cos(x+\pi/6) + 1 = 0,$$

делаем замену: $\cos(x+\pi/6) = y$, тогда $2y^2 - 3y + 1 = 0$,

находим корни: $y_1 = 1$, $y_2 = 1/2$, откуда следуют два случая:

1). $\cos(x+\pi/6) = 1$, $\quad$ 2). $\cos(x+\pi/6) = 1/2$,

$x + \pi/6 = 2\pi k$, $\qquad$ $x + \pi/6 = \pm\arccos(1/2) + 2\pi n$,

$x_1 = -\pi/6 + 2\pi k$; $\qquad$ $x_2 = \pm\pi/3 - \pi/6 + 2\pi n$.

Виды тригонометрических уравнений

2.Однородные

1)Первой степени:

Решаются делением на cos x (или sinx) и методом введения новой переменной.

a·sinx + b·cosx = 0

Т.к. sinx и cosx одновременно не равны нулю, то разделим обе части уравнения на cosx (или на sinx). Получим: простое уравнение

a·tgx + b = 0 или tgx = m

Пример. Решите уравнение sinx + 2cosx = 0.

Решение: Разделим обе части уравнения на cosx.

Получим $\frac{\sin x}{\cos x} + 2\frac{\cos x}{\cos x} = 0$

$$tgx + 2 = 0$$

$$tgx = -2$$

$$x = -arctg2 + \pi k,\ k \in Z$$

Ответ: $-arctg2 + \pi k,\ k \in Z$

Виды тригонометрических уравнений

2) Однородные уравнения второй степени:

Решаются делением на $\cos^2 x$ (или $\sin^2 x$) и методом введения новой переменной.

$$\mathbf{a\cdot\sin^2 x + b\cdot\sin x\cdot\cos x + c\cdot\cos^2 x = 0}$$

Разделим обе части на $\cos^2 x$. Получим квадратное уравнение:

$$a\cdot tg^2 x + b\cdot tg x + c = 0.$$

П р и м е р . Решить уравнение: $3\sin^2 x + 4\sin x\cdot\cos x + 5\cos^2 x = 2.$

Р е ш е н и е . $3\sin^2 x + 4\sin x\cdot\cos x + 5\cos^2 x = 2\sin^2 x + 2\cos^2 x$,

$\sin^2 x + 4\sin x\cdot\cos x + 3\cos^2 x = 0$,

$tg^2 x + 4\,tg\,x + 3 = 0$, отсюда $y^2 + 4y + 3 = 0$,

корни этого уравнения: $y_1 = -1$, $y_2 = -3$, отсюда

1) $tg\,x = -1$, 2) $tg\,x = -3$,

Ответ: $-\frac{\pi}{4} + \pi k,\ k \in Z;\ -arctg3 + \pi n,\ n \in Z$

Виды тригонометрических уравнений

3. Уравнение вида:

$A \sin x + B \cos x = C.$ $A, B, C \neq 0$

1. $\sin 2x = \sin x$

$2 \sin x \cos x - \sin x = 0$

$\sin x(2 \cos x - 1) = 0$

$\sin x = 0$ или $\cos x = \frac{1}{2}$

$x = \pi k, k \in Z.$ $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k.$

2. $3 \sin x = 2 \cos^2 x$

$2 \sin^2 x + 3 \sin x - 2 = 0$

$\sin x = t$

$2t^2 + 3t - 2 = 0$

$t = \frac{1}{2}$ $t = -2$

$\sin x = \frac{1}{2}$ $\sin x = -2$

$x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in Z.$ Нет решения.

$\sin x + \cos x = 1$.

Р е ш е н и е . Перенесём все члены уравнения влево:

$\sin x + \cos x - 1 = 0$,

$\sin x - 2 \sin^2 (x/2) = 0$,

$2 \sin (x/2) \cdot \cos (x/2) - 2 \sin^2 (x/2) = 0$,

$2 \sin (x/2) \cdot [\cos (x/2) - \sin (x/2)] = 0$,

1). $\sin (x/2) = 0$, $x/2 = \pi k$, $x_1 = 2\pi k$;

2). $\cos (x/2) - \sin (x/2) = 0$, $\tan (x/2) = 1$, $x/2 = \arctan 1 + \pi n$, $x/2 = \pi/4 + \pi n$, $x_2 = \pi/2 + 2\pi n$.

Виды тригонометрических уравнений

4. Решение тригонометрических уравнений с помощью универсальной тригонометрической подстановки

A sinx + B cosx = C

Решаются с помощью введения вспомогательного аргумента.

$$\sin x = \frac{2tg\frac{x}{2}}{1+tg^2\frac{x}{2}} \qquad tgx = \frac{2tg\frac{x}{2}}{1-tg^2\frac{x}{2}} \qquad \cos x = \frac{1-tg^2\frac{x}{2}}{1+tg^2\frac{x}{2}}$$

$$3\sin x + 4\cos x = 5, x \in Z$$

$$3\frac{2tg\frac{x}{2}}{1+tg^2\frac{x}{2}} + 4\frac{1-tg^2\frac{x}{2}}{1+tg^2\frac{x}{2}} = 5$$

$$\frac{6tg\frac{x}{2} + 4 - 4tg^2\frac{x}{2} - 5 - 5tg^2\frac{x}{2}}{1+tg^2\frac{x}{2}} = 0$$

$$\begin{cases} 9tg^2\frac{x}{2} - 6tg\frac{x}{2} + 1 = 0 \\ 1+tg^2\frac{x}{2} \neq 0 \end{cases}$$

$$\left(3tg\frac{x}{2} - 1\right)^2 = 0$$

$$tg\frac{x}{2} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{x}{2} = arctg\frac{1}{3} + \pi n, n \in Z$$

$$x = 2arctg\frac{1}{3} + 2\pi n, n \in Z$$

При переходе от уравнения (1) к уравнению (2), могла произойти потеря корней, значит необходимо проверить, являются ли корни уравнения корнями данного уровнения.

$$\cos\frac{x}{2} = 0$$

$$\frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z$$

$$x = \pi + 2\pi n, n \in Z$$

Проверка

Если $x = \pi + 2\pi n, n \in Z$,

$3\sin(\pi + 2\pi n) + 4\cos(\pi + 2\pi n) = 5, x \in Z$

$0 + 4(-1) = 5$ - не верно, значит

$x = \pi + 2\pi n, n \in Z$ не является корнями исходного уравнения

Ответ: $x = 2arctg\frac{1}{3} + 2\pi n, n \in Z$