

Формулы радиусов вписанного и описанного кругов треугольника.

Геометрия. 9 класс

Фролов Н.А.

Новоолександровская ООШ

Еланецкий р-н

Николаевская обл

Украина


Историческая справка

- Еще одна формула площади треугольника, для доказательства которой можно использовать тригонометрические функции, была приведена древнегреческим математиком Героном Александрийским (прибл. IV в. ст. к н. е.) и получила его имя. Только в XX ст. выяснилось, что раньше за Герона эту формулу изобрел Архимед.

Формула Герона.

- Если a, b, c - стороны треугольника,
 $p = \frac{a+b+c}{2}$ - полупериметр
треугольника, то
площадь
треугольника


$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$



Радиус круга, вписанного в треугольник

- Если a, b, c - стороны треугольника,
 $p = \frac{a+b+c}{2}$ - полупериметр
треугольника, r —
радиус вписанной
окружности, то


$$r = \frac{S}{p} = \frac{2S}{a+b+c}$$



Радиус круга, описанного вокруг треугольника

- Если a , b , c - стороны треугольника, R - радиус описанного круга, S - площадь треугольника, то

$$R = \frac{abc}{4S}$$




Формулы радиусов вписанного и описанного кругов прямоугольного треугольника

- Для прямоугольного треугольника с катетами a и b и гипотенузой c :

$$r = \frac{a + b - c}{2}$$

$$R = \frac{c}{2}$$



Формулы радиусов вписанного и описанного кругов равностороннего треугольника

- Если a - сторона равностороннего треугольника, то

$$r = \frac{a}{2\sqrt{3}}$$

$$R = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

