



Проект: “Галактики”

Підготувала:
Бендюк Вікторія,
учениця 11-Б
класу

- 
- * Термінологія
 - * Зовнішній вигляд
 - * Утворення
 - * Класифікація
 - * Скупчення галактик
 - * Міжгалактична взаємодія

Які терміни потрібно знати?



Як бачить галактики звичайний спостерігач (не астроном)?

Основні видимі складові галактик включають :

- * Нормальні зірки різних мас і віків, частина яких укладена в скупченнях.
- * Компактні залишки зірок.
- * Холодне газопилове середовище.
- * Найбільш розріджений гарячий газ з температурою в мільйони келвінів.

Галактики не мають чітких кордонів. Не можна точно сказати, де закінчується галактика і починається міжгалактичний простір. Спектр галактик складається з випромінювання всіх складових її об'єктів. Основне джерело випромінювання - це зірки. Ближче до свого краю галактика тьмяніє, значить, і середня щільність зірок падає.

Як з'явилися галактики?

Ієрархічна теорія

Згідно з нею, після виникнення перших зірок у Всесвіті почався процес гравітаційного об'єднання зірок у скупчення і далі в галактики. Останнім часом ця теорія поставлена під сумнів. Сучасні телескопи здатні «заглянути» так далеко, що бачать об'єкти, що існували приблизно через 400 тис. років після Великого вибуху. Виявилось, що на той момент вже існували сформовані галактики. Припускається, що між виникненням перших зірок і вищевказаним періодом розвитку Всесвіту пройшло занадто мало часу, і галактики сформуватися не встигли б.

Інфляційна теорія

Версія полягає в тому, що коли йшов процес розширення Всесвіту з надсвітловою швидкістю, то утворені раніше квантові коливання утворили неоднорідності, які могли притягувати різні нестабільні речовини. Тому матерія гравітаційно стиснулась навколо цих ділянок і утворилися газові туманності. А далі почався процес утворення зірок і перетворення туманностей у галактики.



Як можна класифікувати
галактики за будовою?

Послідовність Хаббла

- ✧ Послідовність Хаббла – це морфологічна класифікація галактик по їх зовнішньому вигляду, запропонована Едвіном Хабблом у 1926 році (у 36-му – модифікована). Згідно із нею галактики поділяються на три великі класи:



Камертон Хаббла

Эллиптические

E0 E3 E5 E7 S0

Спиральные

SBa


SBb

SBc

Sc


Sb

Sa




Система де Вокулера

★ Система де Вокулера - це широко вживане розширення системи Хаббла, запропонована де Вокулером в 1959 році. Основні зміни торкнулись класифікації спіральних галактик, тоді як усі інші залишились по більшій мірі у першоствореному вигляді.



Приклади галактик до класифікації де Вокулера



Галактики тільки поодинокі?

✧ На знімках галактик видно, що дійсно одиноких галактик небагато. Порядку 95% галактик утворюють об'єднання. Є кілька видів таких об'єднань:



Як взаємодіють галактики?

А.

Якщо ві
відстані
їх діаме
міжгала
, тим са
витрача
зменши
компон
себе і т
темної
сильно

В.

Якщо ві
галакти
послуж
появі сп

С.

Гранич
сучасні
галакти
одного
зоряні
хвилі щільності і спалахи зореутворення.



начення
док більше
еретягнути
галактику

КОВО
ВНИЙ
ігне на
ично без
я при

одії), то в
юже
творення і

к. За
мні гало
іся один до
атися
му газі



Дякую за увагу!