



МОУ «Муралинская средняя общеобразовательная школа
Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан»

Млекопитающие внесённые в Красную книгу Республики Татарстан

Презентацию выполнил :ученик 11го класса
Шафигуллин Ильнур И.
Руководитель : учитель биологии Сафина Л.
Р

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИИ КАТЕГОРИЙ РЕДКОСТИ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ.



Категория 0 -по-видимому, исчезнувшие вид, нахождение на территории Республики Татарстан не подтверждено в последние 50 лет.



Категория 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения, подвергнутый критической опасности.



Категория 2 - сокращающий численность вид, подвергнутый опасности дальнейшего ухудшения состояния и исчезновения в короткие сроки.



Категория3 – вид редкий, уязвимый в связи с низкой численностью и малой распространенностью, часто находящийся на границе ареала.



Категория4 – неопределенной по статусу вид, нуждающийся в дополнительном изучении.



Категория 5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся, приведенные в шкале Красной книги РФ и включающая «виды, численность и область распространения которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в специальных мерах по сохранению и восстановлению»



Еж ушастый
Erinaceus auritus Gmelin

Отряд Насекомоядные-Insectivora
Семейство Ежовые-Erinaceidae

Распространение. В Республике Татарстан зарегистрирован в остепненных участках Дрожжановского, Тетюшского, Буинского, Апастовского районов.


Экология и биология. От обыкновенного ежа отличается большим размером ушной раковины.

СТАТУС. 3

категория.

Редкий вид,
обитающий в
Татарстане на
северной
границе ареала





Выхухоль
Desmana moschata Linnaeus

Отряд Насекомоядные-Insectivora
Семейство Кротовые-Talpidae

Экология и биология. Норы располагаются в берегах водоёмов и представляют собой ходы.


Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность в водно-болотных угодьях (распашка, вырубка древесно-кустарниковой растительности, пастьба скота, рыболовство ставными снастями, капканный промысел околводных животных) вызывает значительное снижение численности, а часто исчезновение популяций.

Статус.

0 категория.

Вероятно
исчезнувший в РТ.





Кутора обыкновенная
Neomys fodiens Pennant

Отряд Насекомоядные-Insectivora
Семейство Землеройковые-Soricidae

Распространение. Смешанные и лиственные леса Европы, Западной Сибири, южной части Восточной Сибири, Дальнего Востока и Казахстана. Отсутствует в Крыму и на Кавказе. На территории РТ обитает повсеместно в поймах малых рек и по берегам лесных водоёмов.

Экология и биология. В засушливые годы обитает вблизи водоёмов. Гнездо устраивает в естественных пустотах, под корнями, береговыми наносами, в норах грызунов.

СТАТУС

3 категория.
Редкий вид






Бурозубка крошечная
Sorex minutissimus

Отряд Насекомоядные-Lipotyphla
Семейство Землеройковые- Soricidae

Распространение. Лесотундровая, лесная и лесостепная зоны от Скандинавии на западе до Дальнего Востока. Широко распространенный, однако в большинстве регионов редкий вид. В РТ отмечено обитание в Алексеевском, Алькеевском и Альметьевском районах а так же на границе РТ и Республики Марий Эл.
Экология и биология. Отличается от бурозубок малыми размерами и слабо опущенным хвостом.

СТАТУС.
3 категория.
Редкий вид





Ночница Наттерера
Myotis Blythi Tomes

Отряд Рукокрылые-Chiroptera
Семейство Гладконосые- Vespertilionidae


Распространение. Европа, кроме северных районов, Северная Африка, Юго-Западная Азия. В РТ на границе ареала. Обнаружена в Лайшевском, Верхнеуслонском, Кайбицком, и Камско- Устьинском районах.

Экология и биология. Населяет смешанные и лиственные леса, лесостепи. Летние убежища располагаются в дуплах деревьев, дуплянках, постройках человека

СТАТУС.

1 категория.
Редкий вид





Ночница усатая *Myotis mystacinus*

Отряд Рукокрылые-Chiroptera
Семейство Гладконосые- Vespertilionidae

Распространение. Большая часть Европы, северо-запад Африки, Европейская часть России, Предуралье, Кавказ и Закавказье. В республике достоверные находки отмечены лишь в окрестностях г. Казани.

Экология и биология. Населяет различные ландшафты лесной и лесостепной зон проявляя в распространении приуроченность к выходам кристаллических пород и эрозионным формам рельефа.

СТАТУС.

4 категория.
Малоизученный вид





Ночница Брандта *Myotis brandti*

Отряд Рукокрылые-Chiroptera
Семейство Гладконосые- Vespertilionidae

Распространение. В России вид распространён в средней северной полосе Европейской части, на Урале, в южной и средней полосе Сибири и Дальнего Востока. В республике обитание достоверно установлено в Агрызском, Бавлинском и Черемшанском районах, на территории Казани и ее окрестностей.

Экология и биология. В качестве убежищ использует дупла деревьев, полости за отставшей корой, дуплянки, скальные щели, пещеры и штольни, реже различные постройки человека.


СТАТУС.

4 категория.

Малоизученный,
недавно вновь
выделенный вид.



Photo by A. Gukasova




Ночница прудовая
Myotis dasycneme Boie
 Отряд Рукокрылые-Chiroptera
 Семейство Гладконосые- Vespertilionidae

Распространение. Обитает в лесной и лесостепной зонах Северной и Восточной Европы, на восток до Западной Сибири и Казахстана. В РТ обнаружена в Алексеевском, Зеленодольском, Лаишевском и Агрызском районах.
Экология и биология. Населяет поймы равнинных рек, предпочитает участки с не нарушенной прибрежной растительностью.

СТАТУС.
 4 категория.
 Немногочисленный,
 слабоизученный вид.





Ночница водяная
Myotis daubentonii Kuhl

Отряд Рукокрылые-Chiroptera
Семейство Гладконосые- Vespertilionidae

Распространение. В РТ обнаружена в Тетюшском, Лениногорском, Спасском, Альметьевском, Алексеевском, Верхнеуслонском и Кайбицком районах, обоих участках Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника.


Экология и биология. Встречается по берегам водоёмов. Летние убежища-дупла, постройки человека, реже-скальные трещины. Кормятся в начале и в конце ночи над поверхностью водоёмов, реже-над лесными полянами.

СТАТУС.

3 категория.

Редкий
слабоизученный
вид.





Ушан бурый
Plecotus auritus Linnaeus
Отряд Рукокрылые-Chiroptera
Семейство Гладконосые- Vespertilionidae


Распространение. В РТ обнаружен в Казани, Чистополе, Зеленодольском, Высокогорском, Агрызском, Азнакевском, Черемшанском районах.

Экология и биология. Населяет смешанные и широколиственные, реже таёжные леса, в лесостепной зоне придерживается колков и лесополос. Убежища-разнообразные полости в деревьях, дуплянках, постройки человека. Питается насекомыми.

СТАТУС.

4 категория.
Редкий
слабоизученный вид





Вечерница гигантская
Nyctalus lasiopterus Shreber
Отряд Рукокрылые-Chiroptera
Семейство Гладконосые- Vespertilionidae

Распространение. В РТ – северо – восточная граница ареала. Встречена в Саралинском и Раифском участках ВКГПБЗ, Верхнеуслонском и Тюльяченском районах.

Экология и биология. Населяет широколиственные и смешанные леса. Большинство экземпляров поймано в летних колония других видов рукокрылых. Кормится над лесными опушками и прогалинами.

СТАТУС.
1 категория.
Очень редкий
вид.





Нетопырь-карлик
Pipistrellus pipistrellus Shreber

Отряд Рукокрылые-Chiroptera
Семейство Гладконосые- Vespertilionidae

Распространение. В РТ - северо – восточная граница ареала. Обнаружена в Раифском участке ВКГПБЗ и Арском районе.

Экология и биология. Селится в постройках человека, реже – в дуплах деревьев, часто с другими видами летучих мышей. Кормится в сумерках над опушками, просеками, поверхностью воды.

СТАТУС.

1 категория.

Очень редкий
вид





Нетопырь лесной
Pipistrellus nathusii Keyserling, Blasius

Отряд Рукокрылые-Chiroptera
Семейство Гладконосые- Vespertilionidae

Распространение. В РТ отмечен в Зеленодольском, Лаишевском, Мамадышском, Агрызском, Азнакаевском, Актанышском, Черемшанском, Алькеевском районах.

Экология и биология. Населяет широко лиственные леса. Часто селится в поселениях человека. Кормится в ранних сумерках над опушками, поймами, аллеями, полянами.

СТАТУС.

3 категория.
Малоизучен
ный вид.





Кожан северный
Eptesicus nilssonii Keyserling, Blasius

Отряд Рукокрылые-Chiroptera
Семейство Гладконосые- Vespertilionidae


Распространение. В лесной части Северной Евразии на юг до Кавказа, Гималаев, Тибета, Монголии и Приморья; на север кожан северный проникает почти до границы лесной зоны. В РТ ранее отмечен в Нижнекамском и Зеленодольском районах. В последние годы встречен в Агрызском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Арском Тюлячинском, Высокогорском и Балтасинском районах.


Экология и биология. Убежища - деревянные постройки, дупла, скальные трещины, штольни и пещеры. Кормится в ранних сумерках над просеками, лесными прогалами

СТАТУС.

1 категория.

Редкий вид.






Кожан двухцветный
Vespertilio murinus Linnaeus
Отряд Рукокрылые -Chiroptera
Семейство Гладконосые –Vespertilionidae

Распространение. В РТ отмечен в обоих участках ВКГПБЗ ,в Верхнеуслонском ,Ела-бужском ,Агрызском Черемшанском , Мамадышском районах и городе Казани.

Экология и биология. Населяет кожан двухцветный леса различного типа, остепнен-ные участки, агроландшафты. Так же охотно двухцветный кожан заселяет населенные пункты, обычно сельского типа.

СТАТУС.
4 категория.
Вид,
снижающий
численность





Летяга обыкновенная
Pteromus volans Linnaeus


Отряд Грызуны -Rodentia
Семейство Летяжки -Pteromyidae

Распространение. В Татарстане заселяет восточный и северозападный фаунистические участки. В Предволжье и Закамье отсутствует. В последние 25 лет отмечен в Зеленодольском, Высокогорском, Арском, Балтасинском, Сабинском, Елабужском, Агрызском, Кукморском, Рыбно-Слободском районах и окрестностях г. Казани.

Экология и биология. Ведет ночной образ жизни. При добывании пищи совершает планирующие полеты. В питании ведущее место занимают листья, сережки, почки и кора березы; сережки и почки ольхи; завязи побегов ели и сосны; а также цветы и ягоды.

СТАТУС.
4 категория.
Южная граница
ареала





Бурундук азиатский
Tamias sibiricus Laxmann

Отряд Грызуны -Rodentia
Семейство Беличьи –Sciuridae

Распространение. В РТ находится на южной границе ареала. Обитает только по правобережью Камы, не доходя при этом на юге Прикамья до западной границы республики. На левом берегу Камы отмечается в елово-пихтовых лесах (Белоусское лесничество НП «Нижняя Кама»). Устойчивая территориальная группировка сохраняется в Высокогорском районе. В последние 10 лет отмечался в Арском, Кукморском, Мамадышском, РыбноСло-бодском, Сабинском и Тюлячинском районах.

Экология и биология. Типичный обитатель хвойных и смешанных лесов. Населяет также молодые лесонасаждения, колки, долины рек. Предпочитает участки с буреломом и гари. Ведет дневной образ жизни. Норы устраивает в грунте и дуплах упавших деревьев.

СТАТУС.

3 категория.
Редкий вид,
находящийся
на границе
ареала





Суслик крапчатый
Citellus suslicus Guldenstaedt
Отряд Грызуны –Rodentia
Семейство Беличьи -Sciuridae


Распространение. Черноземные степи и лесостепи Европы - от Центральной Польши к востоку до Волги. В середине XIX в. на современной территории РТ отсутствовал. В 20-е годы XX века встречался в Камско-Устьинском районе. В настоящее время распространился до устья р. Свияги.

Экология и биология. Местами обитания служат безлесные склоны, долины полевых речек, межи около дорог. Питается суслик растениями.

СТАТУС.

3 категория.
Вид на
восточной
границе
ареала





Соня лесная
Dryomys nitedula Pallas

Отряд Грызуны - Rodentia
Семейство Соневые – Myoxidae


Распространение. В Татарстане проходит восточная граница ареала по линии Елабуга-Черемшан, отмечена в Зеленодольском, Тетюшском, Лаишевском, Спасском, Альметьевском, Нижнекамском, Мамадышском, и Тукаевском районах.

Экология и биология. Населяет лесная соня смешанные лиственные леса с преобладанием дуба и липы, поймы рек. Охотно селится в садах. Предпочитает участки леса с кустарниковым ярусом и густым подростом.

СТАТУС.

3 категория.
Редкий вид на
северовостоchno
й границе
ареала





Соня садовая
Eliomys quercinus

Отряд Грызуны -Rodentia
Семейство Соневые -Myoxidae

Распространение. . В Татарстане отмечена в Зеленодольском, Лаишевском, Кукморском, Алькеевском, Мамадышском районах, а так же на границе Зеленодольского района РТ и Республики Марий Эл.

Экология и биология. Местобитания отличаются большим разнообразием. В Европейской части населяет лесные массивы, где преобладают или хотя бы присутствуют хвойные породы. Важное значение имеет и наличие дуплистых деревьев, густых кустарниковых зарослей и подлеска.

СТАТУС.

2 категория.

Вид на северо-восточной границе ареала





Полчок
Myoxus glis
 Отряд Грызуны - Rodentia
 Семейство Соневые – Myoxidae

Распространение. В РТ обитает на правом берегу Волги. Отмечен в Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Тетюшском районах.

Экология и биология. Полчок потребляет преимущественно растительную пищу, однако объекты животного происхождения всегда присутствуют в рационе. На территории Волжско-Камско-го края наиболее обычными кормами являются желуди, орехи лещины, липовые «орешки»; в садах - плоды культурных древесно-кустарниковых растений.

СТАТУС.

1 категория.
 Вид на
 восточной
 границе
 ареала.





Соня орешниковая
Muscardinus avellanarius Linnaeus
Отряд Грызуны - Rodentia
Семейство Соневые - Myoxidae

Распространение. В РТ ранее отмечался как по правую (Теньки), так и по левую сторону р. Волги – Раифский участок ВКГПБЗ и окрестности г. Казани. В последние десятилетия достоверных находок не обнаружено.


Экология и биология. Населяет смешанные и широколиственные леса с хорошо выраженным подлеском и подростом из орешника, липы, рябины, калины и др. Обычно строит открытые гнезда округлой формы на ветвях различных кустарников. Часто поселяется в старых птичьих гнездах, реже в дуплах деревьев или под корой. Охотно живет в дуплянках.

СТАТУС.
1 категория.
Вид на
восточной
границе
ареала.
Очень
редкий.



© Miloš Anděra

www.naturfoto.cz



Мышовка степная
Sicista subtilis


Отряд Грызуны -Rodentia
Семейство Мышовковые –Sminthidae

Распространение. В РТ проходит северная граница ареала, соответствующая северным пределам лесостепной зоны. Наиболее северная точка находки - Чистопольский район. Помимо этого отмечено обитание в Октябрьском, Азнакаевском, Бугульминском и Бавлинском районах.

Экология и биология. Обитатель степной зоны, по остепненным и луговым участкам проникает до северных пределов лесостепи. Населяет участки целинной ковыльной степи с сильно задернованной почвой, березовые колки и кустарниковые заросли, по остепненным склонам, поля и молодые лесополосы.

СТАТУС.
4категория.
Редкий вид,
обитающий
на северной
границе
ареала.





Мышовка лесная *Sicista betulina*

Отряд Грызуны -Rodentia

Семейство Мышовковые –Sminthidae

Распространение. Лесная и лесостепная зоны от Венгрии, Дании и Норвегии до Алтая, Саян и северо-восточного Прибайкалья. В РТ отмечено обитание в Верхнеуслонском, Высокогорском, Ела-бужском, Черемшанском, Бугульминском, Алькеевском, Зеленодольском, Мензелинском, Нижнекамском, Лаишевском, Мамадышском, Агрызском, Арском районах.

Экология и биология. Обитает в различных биотопах, тяготея к лиственным насаждениям с богатым травяным покровом и большим количеством убежищ (пни, кучи валежника, сухостойные деревья, упавшие стволы) (2, 13). Селится в пустотах под корнями деревьев, трухлявых пнях, не высоко расположенных дуплах, реже роет простые и короткие норы в почве.

СТАТУС.

4 категория.
Редкий вид,
обитающий
на северной
границе
ареала.





Хомяк Эверсмана
Allocricetulus evermanni

Отряд Грызуны - Rodentia
Семейство Хомяковые – Cricetidae

Распространение. Равнинная степь, полупустыня и частью лесостепь от реки Волги на западе до северного Китая и Синьцзана на востоке. В Татарстане вид отмечен в южных районах Закамья: Бугульминском, Нурлатском и Азнакаевском.

Экология и биология. В республике обитает наиболее темноокрашенный подвид *A. e. evermanni*. Наибольшей численности достигает в сухих степях и полупустынях. В республике встречается на полях и прилегающих к ним старых залежах, опушках лесных полос.

СТАТУС.
1 категория.
Вид на
северо-
западной
границе
ареала.





Хомячок серый
Cricetus migratorius

Отряд Грызуны - Rodentia

Семейство Хомяковые - Cricetidae

Распространение. В РТ проходит северная граница распространения вида и его обитание отмечено в Предволжье - в Камско-Устьинском, Дрожжановском, Буинском, и Верхнеуслонском районах в Закамье - Азнакаевском, Спасском, Октябрьском Лениногорском и Бугульминском районах. В республике зверек встречается преимущественно там, где есть целинные участки, многолетние межи, широкие полевые дороги, расположенные преимущественно по остепненным водораздельным возвышенностям.

Экология и биология. Норы имеют простое строение с двумя, реже тремя выходами и одной камерой. Для хранения запасов используются «слепые» отнорки. Охотно поселяется в брошенных норах других грызунов. С осени нередко встречается в стогах и ометах.

СТАТУС.

1 категория.

Вид на северо-западной границе ареала.





Пеструшка степная

Lagurus lagurus

Отряд Грызуны - Rodentia

Семейство Хомяковые – Cricetidae

Распространение. В РТ отмечен в Дрожжановском, Тетюшском, Юта-зинском, Нурлатском, Азнакаевском, Бавлинском, Че-ремшанском, Муслюмовском, Камско-Устьинском, Бугульминском, Буинском, Чистопольском, Актанышском районах. Заселяет долины степных рек, выгоны, окраины полей, обочины дорог.

Экология и биология. Предпочитает селиться в злаково-разно-травных, ковыльно-типчаковых и белополынных степях, а также охотно осваивает пашни, залежи выгоны.

СТАТУС.

4 категория.

Проходит
северная
граница
ареала





Тушканчик большой
Allactaga jaculus Pall

Отряд Грызуны -Rodentia

Семейство Тушканчиковые –Dipodidae

Распространение. В РТ на правобережье р. Камы (Предкамье) тушканчик большой не обнаружен. Обычен в юго-западных районах Предволжья (Дрожжановский, Буинский, Тетюшский). Самой северной точкой нахождения на правобережье р. Волги считались окрестности с. Варварино Камско-Устьинского района.

Экология и биология. . Наиболее типичными местами обитания являются обочины дорог, выгоны, склоны оврагов и холмов, по берегам рек и ручьев. Норы делятся на зимовочные, постоянные, дневные, временные.

СТАТУС.

3 категория.

Редкий вид





Полевка красная
Clethrionomys rutilus

Отряд Грызуны - Rodentia

Семейство Хомяковые – Cricetidae

Распространение. В РТ южная граница ареала проходит от Раифы по северным районам достигает Вятки, где по долине спускается к Лубянам и Елабуге, а, далее переходя Каму, в виде выступа тянется на юг до Альметьевска. Обитание красной полевки в РТ отмечено в Зеленодольском, Высокогорском, Кукморском, Нижнекамском, Тукаевском, Альметьевском, Балтасинском и Агрызском районах.


Экология и биология. Норы устраивает красная полевка в мертвой древесине старых пней и полусгнивших поваленных стволах деревьев. По характеру питания - растительный полифаг с отчетливой сменой кормов. Весной и в начале лета в рационе преобладают зеленые части растений; во второй половине лета - семена, ягоды и грибы, а зимой - мхи и лишайники.

СТАТУС.

3 категория.

Редкий вид





Медведь бурый
Ursus arctos Linnaeus
 Отряд Хищные - Carnivora
 Семейство Медвежьи – Ursidae

Распространение. С 80-х годов прошлого столетия ареал в РТ имеет устойчивую тенденцию к расширению. Следы деятельности и встречи медведя регистрировались в Агрызском, Арском, Атнинском, Балтасинском, Елабужском, Кукморском, Мамадышском, Пестречинском, Сабинском, Тюлячинском районах Предкамья (здесь отмечены случаи успешной зимовки животных и рождения медвежат); в Кайбицком и Тетюшском районах Предволжья; в Алексеевском, Нурлатском, Акта-нышском и Мензелинском районах Закамья.

Экология и биология. Экологически пластичный вид. В подзоне южной тайги медведь бурый может устойчиво существовать благодаря способности обитать на обширных вырубках. Самцы держатся обычно одиночно, самки с медвежатами. Индивидуальный участок метит «задирами» на деревьях.

СТАТУС.
 Категория.
 Редкий вид






Куница каменная
Martes foina Erxleben
Отряд Хищные - Carnivora
Семейство Куницеваы – Mustelidae

Распространение. Первая достоверная находка на территории Республики Татарстан отмечена зимой 1987/1988 гг. в Свяжском лесничестве. Отмечена в Камско-Устьинском и Тетюшском районах. Находка в г. Казани является наиболее северо-восточной в современной европейской части ареала.

Экология и биология. Куница каменная обитает в лесах (главным образом широколиственных), лесополосах, в горах - в кустарниковых зарослях. В европейской части ареала отмечена в населённых пунктах

СТАТУС.
4категория.
Новый вид
в фауне РТ





Горноста́й
Mustela erminea Linnaeus
Отряд Хищные - Carnivora
Семейство Куницевые – Mustelidae

Распространение. В Республике Татарстан ранее отмечен повсеместно (2). В последнее десятилетие встречи горностая зарегистрированы в Зеленодольском, Лаишевском, Агрызском, Лениногорском, Высокогорском, Апастовском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Тетюшском районах и городе Казани.


Экология и биология. Горноста́й населяет различные биотопы, предпочитая поймы рек. Убежище устраивает под корнями деревьев, в валежнике, иногда - в норах грызунов. Ведёт горноста́й одиночный образ жизни, территориален.



СТАТУС. 2

категория.

Малочисленный
вид, численность
которого
сокращается.



Норка европейская
Mustela Lutreola Linnaeus

Отряд Хищные - Carnivora

Семейство Куницевые – Mustelidae

Распространение. РТ в начале 20 века была обычным видом для всех пойменных угодий. Сокращение ареала в РТ отмечено с конца 20-х годов. Последний достоверный случай добычи отмечен в 1965 году в Бугульминском районе.

Экология и биология. Норка европейская жилища устраивает вблизи водоемов - под корнями деревьев, в валежнике, в дуплах упавших деревьев, использует хатки бобра и ондатры. Основу питания составляют земноводные, мелкие грызуны, рыба, птицы и водные насекомые.

СТАТУС.

1 категория.
Находящийся
под угрозой
исчезновения,
возможно уже
исчезнувший на
территории
республики вид.





Выдра

Lutra lutra Linnaeus

Отряд Хищные - Carnivora

Семейство Куницевые – Mustelidae

Распространение. Евразия, Северо-Западная Африка. В Республике Татарстан, в настоящее время, сохранилась в северных районах по рекам Илеть, Шора, Лубянка, Шошма. Наибольшее число встреч отмечено в Агрызском районе на реках Иж и Кырыкмас.

Экология и биология. Выдра населяет малые реки (ширина 10-20 м) с прозрачной водой, быстрым течением, каменистым руслом и крутыми берегами, поросшими кустами и деревьями. Ведет полуводный образ жизни. В зимний период необходимо наличие полыней, проталин, продухов, т.е. возможность проникать в воду и добывать в ней пищу.

СТАТУС.

1 категория.
Находящийся
под угрозой
исчезновения,
возможно
уже исчезнув
ший на
территории
республики
вид.

