


The background of the slide is a close-up, artistic rendering of numerous red blood cells. These cells are depicted as biconcave discs, with a darker red center and a lighter red outer rim, giving them a three-dimensional appearance. They are scattered across the frame, with some in sharp focus and others blurred in the background, creating a sense of depth. The overall color palette is various shades of red, from deep crimson to a lighter, almost pinkish-red.

ГРУППЫ КРОВИ. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ.

С незапамятных времен люди знали, что кровь является носителем жизни. Древний человек, будучи охотником, воином, наблюдал, как по мере потери крови угасает жизнь поверженного им человека или животного.



Считалось, что с помощью свежей крови можно вылечить или омолодить человека. В Древнем Риме ослабевшим людям, старикам давали пить кровь умирающих гладиаторов.



Для всей истории переливания крови характерна волнообразность развития с бурными подъемами и спадами. В ней можно выделить *три основных периода*:

- эмпирический,
- анатомо-физиологический,
- научный.

1. ЭМПИРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Эмпирический период в истории переливания крови был самым длительным по продолжительности и самым бедным по фактам, освещающим историю применения крови с лечебной целью. Имеются сведения, что еще во время древнеегипетских войн за войсками гнали стада баранов для использования их крови при лечении раненых воинов.

В сочинениях древнегреческих поэтов есть сведения о применении крови с целью лечения больных.



О полезности смешивать
соки больных людей с
кровью здоровых писал

Гиппократ. Он
рекомендовал пить кровь
здоровых людей больным
эпилепсией,
душевнобольным.



Гиппократ




Римские патриции пили
свежую кровь погибших
гладиаторов прямо на
аренах римского цирка с
целью омоложения.

Первое упоминание о переливании крови имеется в трудах Либавия, опубликованных в 1615 г., где он описывает процедуру переливания крови от человека человеку с помощью соединения их сосудов серебряными трубочками, но нет данных, подтверждающих, что такое переливание крови было кому-нибудь сделано.



2. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Начало анатомо-физиологического периода в истории переливания крови связывается с открытием *Уильямом Гарвеем* в 1628 г. законов кровообращения. С этого момента благодаря правильному пониманию принципов движения крови в живом организме вливание лечебных растворов и переливание крови получило анатомо-физиологическое обоснование.



В 1666 г. выдающийся английский анатом и физиолог **Р. Лоуэр** успешно перелил с помощью серебряных трубочек кровь от одной собаки другой, что послужило толчком к применению этой манипуляции у человека. Р. Лоуэру принадлежит приоритет первых опытов по внутривенному вливанию лечебных растворов. В вены собакам он вводил вино, пиво и молоко.

Полученные хорошие результаты от переливания крови и введения некоторых жидкостей позволили Лоуэру рекомендовать их применение у людей.



Первое переливание крови от животного человеку осуществил в 1667 г. во Франции Ж. Дени. Он перелил кровь от ягненка душевнобольному юноше, погибающему от многократных кровопусканий — модного тогда метода лечения. Юноша выздоровел. Однако при том уровне развития медицины успешными и безопасными гемотрансфузии, естественно, быть не могли. Переливание крови четвертому больному закончилось его смертью. Ж. Дени был привлечен к суду, а переливание крови было запрещено.




В 1675 г. Ватикан издал запретный эдикт, и исследования по трансфузиологии были прекращены почти на целое столетие. Всего в XVII столетии во Франции, Англии, Италии и Германии было проведено 20 переливаний крови больным, но затем на долгие годы этот метод был забыт.

Попытки произвести переливание крови возобновились лишь в конце XVIII века. А в 1819 г. английский физиолог и акушер **Дж. Блендель** произвел первое переливание крови от человека человеку и предложил аппарат для гемотрансфузий, которым он пользовался для лечения обескровленных рожениц. Всего он со своими учениками произвел 11 переливаний крови, причем кровь для переливания забиралась у родственников пациентов.



Уже в то время Блендель заметил, что в некоторых случаях при гемотрансфузии у больных возникают реакции, и пришел к выводу, что при их возникновении переливание следует сразу прекратить. При вливании крови Блендель использовал подобие современной биологической пробы.



Пионерами русской медицинской науки в области трансфузиологии считаются

Матвей Пэкэн и С. Ф. Хотовицкий. Они в конце XVIII - начале XIX века детально описали технику переливания крови, влияние перелитой крови на организм больного.

В 1830 г. московский химик Герман предложил внутривенно вливать подкисленную воду для лечения холеры. В Англии врач Латта в 1832 г. во время эпидемии холеры произвел внутривенное вливание раствора поваренной соли. Эти события стали началом применения кровезамещающих растворов.




3. НАУЧНЫЙ ПЕРИОД

1901 г. — открытие венским
бактериологом

Карлом Ландштейнером трех групп
крови человека (А, В, С). Он разделил
всех людей на три группы по
способности сыворотки и эритроцитов
их крови давать явление
изогемагглютинации (склеивание
эритроцитов).

1902 г. — сотрудники Ландштейнера
А. Декастелло и А. Штурли
нашли людей, группа крови которых
отличалась от эритроцитов и
сывороток упомянутых трех групп. Эту
группу они рассматривали как
отклонение от схемы Ландштейнера.



K. Landsteiner



1907 г. — чешский ученый Я. Янский доказал, что новая группа крови является самостоятельной и все люди по иммунологическим свойствам крови делятся не на три, а на четыре группы, и обозначил их римскими цифрами (I, II, III и IV).

Спасибо за внимание
Крепкого здоровья!

