

ГОЛЕНАСТЫЕ ИЛИ ДИСТООБРАЗНЫЕ

Голенастые - это отряд птиц, который включает в себя шесть семейств: настоящие цапли, китоглавы, челноклювы, молотоголовые цапли или молотоглавы, аисты и ибисы.

Птицы отряда голенастые весьма разнообразны по величине и по внешности. Живая масса колеблется от 100 г до 6,0 кг, высота от 20 см до 1,5

У большинства представителей аистообразных длинные ноги, шея и клюв. Аисты и цапли имеют клюв конической формы с заостренной вершиной. У ибисов он изогнутый дугообразно книзу. Колпицы обладают плоским клювом с лопатообразным расширением у вершины.



Многие голенастые имеют на голове неоперенные участки кожи, а на плечах, затылке и в области зоба у них находятся пучки удлинённых перьев. Оперение сравнительно рыхлое. Хвост у птиц относительно короткий, крылья - тупые. У некоторых видов выражено сезонное изменение окраски. Окраска взрослых птиц отличается от окраски



Птицы - моногамы. В строительстве гнезда участвуют обе птицы. В большинстве случаев самец носит материал, а самка строит и устраивает гнездо. Обычно гнезда располагаются на деревьях, но бывают и в камышах. Многие птицы гнездятся на скалах.

Кладка обычно составляет от трех до пяти яиц. Вылупившихся птенцов выкармливают оба родителя в течение двух месяцев (и более).





Питаются аистообразные различными мелкими животными: пресмыкающимися, земноводными, рыбой, крупными насекомыми, ракообразными, моллюсками и пр. беспозвоночными. Корм ищут на суше или на мелководье. Иногда способны подстерегать добычу, стоя неподвижно в зарослях.

Бегать голенастые не умеют, их шаги неторопливы и размеренны. Благодаря длинной шее и ногам, птица способна вовремя заметить опасность. Большинство птиц этого отряда летают медленно, но аисты способны парить. Во время полета ноги птицы вытянуты назад и выдаются далеко за хвост.



Большинство видов голенастых приносит пользу в сельском хозяйстве, уничтожая вредных насекомых.

Аистообразные распространены практически по всему земному шару (исключение составляют Антарктика и Арктика). Все голенастые селятся на влажных и затопляемых местах, в камышах и на болотах. Только некоторые виды обитают в сухих степях, лугах и по долинам рек.



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ :D**

**Выполнила
ученица
7 класса «Б»
средней школы №
45**