

Качкодзъоб

**Качкодзьоб** -- водоплавний ссавець з ряду однопрохідних, які  
проживають в Австралії. Це єдиний сучасний представник родини  
~~Качкодзьобових~~ разом з ~~худнами~~ утворює ряд однопрохідних -- тварин,  
~~10-15 см, важить він до 2 кг. Самці~~ приблизно на третину більші за  
самиць. Тіло у качкодзьоба  
приземисте, коротконоге; хвіст  
пласкуватий, схожий на  
хвіст бобра, але вкритий шерстю,  
котра з віком помітно рідшає. У  
хвості качкодзьба, як  
у тасманського диявола,  
відкладаються запаси жиру. Хутро  
у нього густе, м'яке, звичайне  
темно-коричневе на спині та  
рудувате чи сіре на череві. Голова  
кругла. Попереду лицьовий відділ  
витягнутий у плаский дзьоб  
довжиною приблизно 65 мм,  
шириною 50 мм. Дзьоб не  
жорсткий, як у птахів, а м'який,  
вкритий еластичною голою  
шкірою, котра напнута на дві  
тонкі, довгі, дугоподібні кісточки.



# Отрута качкодзьоба

Качкодзьоб – один з небагатьох отруйних ссавців (поряд із деякими землерийками та щелезубами, що володіють токсичною слиною).

У молодих качкодзьобів обох статей на задніх ногах знаходяться зачатки рогових шпор. У самок до однорічного віку вони відвалиються, а в самців продовжують рости



Качкодзьоб – скритна нічна напівводна тварина, що населяє береги невеликих річок і ставків Східної Австралії на відносно великому ареалі від холодних плато Тасманії та Австралійських Альп до тропічних дощових лісів прибережного Квінсленда. На півночі ареал проживання качкодзьоба сягає півострова Кейп-Йорк (Куктаун). Про поширення качкодзьоба всередині материка відомо менше. Мабуть, він повністю зник у Південній Австралії (крім острова Кенгуру) і на більшій частині басейну річок Муррей - Дарлінг. Останнє спричинили, вочевидь, забруднення вод, до якого качконіс є дуже чутливим. Качкодзьоби віддають перевагу воді з температурними показником 25-29,9 °C; у солонуватій воді не зустрічаються.

Живе качконіс по берегах водойм. За прихисток йому править коротка пряма нора (завдовжки до 10 м), з двома входами і внутрішньою камерою. Один вхід підводний, інший розташований на висоті 1,2-3,6 метрів над рівнем води, під корінням дерев або в заростях.

Качкодзьоб чудово плаває і пірнає, залишаючись під водою до 5 хвилин. У воді він проводить до 10 годин на добу, оскільки щодня йому потрібно з'їсти кількість їжі, що становить до чверті його власної ваги. Активним качконіс є вночі і в сутінкову пору доби.

У природі вороги качкодзьоба нечисленні – зрідка на нього нападають варани, шітони і морські леопарди, що буває, запливають у річки.

Ornithorhynchus\_anatinus\_-Sydney\_Aquarium\_Sydney\_Australia\_-swimming-6a (3).ogv

Качкодзьоб полює у воді. Тут він проводить близько двох годин на день.

Качкодзьоб годується двічі на день - вранці та ввечері.

Ці тварини полюють на дрібну живність: личинок комах, молюсків і ракоподібних. Очі і вушні отвори качкодзьоба під час підводного занурення затуляються дзьоба, вкри допомогою стовбури дер піском, граві щоками качкодзьоба подрібнює зможе складат



## ЧИ ТОБІ ВІДОМО, ЩО...

Качкодзьоб належить до найпримітивнішого ряду ссавців - яйцеродних, що успадкували багато рис плазунів. До них належить також і



форму свого тла. завдяки сильній мускулатурі тварина може витягуватися в довжину і проникати у вузькі щілини, рятуючись таким чином від

## СПЕЦІАЛЬНІ ПРИСТОСУВАНЯ КАЧКОДЗЬОБА

**Хутро:** густе, гладке і блискуче, водонепроникне.

**Дзьоб:** служить -для пошуку їжі в донному ґрунті.

**Задні кінцівки:** менш – розвинені, ніж передні, служать стерном.

**Отруйна шпора:** зсередини порожниста: по каналу виводиться секрет -отруйної залози, здатний убити собаку.

## МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

По берегах струмків, річок і озер в  
Східній Австралії і на Тасманії.



# СПЕЦІАЛЬНІ ПРИСТОСУВАННЯ КАЧКОДЬОБА

**Хутро:** густе, гладке і блискуче, водонепроникне.

**Дзьоб:** служить -для пошуку їжі в донному ґрунті.

**Задні кінцівки:** менш — розвинені, ніж передні, служать стерном.

**Отруйна шпора:** зсередини порожниста; по каналу виводиться секрет -отруйної залози, златний убіти собаку.



Дякую за увагу!

