

Творческая работа

Ученицы 6 класса “Д”

Атаянц Насти

ящер китайский



Китайский ящер

- Кита́йский я́щер, или Кита́йский панголи́н (лат. *Manis pentadactyla*) — млекопитающее из отряда панголинов. Один из трёх видов ящеров, обитающих в Азии.

Внешний вид

- Длина тела составляет около 60 см, вместе с 18-сантиметровым хвостом. У этих ящеров около 18 рядов чешуек. Чешуйки сопровождаются волосами, что весьма необычно для млекопитающих. У китайских панголинов небольшая заострённая голова и узкий рот. Нос толстый с ноздрями на конце. Это бронзовоокрашенные животные с круглым телом. Передние и задние лапы снабжены острыми когтями.

Распространение

- Китайские панголины распространены на западе Непала, Ассама, в восточных Гималаях, Бирме и Китае.

Поведение

Места обитания

- Китайские ящеры населяют широколиственные и субтропические леса. Центральная часть Непала расположена на холмистой местности, где находится множество большие курганов термитов.
- Китайские ящеры относятся к роющим видам. Они используют свои сильные, когтистые лапы для рытья нор глубиной до 8 метров. Панголины могут вырыть такую нору за 3-5 минут! После того, как ящер окажется внутри, он закрывает вход в нору. Иногда панголины были замечены в чужих норах.

Образ жизни

- О жизни китайского ящера известно сравнительно мало. Это объясняется тем, что китайские панголины — ведущие ночной образ жизни существа, крайне пугливые и медленно передвигающиеся. Они вовсе не агрессивны. Когда на китайских ящеров нападает хищник, они свёртываются в клубок и полагаются на защиту своих чешуек, которые охватывают всё тело. Являются преимущественно сухопутными видами.
- Как и другие виды панголинов, китайские панголины питаются муравьями и термитами. Они используют свои когти, для того чтобы разрыть норы насекомых. Затем они захватывают добычу своим длинным, липким языком, который достигает в длину 25 см.

Размножение

- В Непале китайские ящеры приносят потомство в апреле-мае. Рождается один детёныш, длиной около 45 см, и весящий около 1 фунта. Молодые рождаются уже с чешуйками, хотя первые два дня жизни детёныши ещё очень слабые. Несмотря на то, что молодняк может передвигаться уже сразу после рождения, самка носит их на хвосте или на спине. Самцы также хорошо демонстрируют родительские инстинкты и делятся с самкой с детёнышами своей норой.

Охранный статус

- В МСОП китайский ящер значится как вид, находящийся в опасности (англ. EN, Endangered). Главной угрозой для ящеров является охота на них ради их мяса и разрушение среды обитания. Во многих неохраняемых областях главной угрозой является хозяйственное освоение земель.

- Домен: Эукариоты
- Царство : Животные
- Тип : Хордовые
- Класс : Млекопитающие
- Отряд : Панголины
- Семейство : Ящеровые
- Род : Ящеры
- Вид : Китайский ящер









Спасибо за внимание !