


***Методы исследования ЦНС.
Процессы торможения.
Доминанта. Спинной мозг***

**Кафедра специальной
психологии КГПУ**


Торможение – местный нервный процесс, приводящий к угнетению или устранению возбуждения. В отличие от возбуждения не распространяется по нервным структурам, как ПД

Торможение в ЦНС (опыт И.М. Сеченова)




- В центральной нервной системе существует несколько способов торможения, имеющих разную природу и разную локализацию, но в принципе основанных на одном механизме → *увеличении разницы между критическим уровнем деполяризации и величиной мембранного потенциала нейронов.*

ТРИ СОСТОЯНИЯ МЕМБРАНЫ



Механизм торможения


$$E_0 \leq E_k$$



Постсинаптическое торможение


- **Тормозные нейроны.** Установлено, что в ЦНС наряду с возбуждающими нейронами существуют и особые **тормозные нейроны**. Пример → т.н. клетка Реншоу в спинном мозге.
- **Торможение антидромное** (син. возвратное) - процесс регуляции нервными клетками интенсивности поступающих к ним сигналов по способу обратной связи. Он заключается в том, что коллатерали аксона нервной клетки устанавливают синаптические контакты со специальными вставочными нейронами, которые воздействуют на первый нейрон тормозным синапсом (клетка Реншоу по отношению к мотонейрону спинного мозга).
- Это механизм, автоматически охраняющий нервные клетки от чрезмерного возбуждения.
- Тормозным медиатором у клетки Реншоу является глицин.

- **Торможение безусловное** – врожденные виды торможения условных и безусловных рефлексов, которые не надо вырабатывать (запредельное, латеральное).
- **Торможение внешнее** (син. латеральное) – торможение рефлекса другими, внешними по отношению к первому, раздражителями.



• ТОРМОЖЕНИЕ В ЦНС

- а) Возвратное торможение по Реншоу
- б) Латеральное торможение
- г) Реципрокное торможение
- В - возбуждение
- Т - торможение
- Стрелки указывают направление движения нервного импульса




- Нервные импульсы, возникающее при возбуждении тормозных нейронов, не отличаются от потенциалов действия обычных возбуждающих нейронов.
- Однако в нервных окончаниях тормозных нейронов под влиянием этого импульса выделяется медиатор, который не деполяризует, а, наоборот, гиперполяризует постсинаптическую мембрану. Эта гиперполяризация регистрируется в форме тормозного постсинаптического потенциала (ТПСП) - электроположительной волны.
- *ТПСП ослабляет возбудительный потенциал и препятствует тем самым достижению критического уровня деполяризации мембраны, необходимого для возникновения распространяющегося возбуждения.*
- Постсинаптическое торможение можно устранить стрихнином, который блокирует тормозные синапсы.

Посттетаническое торможение

- Возникает в случае, если после окончания возбуждения в клетке возникает сильная гиперполяризация мембраны.
- Возбуждающий постсинаптический потенциал в этих условиях оказывается недостаточным для критической деполяризации мембраны, и генерации распространяющегося возбуждения.
- Причина такого торможения в том, что следовые потенциалы способны к суммации, и после серии частых импульсов возникает суммация положительного следового потенциала.

СООТНОШЕНИЕ ФАЗ ВОЗБУДИМОСТИ
С ФАЗАМИ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ




Пессимальное торможение

- Возникает в возбуждающих синапсах в результате сильной деполяризации постсинаптической мембраны под влиянием слишком частых **импульсов** (*как пессимум в нервно-мышечном препарате*).
- К пессимальному торможению особо склонны промежуточные нейроны спинного мозга, нейроны ретикулярной формации.


Пресинаптическое торможение

- *Пресинаптическое торможение локализуется в пресинаптических терминалях перед синаптической бляшкой.*
- На пресинаптических терминалях располагаются окончания аксонов других нервных клеток, образующих здесь аксо-аксональные синапсы. Медиаторы их деполяризуют мембрану терминалей и приводят к снижению возбудимости ткани (при длительном действии на нее возбуждающего стимула). Это обуславливает частичную или полную блокаду проведения по нервным волокнам возбуждающих импульсов, идущих к нервным окончаниям.
- Пресинаптическое торможение обычно длительное.

Синапсы на нейроне



ПРЕСИНАПТИЧЕСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ



**1 - аксон тормозного
нейрона**

**2 - аксон возбуждающего
нейрона**

**3 - постсинаптическая
мембрана альфа-мото-
нейрона**

Примеры нарушения торможения в ЦНС

- **НАРУШЕНИЕ ПОСТСИНАПТИЧЕСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ:**
- СТРИХНИН → БЛОКАДА РЕЦЕПТОРОВ ТОРМОЗНЫХ СИНАПСОВ;
- СТОЛБНЯЧНЫЙ ТОКСИН → НАРУШЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТОРМОЗНОГО МЕДИАТОРА
- **НАРУШЕНИЕ ПРЕСИНАПТИЧЕСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ:**
- ПИКРОТОКСИН → БЛОКАДА ПРЕСИНАПТИЧЕСКИХ СИНАПСОВ

ПРИНЦИПЫ КООРДИНАЦИИ РЕФЛЕКТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 1. РЕЦИПРОКНОСТИ;**
- 2. ОБЩЕГО КОНЕЧНОГО ПУТИ;**
- 3. ДОМИНАНТЫ;**
- 4. СУБОРДИНАЦИИ;**
- 5. ОБРАТНОЙ АФФЕРЕНТАЦИИ.**


- Процессы возбуждения и торможения в ЦНС не остаются только в тех центрах, где они вызваны, а распространяются **(иррадиируют)** на другие нервные центры, а также вызывают **(индуцируют)** друг друга в сопряженно работающих центрах.
- Возбуждение и торможение движутся в пространстве ЦНС и во времени. Законы движения возбуждения и торможения определяют **координацию** т.е. согласованное течение всей сложной рефлекторной деятельности организма.

- В норме распространение иррадиированной волны возбуждения ограничивается торможением, которое и определяет течение возбуждения в пространственно определенных участках нервной системы.
- Этот процесс взаимного ограничения возбуждения и торможения был назван ***законом концентрирования возбуждения и торможения.***
- Иррадиация и концентрация нервных процессов усложняется индукцией → наведением в нервных центрах, одновременно работающих с возбужденным или заторможенным в данный момент, противоположного процесса.

Реципрокная иннервация

- Для центров безусловно-рефлекторной деятельности взаимная индукция наиболее рельефно выступает в центрах сопряженно работающих сгибателей и разгибателей конечностей.
- Установлен закон т.н. реципрокной (соотносительной) иннервации мышц-антагонистов → **мышцы антагонисты не противодействуют друг другу в работе, а содействуют - в то время, когда происходит сокращение сгибателей, соответствующие им разгибатели расслабляются.**
- *Данный эффект обусловлен тем, что при возбуждении центров сгибателей в центрах разгибателей одноименной стороны индуцируется процесс торможения.*

ПРИНЦИП РЕЦИПРОКНОСТИ [СОПРЯЖЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ]



Принцип общего поля


- Если иметь в виду только чувствующие нейроны, несущие импульсы к спинному мозгу, то их количество примерно в 5 раз превышает число мотонейронов.
- Если же учесть количество вставочных нейронов, которые по существу тоже относятся к воспринимающим раздражение нейронам ЦС, то количество воспринимающих и анализирующих раздражение внешней среды нервных клеток колоссально возрастает по сравнению с числом нейронов-исполнителей - мотонейронов, сосудодвигательных, секреторных, трофических и т.д..

- ЦНС можно представить в качестве "воронки", с широким входным отверстием, куда поступают раздражения с различных рецепторов, и узким выходным отверстием - узким пучком эффекторных нейронов, через которые возбуждение покидает НС.
- В эту воронку одновременно вступают импульсы, возникающие при раздражении многих рецепторов. *Все они "претендуют" на то, чтобы вызвать возбуждение одной и той же группы мотонейронов, использовать их для осуществления рефлекторного акта.*


Принцип общего конечного пути

- НС имеет такое строение, что по необходимости волны возбуждения сталкиваются между собой и к исполнительным механизмам может быть проведен только результат столкновения разнообразных импульсов возбуждения.
- *Актуальным становится самый сильный раздражитель.*
- Принцип общего поля обеспечивает использование одних и тех же исполнительных механизмов - мотонейронов с их рабочей периферией - в разнообразных направлениях, для разных целей.
- Например, передние конечности животных могут быть использованы и для защитных реакций, и для почесывания, плавания. Человек еще использует верхние конечности для письма, жестикуляции, рисования, игры на музыкальных инструментах и т.д.

ПРИНЦИП ОБЩЕГО КОНЕЧНОГО ПУТИ




Принцип общего конечного пути в спинном мозге



Принцип обратной связи

- В осуществлении рефлекторных реакций и их координации огромное значение принадлежит обратной связи, которая осуществляется в результате раздражения проприорецепторов, осморецепторов и др. *Импульсы, текущие от них в центры, сигнализируют о степени выполнения действия, могут усилить или затормозить осуществляемый рефлекс.*
- Положительные обратные связи имеются в тех случаях, когда импульсы с периферии, возникающие в результате какой-либо рефлекторной реакции, ее усиливают.
- Отрицательные → когда эти импульсы угнетают рефлекторную реакцию.
- Чаще всего отрицательные и положительные обратные связи сосуществуют.
- Например, вторичные афферентные импульсы, возникающие при осуществлении сокращения скелетной мускулатуры, вызывают или усиливают возбуждение одних центров, и тормозят другие.

ПРИНЦИП ОБРАТНОЙ АФФЕРЕНТАЦИИ



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМИНАНТЫ

(по А.А.Ухтомскому, 1931)

- **Доминанта** - временно господствующий рефлекс или поведенческий акт, которым трансформируется и направляется для данного времени при прочих равных условиях работа прочих рефлекторных дуг, рефлекторного аппарата и поведения в целом

Основные признаки доминанты

(по А.А.Ухтомскому)

- 1. Повышенная возбудимость доминантного центра;
- 2. Стойкость возбуждения в доминантном центре;
- 3. Способность суммировать возбуждения, тем самым подкрепляя свое возбуждение посторонними импульсами;
- 4. Способность тормозить другие текущие рефлексы на общем конечном пути;
- 5. Инертность доминантного центра.

- **Пример проявления активности доминантного очага → обнимательный рефлекс у весенних лягушек-самцов.**
- **За счет сокращения сгибателей передних конечностей самец крепко обхватывает самку, удерживая ее в таком положении в течение всего периода метания икры, который может продолжаться до 10 дней.**
- **Доминантный очаг этот тормозит все другие центры, поэтому нанесение раздражения на кожу нижних конечностей самца не вызывает отдергивания лапки, а усиливает сгибание передних лап.**

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦНС

1. *Анатомо-клинический*
2. *Наблюдения*
3. *Раздражения*
4. *Экстирпации*
5. *Регистрации электропотенциалов (ЭЭГ)*
6. *Компьютерная томография
(рентгеновская, ЯМР, магнитная)*
7. *Исследование навязанного и
естественного поведения*
8. *Метод условных рефлексов.*

Основные ритмы ЭЭГ


Таблица 2. Характеристика параметров электроэнцефалограммы и условия регистрации различных ритмов

Наименование ритма	Частота, Гц	Амплитуда, мкВ	Условия регистрации ритма
Альфа-ритм	8–13	50	В состоянии умственного и физического покоя с закрытыми глазами
Бета-ритм	13–30	20–25	Эмоциональное возбуждение, умственная и физическая деятельность; при нанесении раздражений
Гамма-ритм	> 35		
Тета-ритм	4–8	100–150	Сон, умеренные гипоксия и наркоз; при некоторых заболеваниях
Дельта-ритм	0,5–3,5	250–300	Глубокий сон, наркоз и гипоксия; поражения коры больших полушарий

Бета-ритм




Альфа-ритм



Тета-ритм




Дельта-ритм



Судорожные разряды





**Картирование потенциалов ЭЭГ,
зарегистрированных со скальпа здорового
человека.**




Проведение фМРТ исследования у ребёнка.
Показана фиксация головы, положение рук
при выполнении психологического теста



Визуализация нейрональной активности с помощью фМРТ при проведении психологических тестов.

А – сканограмма больших полушарий головного мозга здоровых лиц при успешном подавлении поведенческой реакции, вызванной появлением необычного слайда в ходе проведения Go/No-Go теста. Показан участок, активность которого значительно превышает уровень активации у лиц с

СДВГ




Спинной мозг


- Это наиболее простой, примитивный по строению и физиологическим функциям отдел ЦНС.
- Спинной мозг представляет собой своеобразный симметричный орган, построенный из однозначных в структурном отношении сегментов, состоящих из серого и белого вещества и связанных с ними двух задних и двух передних корешков.
- Задние корешки - состоят из чувствительных проводников, передние - из двигательных (закон Белла-Мажанди).
- В спинном мозгу находятся клеточные тела мотонейронов, иннервирующих все скелетные мышцы (за исключением лица) и тела нейронов, направляющих свои волокна к ганглиям вегетативной нервной системы.

Закон Белла - Мажанди

- **Вентральные**
(передние) корешки
содержат
эфферентные
двигательные
(выходящие) волокна,
а **дорсальные**
(задние) корешки
содержат
афферентные
чувствительные
(входящие) волокна



Сегменты спинного мозга



- 8 шейных ($C_1 - C_8$)
- 12 грудных ($Th_1 - Th_{12}$)
- 5 поясничных ($L_1 - L_5$)
- 5 крестцовых ($S_1 - S_5$)
- 1-3 копчиковых ($Co_1 - Co_2$)

- **В спинном мозге расположены:**


- центр диафрагмального нерва (3-4 шейный сегмент),
- центры мускулатуры верхних конечностей (5-8 шейные сегменты),
- центры мускулатуры груди, живота и спины (грудной отдел),
- центры нижних конечностей (поясничное утолщение), вегетативные центры (грудной и сакральный отделы).

- **Все эти центры являются ответственными за множество рефлекторных актов, присущих спинному мозгу, и за осуществление тонической функции.**

Нейроны спинного мозга


- Двигательные или мотонейроны (3%):
 - - альфа-мотонейроны
 - - фазические (быстрые)
 - - тонические (медленные)
 - - гамма-мотонейроны
- Вставочные или интернейроны (97%)

ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА



- РЕФЛЕКТОРНАЯ
- ПРОВОДНИКОВАЯ
- ТОНИЧЕСКАЯ

ТОНИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ СПИННОГО МОЗГА. ГАММА-МОТОРНАЯ ПЕТЛЯ




Основные рефлексy спинного мозга


- Рефлексy растяжения - в основном разгибательные - рефлексy позы, толчковые (прыжок, бег) рефлексy
- Сгибательные рывковые рефлексy
- Ритмические рефлексy (чесательный, шагательный)
- Позиционные рефлексy (шейные тонические рефлексy наклона и положения)
- Вегетативные рефлексy
-

Рефлексы спинного мозга


Коленный рефлекс



Ахиллов рефлекс





Подошвенный рефлекс в патологии (рефлекс Бабинского) и в норме





Рефлексы спинного мозга


Сгибательный рефлекс предплечья




Разгибательный рефлекс предплечья



Брюшной рефлекс





ПРОВОДЯЩИЕ СИСТЕМЫ СПИННОГО МОЗГА

- **ВОСХОДЯЩИЕ ПУТИ (ЭКСТЕРО-ПРОПРИО-ИНТЕРОЦЕПТИВНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ)**
- **НИСХОДЯЩИЕ ПУТИ (ЭФФЕКТОРНЫЕ, ДВИГАТЕЛЬНЫЕ)**
- **СОБСТВЕННЫЕ (ПРОПРИОСПИНАЛЬНЫЕ) ПУТИ (АССОЦИАТИВНЫЕ И КОМИССУРАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА)**

ВОСХОДЯЩИЕ ПУТИ СПИННОГО МОЗГА

- Тонкий пучок Голля (fasciculus gracilis) - от нижней части тела - проприоцепторы сухожилий и мышц, часть тактильных рецепторов кожи, висцерорецепторы
- Клиновидный пучок Бурдаха (fasciculus cuneatus) - от верхней части тела - те же рецепторы
- Латеральный спиноталамический тракт → болевая и температурная чувствительность
- Вентральный спиноталамический тракт → тактильная чувствительность
- Дорсальный спинно-мозжечковый тракт Флексига - (дважды перекрещенный) → проприоцепция
- Вентральный спинно-мозжечковый тракт Говерса - (неперекрещенный) → проприоцепция

Нисходящие пути спинного мозга

- Латеральный кортикоспинальный пирамидный тракт - двигательные зоны коры - перекрест в продолговатом мозге - мотонейроны передних рогов спинного мозга → произвольные двигательные команды
- Прямой передний кортикоспинальный пирамидный тракт - перекрест на уровне сегментов - команды те же, что и у латерального тракта
- Руброспинальный тракт - красные ядра - перекрест-интернейроны спинного мозга → тонус мышц-сгибателей
- Вестибулоспинальный тракт - вестибулярные ядра Дейтерса - перекрест - мотонейроны спинного мозга → тонус мышц-разгибателей
- Ретикулоспинальный тракт - ядра ретикулярной формации - интернейроны спинного мозга → регуляция тонуса мышц
- Тектоспинальный тракт - ядра покрышки среднего мозга - интернейроны спинного мозга → регуляция тонуса мышц

- **Спасибо за внимание!**

- **УСПЕХОВ!**