

**Особенности
строения
грибной
клетки**



Грибы — это гетеротрофные организмы, лишенные возможности синтезировать органические вещества. Они усваивают их из разнообразных остатков растительного или животного происхождения или живых тканей других организмов. Это обуславливает образ жизни и особенности строения грибов.



Строение грибной клетки

Отличие грибной клетки

Грибная клетка отличается от клеток других растений не только по форме, но и по содержанию. Необычен у этой клетки химический состав. Оболочку ее составляет грибная клетчатка, в состав которой входит фунгин. Фунгин придает грибной клетке большую прочность. Также грибная клетка имеет наличие крахмала — гликогена. Клетки растений всегда содержат пластиды, в то время как у грибов пластид нет. Резервным веществом у большинства растений служит полисахарид крахмал, а у основной массы грибов - гликоген.



Сходства грибной клетки с растениями, животными

С растениями их сближает:

- наличие хорошо выраженной клеточной стенки;
- неподвижность в вегетативном состоянии;
- размножение спорами;
- способность к синтезу витаминов;
- поглощение пищи путем всасывания (адсорбции).



Общим с животными является:

- гетеротрофность;
- наличие в составе клеточной стенки хитина, характерного для наружного скелета членистоногих;
- отсутствие в клетках хлоропластов и фотосинтезирующих пигментов;
- накопление гликогена как запасного вещества;
- образование и выделение продукта метаболизма.

***Спасибо за
внимание!***

A close-up photograph of a plant with small, dried, reddish-brown flowers and seed heads. The background is a soft, out-of-focus mix of green foliage and a bright blue sky, creating a bokeh effect. The text "Спасибо за внимание!" is overlaid in the center in a bold, black, italicized font.