

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
вперёд



СОДЕРЖАНИЕ

отряды

тест

фото

об
авторе



фото

тест

об
авторе

первозвери

сумчатые

насекомоядны
е

грызуны

зайцеобразны
е

хищные

рукокрылы
е

ластоногие

хоботные

парнокопытны
е

китообразны
е

непарнокопытны
е

приматы


Первозвери

Этот отряд насчитывает 6 видов, среди которых утконос, два вида ехидн и три вида проехидн. Они обитают в Австралии, Тасмании, Новой Гвинее. Это древние примитивные млекопитающие, имеющие ряд признаков пресмыкающихся. Температура тела непостоянная: от 22°C до 25°C у утконоса или 30° - у ехидны. Размножаются, откладывая яйца, покрытые ороговевшей скорлупой, которые насиживают или вынашивают в кожистой сумке на брюхе.

Все первозвери являются редкими животными и подлежат охране.




СОДЕРЖАНИЕ




Сумчатые

Современных представителей сумчатых Млекопитающих насчитывается около 250 видов. Живут в Австралии, Новой Гвинее и близлежащих островах, в Америке. На брюхе у них имеется складка кожи в виде кармана или сумки, куда помещаются недоразвитые детеныши и где протекает их дальнейшее развитие. Кенгуру гигантский, древесный, каменный, кустарниковый и другие – все они питаются растительной пищей и передвигаются прыжками. Сумчатый крот живет в почве, роет норы, питается насекомыми, их личинками, червями. Сумчатая кошка – древесный хищник, ловит различных птиц, грызунов. Сумчатый медведь коала живет на эвкалиптах, питается листьями. Опоссум, размером с кошку, питается как растительной так и животной пищей.



СОДЕРЖАНИЕ




Насекомоядные

Это зверьки средней и мелкой величины с вытянутой мордочкой, заканчивающейся хоботком: *ежи, кроты, выхухоли, землеройки, бурозубки*. Общее число известных видов – около 400.




Распространены на земле широко. Отсутствуют в Антарктиде, Австралии, в Южной Америке Выхухоль обыкновенная (самая крупная) – длиной до 22 см с не менее длинным чешуйчатым хвостом, сжатым с боков. Она приспособилась к полуводному существованию, питается растительной и животной пищей.

У всех насекомоядных, кроме ежей, короткий шерстный покров. Самый маленький представитель – землеройка-крошка, длиной до 4 см.



СОДЕРЖАНИЕ



Рукокрылые

Около 1 тыс. видов зверей, способных к длительному машущему полету, входят в отряд рукокрылых, распространенных по всему земному шару, кроме Арктики и Антарктиды. Наиболее крупные представители с размахом крыльев до 180 см обитают в тропиках Азии, Австралии, Африки и относятся к подотряду крыланов. Питаются сочными плодами. Более мелкие виды относятся к подотряду летучих мышей. Всех рукокрылых объединяет наличие кожистой перепонки, образующей крыло между передними и задними конечностями и хвостом. В спокойном состоянии летучие мыши висят вниз головой, так же они спят, рожают детенышей, зимуют. Обитатели России: *ушаны, вечерницы, кожаны, нетопыри* и др.



СОДЕРЖАНИЕ

Зайцеобразные



Заяц-русак.

Отряд включает около 65 видов, среди которых *зайцы, кролики, пищухи*, живущие на всех материках, кроме Антарктики и Австралии. Для зайцеобразных характерно наличие двух пар резцов на верхней челюсти, расположенных в два ряда.

В отряде зайцеобразных два семейства – заячьи и пищуховые. Представители семейства заячьих обитают в Европе, Азии, Америке, на юге Африки. Длина их тела – от 30 до 75 см. Передвигаются прыжками. Задние конечности немного длиннее передних, уши длинные, хвост короткий. Наиболее распространены зайцы: в Северной Америке – чернохвостые, белохвостые; в Европе и Азии – беляк, русак, толай; в южных областях Африки – капский, кустарниковый.


СОДЕРЖАНИЕ

Хищные

Современных хищных зверей известно около 240 видов. Все они имеют стройное тело, мощные подвижные и способные к быстрому бегу конечности, небольшую голову с короткой мускулистой шеей.

Объединяет всех хищников сходство в строении зубного аппарата и способе питания.

Общее число зубов у различных видов от 28 до 48. Особое значение имеют *хищные зубы*. Хищные звери не встречаются только в Антарктике. Отряд включает 7 семейств, их них наибольшее значение имеют собачьи, медвежьи, кошачьи, куньи. Представители: *шакал, песец, белый, бурый и черный медведи, пантера, рысь, леопард, тигр, лев, ирбис и другие.*



СОДЕРЖАНИЕ

Парнокопытные

Этот отряд объединяет *свиней, баранов, коз, антилоп, бегемотов, жирафов, верблюдов*. Название отряду дано за наличие у этих животных развитых третьего и четвертого пальцев.


Второй и пятый пальцы недоразвиты, а первый редуцирован. Животные в основном средние и крупные по величине. Парнокопытные – жвачные животные со сложным строением желудка, состоящего из четырех отделов: книжки, сычуга, сетки и рубца. Морда удлинена, на голове у большинства из них имеются рога. Распространены по всем материкам, кроме Антарктиды и Австралии. Общее число известных видов около 200, объединенных в подотряды: Нежвачные и Жвачные.




СОДЕРЖАНИЕ

Непарнокопытные

Этот отряд объединяет 16 видов крупных животных. Общие признаки: конечности у большинства из них снабжены копытами, образовавшимися за счет мощного развития среднего пальца в сравнении с остальными. В скелете непарнокопытных отсутствуют ключицы. Питаются эти животные только растительной пищей. Отряд включает три семейства: Тапиры, Лошади, Носороги.



СОДЕРЖАНИЕ



Хоботные

В отряде два вида слонов с несколькими подвидами. Индийский слон обитает в Индии, имеет высоту тела до 3м и массу более 5 т.

Африканский слон живет в Африке, высотой до 3,5м и массой 3-5 т.

В строении тела слонов наблюдается присущая только этим животным особенность – мощные длинные бивни в ротовой полости, образовавшиеся из удлиненных резцов верхней челюсти. Половозрелыми слоны становятся к 12 годам

Вынашивание детенышей длится 22 месяца.

Слониха рождает примерно 1 раз в 4 года одного слоненка массой около 100 кг и ростом около 1 м. Слоны травоядны.




СОДЕРЖАНИЕ


Ластоногие

Представители отряда ластоногих – полуводные млекопитающие: *тюлени, моржи, морские котики, сивучи* и т.д. Животные средней и крупной величины: длиной от 1,2 до 6м и массой от 40 до 3500 кг. Тело вытянутое, обтекаемое. Относительно маленькая голова, зубы острые, ушные отверстия при погружении в воду закрываются.

Конечности превращены в ласты. Хвост короткий. Подкожный слой жира около 10 см. Питаются рыбой, ракообразными, моллюсками. На суше отдыхают, размножаются, выкармливают потомство. Раз в году рожают по одному детенышу. Половозрелыми становятся к 3-7 годам. Наибольших размеров достигает антарктический морской слон (7м, 3,5т).



СОДЕРЖАНИЕ



Китообразные


Представители этого отряда – самые крупные в мире водные млекопитающие.

Форма их тела обтекаемая, кожа не имеет шерстного покрова, кожные железы отсутствуют, передние


конечности в виде плоских ласт. Эти животные могут находиться под водой 15-90 мин.



Китообразные обладают способностью к эхолокации и легко ориентируются даже на большой глубине. Под кожей у них накапливается слой жира толщиной 18-50 см, обеспечивающий постоянство температуры. Самый крупный представитель отряда – синий кит (33м, 150 т), самый маленький кит – 1,1м, 30 кг. Киты размножаются 1 раз в 2 года. Отряд Китообразные подразделяется на два подотряда: Зубатые и Беззубые.




СОДЕРЖАНИЕ




Приматы

Приматы разнообразны по величине тела и внешнему облику. Самые мелкие из них высотой 9-12 см (долгопяты, тупайи), крупные – до 200 см (горилла). У них значительно развиты полушарии головного мозга. Конечности пятипалые, хватательные. Большой палец кисти противопоставлен остальным. Конечные фаланги пальцев снабжены ногтями, глаза направлены вперед.

Органы обоняния в жизни приматов не играют большой роли и недоразвиты, слух и зрение, наоборот, развиты хорошо.




СОДЕРЖАНИЕ



Грызуны

Отряд грызуны насчитывает около 2000 тыс. видов, которые не встречаются только в Антарктиде. Это мелкие и средние по величине зверьки, самый крупный представитель – водосвинка, длиной до 1,5 м и массой до 60 кг.



Самый мелкий – тушканчик трехпалый карликовый, длиной 4-5 см. Всех грызунов объединяет общее строение зубов: по два резца в верхней и нижней челюсти, а у некоторых видов и ко-ренные не имеют корней, растут в течение всей жизни. Грызуны отличаются высокой плодовитостью, быстрым ростом и ранним половым созреванием. Известно более чем 40 семейств грызунов. Наиболее распространенными являются Беличьи, Мышиные, Бобровые.




СОДЕРЖАНИЕ

ФОТО

**приступить
к
просмотру**



СОДЕРЖАНИЕ





Одногорбый верблюд.



Орангутан.




Кабан



Калифорнийский морской лев.

СОДЕРЖАНИЕ



Слоны



Белка.



Жёлтый суслик.

СОДЕРЖАНИЕ



Большая панда



Выдра




Росомаха



Серый волк.

Горностай



Белый медведь



Лисец

Лисица





Лошади-тяжеловозы



Осёл

СОДЕРЖАНИЕ





Пищуха



Бобр.




Шиншилла



Заяц-беляк.




Сурок баябак с семейством.



Африканские слоны на водопое.



СОДЕРЖАНИЕ



ТЕСТ "ПРЕДСТАВИТЕЛИ"

**приступить
к
тесту**


Носорог – это представитель отряда...

Парнокопытные

Непарнокопытные

Первозвери

СОДЕРЖАНИЕ



Температура тела утконоса...

от 22°C до 25°C

от 43°C до 44°C

от 23°C до 36°C

СОДЕРЖАНИЕ

Тупай – *представитель отряда...*

Зайцеобразные

Приматы

Рукокрылые

СОДЕРЖАНИЕ

Беличьи – одно из семейств отряда ...

Насекомоядные

Хоботные

Грызуны

СОДЕРЖАНИЕ

Сивуч – *представитель отряда...*

Ластоногие

Китообразные

Приматы

СОДЕРЖАНИЕ

Водосвинка – *представитель отряда...*

Рукокрылые

Ластоногие

Грызуны

СОДЕРЖАНИЕ




! МОЛОДЕЦ !

следующий вопрос



ОШИБКА




! МОЛОДЕЦ !

следующий вопрос



ОШИБКА



! МОЛОДЕЦ !

следующий вопрос




! МОЛОДЕЦ !


следующий вопрос




ОШИБКА



ОШИБКА



ОШИБКА



! МОЛОДЕЦ !

следующий вопрос




! МОЛОДЕЦ !

следующий вопрос



ОШИБКА







Прекрасная работа !!!

**завершить
тест**

Значок





Презентацию подготовила
ученица 7 класса МОУ "Лицей №43"

Родина Марина

Изучайте биологию с улыбкой!!! Желаю успехов!



СОДЕРЖАНИЕ

Саранск, 2007