

Птахи


- Ряд Куроподібні
- Ряд Гусеподібні
- Ряд Соколоподібні





Ряд Куроподібні

Куроподібні— ряд птахів, що містить близько 250—270 видів.

- 
- The background of the slide is a dark, reflective surface, possibly water, covered with numerous fallen autumn leaves. The leaves are in various stages of decay, showing shades of red, orange, and yellow. Some leaves are partially submerged, creating ripples and reflections on the dark surface. The overall mood is autumnal and serene.
- **Куроподібні**
 - — ряд птахів, що містить близько 250—270 видів, поширених по всьому світу. Ряд Куроподібні — типові виводкові птахи, поширені на всіх (крім Антарктиди) материках.
 - До них належить свійська курка (найпоширеніший птах у світі). Заради м'яса і яєць виведено багато різноманітних порід курей. У лісах на півночі України поширені тетерук і глухар. Степи й поля нашої країни населяють сіра куріпка та перепілка.

Родина Фазанові

Фазанові — родина птахів з ряду куроподібних.

Налічує у собі 4 підродини.

Птах має довжину тулуба до 85 см, вагу до 2 кг,

довгий клиноподібний хвіст з 18 пір'їв. Пір'я на тілі у

самців фазанів яскраве та красиве різного кольору -

золотавого, темно-зеленого, помаранчевого, фіолетового.





Родина Зубчастодзьобі куріпки

Зубчастодзьобі куріпки
(*Odontophoridae*) — родина птахів
ряду куроподібних, що містить 9
родів і 31 вид.

Перепілка

Загалом перепілки —
одні з найменших
представників ряду
куроподібних, їх маса
складає 90-130 г, довжина
тіла — 16-20 см. Це
зазвичай невеликі пухкі
сухопутні птахи,
харчуються насінням, але
інколи полюють на комах
та подібних дрібних
тварин.



Куріпки



Куріпки — це осілі птахи Старого Світу. За розміром середні (25-35 см завдовжки), менші за фазанів та більші за перепілок. Походять з Європи, Азії і Африки. Гніздяться на землі, харчуються насінням. Кілька видів, такі як азіатський кеклик та сіра куріпка, інтродуковані та дуже поширені в Америці. Це популярні птахи для полювання.

Індички



Індички мають великі розміри, важать до 8 кг (самець). Довжина самця 100—110 см, самиці 85 см. Ноги довгі, міцні. Верхня сторона індички буро-жовта і буро-руда, з металевим блиском, пір'я з чорними облямівками. Хвіст бурий з чорними хвилястими смужками.

Блідіше і менше забарвлена самка. Харчується рослинною і тваринною їжею — горіхами, жолудями, зернами і різними плодами, а також комахами. Гніздяться на землі. У квітні самка кладе від 10 до 15 і навіть 20 яєць і самовіддано їх охороняє.



Ряд Гусеподібні

Гусеподібні — птахи середнього та великого розміру. Маса найбільшого представника ряду лебедя-шипунa сягає 12 кг. У дикій природі зустрічаються на півночі України, на озерах Полісся.



Казарка червоновола

Казарка червоновола – водоплавний птах родини качкових. В Україні зустрічається під час сезонних міграцій та на зимівлі. Забарвлення строкате. Маса тіла: 890–1700 г, довжина тіла: 430–560 мм, розмах крил: 110–113 см. Вид занесено до Червоної книги України

Огар



Трохи більший за свійську качку. Загальний тон оперення рудий. Маса тіла – 9,8–1,5 кг, довжина тіла – 55–62 см, розмах крил – 1047–1120 мм. Чисельність в Європі становить 19—33 тис. пар. Перелітний птах. У місцях гніздування з'являється у другій половині березня. У кладці 8–12 яєць. Насиджує самка (25–30 діб). Живиться рослинною (проростки злаків та осок, зерно) та тваринною (комахи, молюски) їжею. Включено до Червоної книги України.

Птах роду
качка родини
качкових. В
Україні
гніздовий,
перелітний
птах.

Довжина
близько 70 см,
вага 750 — 1
150 г.

Шилохвіст



Поширена в
холодному і
помірному поясах
Європи, Азії і
Північної Америки.
В Україні зрідка
гніздиться на
Поліссі і в
північних районах
Лісостепу,
поодинокими
парами на о-вах
чорноморського
узбережжя.

www.maxim.art.prv.pl
Мисливський птах.

Чернь червонодзьоба

Чернь червонодзьоба – середнього розміру ниркова качка родини качкових. Один із 3-х видів роду червонодзьоба чернь, єдиний вид цього роду в фауні України. В країні гніздовий, перелітний, зимуючий вид. Довжина тіла: 530–570 мм. Маса тіла самця: 1–1,55 кг, самки: 0,88–1,32 кг. З води злітає важко, відштовхуючись ногами. Політ швидкий. Звуки — у самця навесні своєрідний неголосний свист, у самки – голосне тріскуче «кіорр-кіорр-кіорр». Чисельність в Європі становить 27—59 тис. пар. На більшій частині ареалу перелітний птах. Включено до Червоної книги України.



Лебідь малий



Лебідь малий, лебідь тундровий — водоплавний птах родини качкових. Один з 7-ми (за іншими джерелами, 6-ти) видів роду; один з 3-х видів роду у фауні України. Маса — 4,9–6,5 кг, довжина тіла — 107–132 см, розмах крил — 173–200 см. Кладка з 1—5 яйця. Насиджування триває 29—30 днів. Пташенята виводкового типу, вкриті білодо-сірим пухом. Через 40—45 днів молоді лебеді вже можуть літати. Включено до Червоної книги України.

Чирянка мала

Мала чирянка, чирок-свистунок— одна з найчисленніших качок, що зустрічаються в Європі. Найдрібніша з європейських видів качок. Довжина тіла: 34—37 см. Розмах крил: 54-59 см. Маса: 257—440 г. Кількість яєць: 8—11. Висиджування: 21—23 дні. Пташенята стають на крило: з 25—30 днів. Малі чирянки харчуються як рослинними, так і тваринними кормами.





Соколоподібні

Ряд включає у себе хижих птахів, багатьом з яких зараз загрожує вимирання. Більшість соколоподібних птахів середнього розміру: довжина тіла 30-60 см, маса від 200 г до 1,2 кг. Можуть, у повітрі, розвинути швидкість до 100 км/год. У фауні України 33 види. Більшість соколоподібних — перелітні.



Шуліка рудий

Родина — Яструбові Один з 2-х видів роду у фауні світу й України. Загальна довжина тіла — до 715 мм, маса тіла — 930–1150 г. Дорослий птах зверху іржасторудий; голова білувата; низ іржасто-рудий з темними рисками; махові пера чорно-бурі.

Скопа



Родина — Скопині
Сучасна чисельність в
Україні становить не
більше 1–2 пар.
Гніздовий перелітний
птиця. Маса тіла — 1,1–2
кг, довжина тіла —
55–70 см, розмах крил
— 145–170 см. Самка
за розмірами дещо
більша від самця, за
зabarвленням не
відрізняється. Верх
бурий з невеликою
плямистістю; низ білий.
Крила знизу сірувато-
білі з чорними кінцями і
темними смугами.

Балабан

Балабан — рідкісний вид великих соколів, із ряду Соколоподібні, родини Соколові. В Україні гніздовий, перелітний, зимуючий вид. Його максимальна довжина 60 см, маса 800-1300 г при довжині крила у самиць, які звичайно більші за самців — 413 мм. Для забарвлення балабанів характерні рудуватий та коричневий кольори. У кладці 2–5 яєць. Насиджування триває біля 30 діб. У виводках 1–5 пташенят. Полюють балабани також на птахів (граків, шпаків, голубів, жайворонків), а подекуди навіть на зайців, беручи їх при самій землі.



Сапсан



Сапсán — хижий птах родини соколових, поширений на всіх континентах, окрім Антарктиди. В Україні — три підвиди: **звичайний**, **кавказький** і **тундровий** він здатний розвивати швидкість понад 322 км/год, або 90 м/с. Сапсан — це великий сокіл: довжина його тіла складає 34-50 см, розмах крил 80-120 см, самки сапсанів є помітно більшими за самців: важать у межах 910—1500 г. Сапсан харчується майже виключно середніми за розмірами й дрібними птахами: горобцями, дроздами, шпаками, голубами, качками.



Кібчик

Кібчик— вид птахів родини Соколові ряду Соколоподібні. В Україні звичайний гніздовий, перелітний птах. Маса самців 0,12–0,19 кг, самок – 0,13–0,20 кг, довжина тіла 27–33 см, довжина крила самців 23,7–25,3 см, самок – 24,0–26,5 см, розмах крил 65–78 см. У кладці 3–6, частіше 4 яйця. Живиться великими комахами, зрідка ловить дрібних гризунів, ящірок. Живиться вдень, незважаючи на латинську назву видової назви "vespertinus" – вечірній.