

Красная книга ХМАО

Подготовили учащиеся
1-г класса
Учитель: Матвеева В.Н.

Содержание

1. История создания Красной книги.
2. Цвета Красной книги.
3. Животные, занесённые в Красную книгу ХМАО.
4. Растения, занесённые в Красную книгу ХМАО.
5. Птицы, занесённые в Красную книгу ХМАО.
6. Охраняемые рыбы ХМАО.
7. Выводы.



Красная книга — это книга об исчезнувших, редких и исчезающих видах растений, животных, грибов. Красный цвет ее обложки как бы предупреждает об опасности, надвигающейся на растения и животных. Название «Красная книга» предложил Питер Скотт — известный английский исследователь, ученый, орнитолог. Начало всемирной «переписи» редких животных и растений было положено а 1948 году, когда Международный союз охраны природы (МСОП) создал комиссию по редким и исчезающим видам животных (а позднее — и видам растений). Шесть лет комиссия собирала о них информацию, а потом приступила к созданию Красной книги. Одновременно составлялся и черный список растений и животных, исчезнувших с лица Земли.

назад

Обозначение страниц Красной КНИГИ

- ❖ **1-виды исчезающие**
- ❖ **2 - виды сокращающиеся**
- ❖ **3 - виды редкие**
- ❖ **4 - виды восстановленные**




Животные из Красной книги ХМАО



[→ далее](#)

БОБР РЕЧНОЙ



БОБРЫ (*Castor*), род грызунов; включает два вида. Бобр европейский (*Castor fiber*) распространен в лесной зоне Евразии, в пойменных лесах лесостепной и степной зон. Бобр канадский (*Castor canadensis*) распространен в Северной Америке, акклиматизирован в Финляндии, завезен на Дальний Восток (Хабаровский край, Камчатка). Оба вида очень схожи. Длина тела бобров 80-100 см, хвоста 30-35 см, масса до 30 кг. Череп мощный, лицевой отдел укорочен.

ОЛЕНИ (плотнорогие), семейство парнокопытных животных подотряда жвачных. Самцы (у северных оленей и самки) имеют рога (у большинства ветвистые), ежегодно сбрасываемые, весной вырастающие вновь. Ок. 30 видов, в Евразии, Сев. Африке, Америке, акклиматизированы в Нов. Зеландии и на ряде островов. Наиболее известны благородный олень, пятнистый олень, лань, косуля, кабарга, лось, северный олень. Объект промысла (мясо, кожа, рога). Численность ряда видов сокращается. 11 видов и 20 подвидов в Красной книге Международного Союза охраны природы и природных ресурсов.

ОЛЕНЬ НОВОЗЕМЕЛЬСКИЙ



россомаха

РОСОМАХА (*Gulo gulo*) — единственный вид хищного зверя рода росомых семейства куньих. Длина тела до 105 см, хвоста до 23 см; масса до 19 кг. Тело массивное, укороченное; лапы мощные, широкие; голова небольшая, с небольшими округлыми ушами. Шерсть лохматая, грубая и длинная. Окраска разнообразная, в основном темно-бурая; две светлые полосы тянутся от затылка по бокам тела.



Росомаха обитает в тайге и лесотундре Евразии и Северной Америки (в тундре самый крупный хищник после волка). Ведет одиночный образ жизни. Широкие лапы с перепонками между пальцами позволяют росомахе с легкостью передвигаться по снегу в поисках добычи. При этом росомаха прекрасно лазает по деревьям и даже может спускаться с них вниз головой. Основу питания составляет падаль: лоси, домашние и дикие олени — остатки добычи волков, медведей. Реже охотится самостоятельно, чаще на больных и раненных зверей. Часть добычи прячет про запас. Гон тянется с апреля по октябрь.



Растения из Красной книги ХМАО.



ВЕНЕРИН БАШМАЧОК



БАШМАЧОК (Cypripedium), род многолетних растений семейства орхидных. Ок. 50 видов, главным образом в умеренном поясе Северного полушария. Некоторые виды декоративны. Венерин башмачок (охраняется в Европе с кон. 19 в., в Красной книге Международного союза охраны природы и природных ресурсов). Под этим же названием в оранжереях разводят тропические орхидеи из других родов.

ЛАНДЫШ МАЙСКИЙ

**ЛАНДЫШ, род
многолетних трав
семейства спаржевых. 1
вид — ландыш майский с
несколькими подвидами,
в Евразии и Сев. Америке.**

**Лекарственное и
декоративное растение.**



Кедр сибирский



КЕДР, род хвойных вечнозеленых деревьев семейства сосновых. 4 вида, в горах Малой и Юго-Западной Азии, в Зап. Гималаях и Северо-Зап. Африке; широко культивируют, в т. ч. в Крыму, на Кавказе, юге Ср. Азии. Древесину применяют в строительстве. Кедром часто называют кедровую сосну.

КЕДРОВАЯ СОСНА, виды деревьев из рода сосна; часто неправильно называется кедром. Наиболее известна кедровая сосна сибирская (сибирский кедр), растущая на северо-востоке Европейской части России и почти по всей Сибири. Высота 35-40 м, диаметр до 1,8 м, живет до 500 лет; обильные урожаи орехов бывают через 5-6 лет. Кедровая сосна европейская охраняется.



Птицы, охраняемые в ХМАО



СТЕРХ



СТЕРХ (белый журавль) (*Grus leucogeranus*), птица семейства журавлиных. Масса тела около 6–8 кг, высота 1,2–1,4 м, размах крыльев 2,3–2,6 м. Самки несколько мельче самцов. Все оперение стерха, за исключением черных концов крыльев, белое; ноги, клюв и передняя часть головы красного цвета.

К образованию пар, которые создаются на всю оставшуюся жизнь, стерхи приступают в возрасте около 6 лет. Обычно самка откладывает 2 яйца. Разница между вылуплением птенцов составляет около 36 часов. Новорожденным свойственна исключительная агрессивность по отношению друг к другу, и если старший птенец оказывается здоровым, младший обречен на гибель. Молодая птица держится с родителями до следующего сезона гнездования.

Гнездится стерх только на территории России, образуя две популяции – западную (обскую), с гнездовым ареалом на севере Тюменской области, и восточную (якутскую), гнездовые участки которой расположены между реками Яна и Алазея.

Беркут (отряд соколообразных, семейство ястребиных)- редкий вид.. Беркут – самый крупный и самый сильный из орлов. Поразительная зоркость, смелость и красота снискали ему славу среди пернатых.

Свои гнёзда беркуты устраивают на больших деревьях, в нишах или уступах отвесных скал. Питаются млекопитающими средней величины (сусликами, сурками, зайцами, лисицами), крупными птицами (тетеревами), а иногда нападает на молодняк копытных животных, барсуков и даже волков. Посещает и падаль во время осеннее - зимних кочёвок.

БЕРКУТ



СОКОЛ - САЙКА



СОКОЛЫ, род хищных птиц семейства соколиных. Длина 21-66 см., самки крупнее самцов. Крылья длинные, заостренные, обеспечивающие быстрый полет. 39 видов, в России 10 видов, в т. ч. кречет, сапсан, балобан, чеглок, пустельги, кобчики. Гнездятся на земле, скалах или высоких строениях, на деревьях занимают гнезда других птиц. Крупные соколы с древности используются как ловчие птицы. Многие виды редки, охраняются.

Краснозобая казарка



КАЗАРКИ (Brantd), род птиц семейства утиных. Включает четыре вида: канадская казарка (Brandt canadensis), белощекая казарка (Brandt leucopsis), черная казарка (Brandt bernicla) и краснозобая казарка (Brantd ruficolhs). К казаркам иногда отнёсят также белолобого гуся и пискульку.


Длина этих птиц до 60 см, весят до 8 кг. Они распространены на севере Евразии и Северной Америки. Краснозобая казарка гнездится только на севере России. Это перелетные птицы, они питаются травянистой растительностью. В связи с малочисленностью охота на казарок запрещена. Два вида занесены в Международную Красную книгу.



The image shows two sturgeon fish lying on a red, textured surface, possibly the deck of a boat. The fish are elongated with a pointed snout and a row of bony scutes along their back. One fish is positioned in the upper half of the frame, and the other is in the lower half. A blue rectangular box with a white border is centered over the image, containing the text 'Охраняемые рыбы ХМАО' in white serif font.

Охраняемые рыбы ХМАО

МУКСУН



МУКСУН, проходная рыба рода сигов. Длина до 75 см, весит до 8 кг. В опресненных водах Сев. Ледовитого океана. Нерест в реках. На п-ове Таймыр — озерная форма. Ценный объект промысла и разведения.


СТЕРЛЯДЬ



СТЕРЛЯДЬ (*Acipenser ruthenus*) — вид рыбы рода осетров. Длина до 125 (обычно 40–60) см, масса до 16 кг (обычно 0,5–2 кг). Нижняя губа, в отличие от шипа, посередине прервана. От других осетров стерлядь отличается большим числом боковых жучек (как правило, более 50) и бахромчатыми усиками. Стерлядь изменчива по форме, некоторые исследователи выделяют две формы стерляди: тупорыльную и острорыльную.


Стерлядь распространена в реках бассейнов Черного, Каспийского, Балтийского, Белого и Карского морей. Это типично пресноводная рыба, но в Волге встречается полупроходная форма, которая нагуливается в Северном Каспии. Эту форму стерляди иногда выделяют в отдельный вид. Стерлядь зимует в речных ямах, весной поднимается вверх по течению до нерестилищ.


НЕЛЬМА



НЕЛЬМЫ (Stenodus), род рыб семейства сигов, включает единственный вид и два подвида — белорыбица и собственно нельма; длина до 1,3 м, масса до 40 кг. Нельмы распространены в бассейне Северного Ледовитого океана от реки Поной до реки Макензи. Собственно нельма (Stenodus leucichthys nelma) — довольно крупная рыба с серебристой чешуей. В Америке нельму называют незнакомкой. Эти рыбы предпочитают селиться в реках, они не любят соленой воды и потому придерживаются опресненных приустьевых пространств в океане. В сибирских реках нельма совершает значительные миграции от устья к верховью. Она очень медленно растет и поздно становится половозрелыми — самки на 8-10 году жизни. Икра мелкая. Нельмы иногда скрещиваются с сигами. Они являются объектом промысла и разведения.

ОСЁТР СИБИРСКИЙ





Смотрю на глобус – шар земной.
И вдруг вздохнул он, как живой.
И шепчут мне материки: “Ты
береги, нас, береги”.

В тревоге рощи и леса, роса на
травах, как слеза.

И тихо просят родники: “Ты
береги нас, береги”.

Остановил олень свой бег: “Будь
Человеком, человек.

В тебя мы верим, не солги, ты
береги нас, береги”.

Грустит глубокая река, свои теряя
берега.

И слышу голос я реки: “Ты береги
нас, береги”.

Смотрю на глобус, шар земной,
такой прекрасный и родной.

И шепчут губы: “Не солгу, я
сберегу вас, сберегу”.

Е. Шкловский

