

Урок по предмету окружающий мир: «В царстве грибов»



Выполнила: учитель начальных
классов ГБОУСОШ № 62 Санкт-
Петербурга

Михайлова Н.Н.

Проверила: Суханова К.Д.



Я под шапкою цветной
На ноге стою одной,
У меня свои повадки,
Я всегда играю в
прятки...



Отгадай загадку



Белый
гриб

Мухомо
р

Лисички



Бледная
поганка

Подосиновик



Белый
гриб

Мухомо
р

Лисички



Бледная
поганка

Подосиновик



Белый
гриб

Лисички

Мухомо
р



Бледная
поганка

Подосиновик



Белый
гриб

Мухомо
р

Лисички



Бледная
поганка

Подосиновик



Белый
гриб

Мухомо
р

Лисички



Бледная
поганка

Подосиновик



Определи части гриба

НОЖКА

грибница

ШЛЯПКА



Узнай грибы, распредели их по группам:

ядовитые

съедобные



Найди названия съедобных грибов

Лисичка

Сыроежка

Бледная поганка

Белый гриб

Подосиновик

Мухомор



Грибы Красной книги России



Трутовик листоватый



Гериций коралловый



Решеточник красный



Чешуйница древесинная



Трутовик разветвленный



Шишкогриб



Трутовик листоватый

Плодовое тело представлено многочисленными ветвящимися ножками, выходящими из общего основания. Поверхность шляпок с радиальными морщинками желто-серая или серовато-бурая. Мякоть мясистая, белая. Растет в основном у основания стволов бука, дуба, каштана. Хороший, съедобный гриб.





Гериций коралловый

Плодовое тело величиной до **40 см.** Ветви мясистые, сначала белые с розоватым оттенком, затем желтоватые, позднее буроватые, с густо расположенными шипами одного цвета с ветвями. Мякоть белая или желтоватая, немного волокнистая, без особого вкуса и запаха. Встречается в течение лета на пнях, валежнике лиственных деревьев, особенно березы. Гриб съедобен.





Решеточник красный

Молодое тело гриба шаровидное или яйцевидное до **10** см высотой и **5** см шириной, белое, покрыто оболочками в **3** слоя. Наружный слой быстро разрывается звездообразными отгибающимися лопастями, сохраняющимися у основания гриба. С внутренней стороны это образование покрыто третьим слоем зеленовато-оливкового цвета, который быстро превращается в слизистую массу.





Чешуйница древесинная

Шляпка до **9** см в диаметре, рыже-бурая, сначала выпуклая, затем распростертая, чешуйчатая. Пластинки свободные, белые или белые с сероватым оттенком. Ножка одного цвета со шляпкой, чешуйчатая, к основанию сужена, полая. Мякоть беловатая, со слабым приятным запахом, без вкуса. Гриб несъедобный.





Трутовик разветвленный

Этот кустистый трутовик растет группами, достигающими в диаметре **40-50** см и состоящими из сотен экземпляров. Шляпки, довольно тонкие, но мясистые, сначала шаровидные, потом плоские с пуповидным углублением и маленьким бугорком в центре. Ножки тонкие, цилиндрические, мягкие. Поры мелкие, округлые или с острыми краями.





Шишкогриб

С чешуйчатой шляпкой, сетчато-орнаментированными, в массе буро-черными спорами наиболее распространен в умеренной полосе Европы, Азии и Северной Америки. Этот гриб растет в лиственных и смешанных лесах. В России встречается изредка на юге Дальнего Востока.

