




Экологический практикум:

Многообразие экологических факторов

Мельник Ольга Николаевна
к.б.н., доцент кафедры биологии и экологии

Комплекс условий, необходимых для существования живого организма – это ***окружающая среда (среда жизни или среда обитания)***



Комплекс условий, окружающих живой организм – это **окружающая среда** (**среда жизни** или **среда обитания**)



ВОДНАЯ

Комплекс условий, окружающих живой организм – это **окружающая среда** (**среда жизни** или **среда обитания**)



Комплекс условий, окружающих живой организм – это **окружающая среда** (**среда жизни** или **среда обитания**)



Комплекс условий, окружающих живой организм – это **окружающая среда** (**среда жизни** или **среда обитания**)





Отдельно выделенное условие из комплекса необходимых для существования организма — это **ФАКТОР СРЕДЫ**


Изменение значения фактора среды, которое воздействует на организм и вызывает ответную реакцию в форме приспособлений — это **ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР**


Классификация экологических факторов



Абиотические факторы

- Климатические
- Почвенные
- Водные
- Рельеф





РЕЛЬЕФ И МИКРОКЛИМАТ

Биотические факторы

ВНУТРИВИДОВЫЕ


МЕЖВИДОВЫЕ

Пищевой ресурс

Территория

Размножение

Антропогенные факторы



- Изменение растительного покрова
- Уничтожение животных

Сведение лесов



Подлинное богатство мира — влажные вечнозеленые тропические леса уничтожаются небывалыми темпами. Согласно данным ООН, обезлесение в этом десятилетии возросло на 8,5 процента по сравнению в 1990-ми годами.



В Бразилии находится 30% тропических лесов мира и в ней же наблюдаются самые высокие темпы обезлесения

Уничтожение животных за 400 лет – уничтожено 226 видов



Морская корова, капустница (*Rhytina gigas Zimm. s. Stelleri Fischer*) — открыта в 1741 г. экипажем судна "Св. Петр" экспедиции Витуса Беринга к Командорским островам



- морское млекопитающее из отряда сирен (*Sirenia*), длина тела от 7,5 до 10 м, масса до 4 тонн
- Популяция располагалась на двух островах: о-в Медный и о-в Беренга. Популяция из двух стад насчитывала 2000 особей.



- 1763 г. – убита последняя корова. Причина истребления – большое количество легкодоступного мяса



Дальневосточный леопард *Panthera pardus amurensis*
Проект стратегии сохранения дальневосточного леопарда в Российской
Федерации (Владивосток, 2011)

Антропогенные факторы

```
graph TD; A[Антропогенные факторы] --> B(ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ); A --> C(КОСВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ);
```

ПРЯМОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ

КОСВЕННОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ

-Рост и развитие городов


**-Строительство промышленных
предприятий**







Закон толерантности, 1913 г.



Эрнст Виктор
Шелфорд
(1877 – 1968)

В отношении любого экологического фактора у живых организмов и их группировок складываются определенные рамки комфортного восприятия (зона оптимума). Как недостаток, так и избыток интенсивности действия фактора негативно сказывается на жизнедеятельности организма (зона пессимума).