


The background of the slide features a collection of laboratory glassware, including Erlenmeyer flasks and beakers, arranged on a light-colored surface. The glassware contains liquids of various colors: a bright yellow liquid in a flask on the left, a reddish-brown liquid in a flask in the upper center, a clear liquid in a beaker in the center, and a light blue liquid in a flask on the right. The lighting is soft, creating gentle shadows and highlights on the glass surfaces.

ЭНЕРГЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. ЭЛЕМЕНТЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ

A detailed ball-and-stick model of a nucleotide is visible in the background. It shows a central sugar-phosphate backbone with various atoms labeled: Carbon (C) in grey, Hydrogen (H) in white, Oxygen (O) in red, Phosphorus (P) in orange, and Nitrogen (N) in blue. The structure is complex, showing the interconnected rings and bonds of the molecule.

Солнечная энергия – основной источник жизни.

Фотосинтез идет в автотрофных клетках.



Для живых организмов – химическая энергия играет основную роль.




В гетеротрофных клетках идут процессы
диссимиляции



Макроэргические соединения –
соединения богатые энергией.


Биоэнергетика – наука, изучающая
превращение энергии в организме.

A faint, semi-transparent molecular model is visible in the background. It features a central blue sphere, likely representing a phosphorus atom, connected to several yellow spheres, likely representing carbon atoms. These are further connected to numerous white spheres (hydrogen) and a few red spheres (oxygen). The model is complex and multi-dimensional, typical of a ball-and-stick representation of a large organic molecule.

Химическая термодинамика – наука о
взаимопревращениях теплоты и энергии,
в том числе энергии химических
процессов (середина 19 века).

Позволяет количественно рассчитывать
превращения энергии в биохимических
реакциях и предсказать их направление.

Математическая модель живых систем –
совокупность термодинамических
уравнений.



СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

характеризуется параметрами системы

равновесное

стационарное
(организм)

переходное

стандартное
($P=101,3\text{кПа}$,
 $T=298^\circ\text{K}$)

Типы систем

Изолированная
 $\Delta E=0, \Delta m=0$

Гомогенная

Закрытая
 $\Delta E \neq 0, \Delta m=0$

Гетерогенная

Открытая
 $\Delta E \neq 0, \Delta m \neq 0$
(организм)



Энергия – мера движения и взаимодействия материальных систем

ЭНЕРГИЯ


Потенциальная
энергия

Внутренняя
энергия (u)

Кинетическая
энергия

Энтальпия (H)

Полная
энергия



Теплота – неупорядоченная форма
передачи энергии (Q)

Работа – упорядоченная форма передачи
энергии (W)

Термодинамические функции состояния

Энтальпия (H)

Энтропия (S)

Внутренняя
энергия (U)

Энергия
Гиббса (G)

Энергия
Гельмгольца (F)

I начало (закон) термодинамики


(Р. Майер, Д. Джоуль, Г.Л. Гельмгольц)

Это закон сохранения энергии

1. Энергия не создается и не уничтожается. Возможен лишь переход из одного вида в другой в строго эквивалентных количествах
2. Внутренняя энергия изолированной системы есть величина постоянная
3. Невозможно создать вечный двигатель, который совершал бы работу без затраты энергии (вечный двигатель I рода)

Закон Гесса (1840 г.)

(Следствие из I начала термодинамики)



$$\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3$$

Следствие из закона Гесса

(следствие из I начала термодинамики)

$$1. \Delta H^{\circ}_{\text{р-ии}} = \sum m \cdot \Delta H^{\circ}_{\text{обр. (прод.)}} - \sum n \cdot \Delta H^{\circ}_{\text{обр. (исх. в-в)}}$$

$$2. \Delta H^{\circ}_{\text{р-ии}} = \sum m \cdot \Delta H^{\circ}_{\text{сгор. (исх. в-в)}} - \sum n \cdot \Delta H^{\circ}_{\text{сгор. (прод.)}}$$

Понятия:

а) стандартная теплота образования.

б) стандартная теплота сгорания.

в) стандартная теплота химической реакции.

$$\Delta H^{\circ}_{\text{образования простых веществ}} = 0$$

$$\Delta H^{\circ}_{\text{сгорания конечных продуктов}} = 0$$

Процесс – переход системы из одного состояния в другое

Процессы

Обратимые
(термодинамические)

Самопроизвольные

Несамостоявольные

Необратимые
(термодинамические)

Новая термодинамическая функция состояния – энтропия (S).

Она характеризует степень неупорядоченности материи.

$$S = k \cdot \ln W \text{ (Больцман)}$$

W – вероятность состояния

$$k = R/N_A$$


S – определяется согласно постулату М. Планка

(S при 0° K = 0)

$$\Delta S^{\circ}_{\text{р-ции}} = \sum m \cdot S^{\circ}_{\text{прод.}} - \sum n \cdot S^{\circ}_{\text{исх.в-в}}$$

II начало (закон) термодинамики

1. Невозможен самопроизвольный переход тепла от тела менее нагретого к телу более нагретому.
2. Невозможно превратить в работу теплоту какого-либо тела, не производя никакого другого действия, кроме охлаждения этого тела.
3. Невозможно создать такую машину, единственным результатом действия которой было бы получение работы за счет теплоты окружающей среды.



ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА


$$\Delta S \geq Q / T,$$

T.e. $\Delta S \geq 0$

$$\Delta S > 0$$

Все это справедливо для изолированных процессов!

Организм – открытая система!

Д.У. Гиббс – новая функция состояния (G)
– энергия Гиббса (изобарно-изотермический потенциал)

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

Объединенное уравнение I и II началов термодинамики

$\Delta G < 0$ – самопроизвольные процессы

$\Delta G = 0$ – обратимые процессы


**Для неизолиторованных
систем самопроизвольное
протекание процессов
характеризуется:**


- 1.Энтальпийным фактором (ΔH)**
- 2.Энтропийным фактором (ΔS)**

Направленность протекания процессов

Знак изменения функции			Возможность самопроизвольного протекания реакции
ΔH	ΔS	ΔG	
-	+	-	Возможна при любых t°
+	-	+	Невозможна при любых t°
-	-	$\pm$	Возможна при низких t°
+	+	$\pm$	Возможна при высоких t°

Соотношение важнейших термодинамических функций





Экзергонические реакции –

$$\Delta G < 0$$

Эндергонические реакции –

$$\Delta G > 0$$

Принцип энергетического сопряжения

**Энергия, необходимая для
протекания эндергонических реакций,
поступает за счет осуществления
экзергонических реакций.**

**Интермедиат – общее вещество этих
двух реакций**



$$\Delta G^\circ = -29,2 \text{ кДж/моль}$$

Экзергоническая реакция




$$\Delta G^\circ = +13,1 \text{ кДж/моль}$$

Эндергоническая реакция

H_3PO_4 - интермедиат

Применение химической термодинамики к биологическим системам



- 
1. Применение I начала термодинамики
 2. Термодинамические условия равновесия.
Энергия Гиббса биологического окисления
вещества
 3. Экзергонические и эндергонические
реакции в организме. Принцип
энергетического сопряжения




Рис. 1. Схема прибора Этуотера:

1, 3 — H_2SO_4 для поглощения выдыхаемой влаги; 2 — натронная известь для поглощения выдыхаемой CO_2 ; O_2 — источник кислорода; С — источник воды, циркулирующей в приборе; Bl — насос; А, А₁, В, В₁, Г — термометры; Cu и Cu₂ — двойная медная стенка; Е, Д — изолирующие прослойки воздуха

Тепловой баланс человека (за сутки)

<i>Приход</i>	<i>Расход</i>
Питательные вещества:	Выделенная теплота . . . 1374 ккал
56,8 г белка 237 ккал	Выдыхаемые газы 43 »
140 г жира 1307 »	Кал и моча 23 »
79,9 г углеводов 335 »	Испарение через дыхание . . . 181 »
	Испарение через кожу . . . 227 »
	Различные поправки . . . 11 »
Всего 1879 ккал	Всего 1859 ккал

Точность – 99%

1 г жира – 9,3 ккал

1 г углевода и белка – 4,2 ккал

Вывод:

**Организм не является
источником энергии, а
полностью подчиняется
I началу термодинамики**

2-ое начало термодинамики:

$$\Delta S \geq 0 \quad \text{и} \quad \Delta G \leq 0$$

Состояние равновесия:

$$\Delta S = 0 \quad \text{и} \quad \Delta G = 0$$

Химический потенциал (Гиббс):

$$\mu = \frac{\Delta G^0}{n} \quad (\text{на 1 моль вещества})$$

$$\mu = \mu^0 + RT \ln C$$

Может ли живой организм производить работу только за счет теплоты окружающей среды?

Ответ: Прямых доказательств нет. Известна связь биосинтеза белков с обменом углеводов и нуклеиновых кислот.

Все энергетические процессы в организме сопряжены с другими процессами

Организм – единое целое с окружающей средой и его условиями ассимиляции и диссимиляции

Играет ли увеличение энтропии определяющую роль в направлении химических процессов обмена в биосистемах?

Ответ:

Энтропия всей системы «организм – среда» увеличивается.

Но $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$.

По отношению к живым организмам ΔS теряет значение как определяющего фактора, хотя все процессы в организме сопровождаются изменением энтропии.

Сглаженная совокупность процессов обмена веществ в организме и направление их изменений показывает:

- 1. Приспособление организма к условиям его существования.**
- 2. Стремление к сохранению своего вида в процессе эволюции**

То есть полностью определяются биологическими закономерностями.

**Могут ли живые организмы
использовать молекулярные
отклонения в отношении уменьшения
энтропии?**

Ответ:

**До сих пор известен только факт отбора
организмом дейтерия из веществ
окружающей среды (тяжелая вода).**

**Меченные атомы в биохимии обладают
только индикаторными свойствами**

Применима ли к биосистемам обычная трактовка энтропии как меры упорядоченности?

Ответ:

Применительно к биосистемам различают:

- 1. Термодинамическую энтропию**
- 2. Информационную энтропию**

В организме процессы близки к упорядоченности конвейера, чем хаотической игре молекулярных сил.

Разумеется термодинамическая энтропия входит как составляющая в биологические и социальные процессы. Но есть энергия Гиббса. За счет затраты энергии Гиббса происходит уменьшение энтропии.


Итак, ответ на все вопросы отрицательный.

Биосистема и биохимия имеют дело не с равновесными, а со стационарными системами. Система непрерывно получает энергию Гиббса из среды в количестве, компенсирующем ее снижение в организме.

Живой организм – открытая система. В ней энтропия поддерживается постоянной, но отличающейся от тах.

Состояние термодинамического равновесия несовместимо с жизнью и может реализоваться лишь после смерти организма

Окисление углеводов (аэробный распад) имеет большое значение в энергетическом балансе организма



Эта энергия затрачивается на синтез 38 молей АТФ (аденозин-5'-трифосфата)




$$\Delta G^0 = 31,4 \text{ кДж/моль}$$

КПД биологического окисления глюкозы равен:

$$\frac{38 \cdot 31,4 \cdot 100}{2880} = 42\%$$

С учетом физиологических составляющих КПД $\approx 60\%$

Окисление глюкозы – экзергоническая реакция. Синтез АТФ – эндергоническая реакция. Энергетически они сопряжены



Гликолитический путь обмена

Стандартные свободные энергии гидролиза некоторых фосфатов при pH 7^a

Фосфаты	$\Delta G^{\circ'}$, кДж/моль
Фосфоенолпировиноградная кислота	—61,9
Ацетилфосфат	—43,1
Креатинфосфат	—43,1
Пирофосфат	—33,5
АТФ	—30,5
Глюкозо-1-фосфат	—20,9
Глюкозо-6-фосфат	—13,8
Глицеро-1-фосфат	—9,2

^a Данные заимствованы из книги «Handbook of Biochemistry», H. A. Sober (ed.), © The Chemical Rubber Co., 1968. Used by permission of The Chemical Rubber Co.

**Окислительный распад жирных кислот – второй источник
(после углеводов) энергии в организме. Этот процесс
локализован в митохондриях.**

**Жирные кислоты образуются из жиров при действии
тканевых ферментов липаз.**

Схема реакции	ΔG^0 , ккал/моль
$\text{CoASH},$ $\text{ATP} \rightarrow \text{RCH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$ $\downarrow (1)$ $\text{RCH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CO-SKoA}$ $\downarrow (2)$ $\text{RCH}_2\text{-CH=CH-CO-SKoA}$ $\downarrow (3)$ $\text{RCH}_2\text{-CHOH-CH}_2\text{-CO-SKoA}$ $\downarrow (4)$ $\text{RCH}_2\text{-CO-CH}_2\text{-CO-SKoA}$ $\text{CoASH} \rightarrow \downarrow (5)$ $\text{RCH}_2\text{CO-SKoA} + \text{CH}_3\text{CO-SKoA}$	 -0,2 -4,2 -0,3 -3,7 -3,0

Всего


-11,4

В заключительной стадии под влиянием фермента кетотиолазы образуются ацетилкоэнзим и, новая молекула коэнзима А, вновь активированная жирной кислотой, но укороченная на 2 атома углерода.


На 5 стадий $\Delta G^0 = -11,4$ ккал.

При биосинтезе жиров – обратное направление.


Взаимосвязь этих 2-х основных процессов обмена имеет важное значение для баланса энергетических затрат организма




**Рассмотрим образцы
калориметров,
используемых в
разные века.**




Калориметр Лавуазье




Калориметр Дюлонга



Ледяной калориметр Германа





Ледяной калориметр Тана




Прибор Бунзена

Калориметрическая бомба Берто






*Калориметр с вращающейся бомбой конструкции термохимической
лаборатории МГУ*



Вакуумный адиабатический
калориметр



Дифференциальный сканирующий калориметр с программным управлением фирмы «СЕТАРАМ»

**Благодарю за
внимание**