

ПРИМЕНЕНИЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ

Учащиеся 9 класса:

Смолич В. Максимова Н.

Учитель: Донская Л.Н.

Развитие ядерной энергетики

- АЭС г.Обнинск в 1954 году
- Нововоронежская, Ленинградская, Курская, Кольская, Белоярская и др. АЭС. (Мощность 500-1000 МВт)
- Атомные реакторы устанавливаются на подводных лодках и ледоколах

ПРЕИМУЩЕСТВА АЭС

- Не потребляют дефицитного органического топлива
- Не загружают перевозками железнодорожный транспорт
- Не потребляют атмосферный кислород
- Не засоряют среду золой и продуктами сгорания
- В нормальном режиме эксплуатации биосфера надежно защищена от радиационного воздействия.

Потенциальная угроза

- В реакторах на тепловых медленных нейтронах уран используется лишь на 1-2%
- В реакторах на быстрых нейтронах полностью используется уран и обеспечивается воспроизводство нового ядерного горючего в виде плутония
- Проблемы с захоронением радиоактивных отходов, радиоактивное загрязнение
- Демонтаж отслуживших свой срок (20 лет) АЭС
- Риск разрушения активной зоны реактора из-за ошибок персонала и просчетов в конструкции реактора

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

Неуправляемая ядерная реакция с большим коэффициентом размножения нейтронов в атомной бомбе

- Реакция на быстрых нейтронах с мгновенным выделением энергии (без замедлителя) U или Pu
- Размеры делящегося вещества превышают критические (быстрое соединение двух кусков делящегося вещества, либо резкое сжатие)
- То и другое осуществляется с помощью обычных взрывчатых веществ
- При взрыве атомной бомбы температура достигает десятков миллионов кельвин. Резко повышается давление и образуется мощная взрывная волна

- Одновременно возникает мощное излучение
- Продукты цепной реакции при взрыве атомной бомбы сильно радиоактивны и опасны для жизни живых организмов (Применили США в 1945 году против Японии, Хиросима и Нагасаки)
- В термоядерной (водородной) бомбе для реакции синтеза используется взрыв атомной бомбы, помещенной внутри термоядерной, он повышает температуру и сильно сжимает термоядерное топливо излучением
- С созданием ядерного оружия победа в войне стала невозможной
- Ядерная война способна привести человечество к гибели

ВОПРОСЫ

- **Какие два направления применения ядерной энергии существуют?**
 - 1. В мирных целях ядерные реакторы на АЭС, подводных лодках, ледоколах**
 - 2. В военных целях – ядерное оружие**

ПОЛУЧЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

В атомной индустрии всевозрастающую ценность для человечества представляют радиоактивные изотопы

- С помощью ядерных реакций в атомных реакторах и на ускорителях элементарных частиц получены радиоактивные изотопы всех химических элементов, не существующие в природе
- Меченые атомы (они по химическим свойствам не отличаются от нерадиоактивных, но легко обнаруживаются по их излучению) в биологии, физиологии, медицине для исследования обмена веществ в организмах, кровообращения, постановки диагноза, для терапевтических целей
- Источники гамма-лучей в науке, медицине и технике (кобальтовая пушка)

- **В промышленности** как способ контроля износа деталей (поршневых колец) ДВС
- Контроль процессов диффузии металлов в доменных печах
- Исследование внутренней структуры металлических отливок, деталей с целью обнаружения в них дефектов

- В сельском хозяйстве облучение семян небольшими дозами гамма-лучей, приводит к заметному повышению урожайности
- Исследование усвоения удобрений
- Большие дозы вызывают мутации у растений и живых организмов, появление мутантов с новыми ценными свойствами, высокая продуктивность
- Получение высоко продуктивных микроорганизмов для производства антибиотиков
- Для борьбы с вредными насекомыми
- Для консервации продуктов

- **В археологии** для определения возраста древних предметов органического происхождения (дерева, угля, тканей и т.д.)
- После гибели растения или животного пополнение его радиоактивным углеродом прекращается. Имеющееся количество убывает за счет радиоактивности. По процентному содержанию радиоактивного углерода можно определить возраст археологических находок.

ВОПРОСЫ

- Что такое радиоактивные изотопы и как их используют?

Ядра атомов, имеющие одинаковое количество протонов (заряд), но отличающиеся количеством нейтронов (массой). Химические свойства их не отличаются, а радиоактивность является своеобразной меткой. Метод меченных атомов.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

- Радиоактивное излучение, даже слабое, нарушает жизнедеятельность клеток, вызывает лучевую болезнь
- При большой интенсивности живые организмы погибают
- В первую очередь излучение поражает костный мозг, из-за чего нарушается процесс образования крови
- Далее наступает поражение клеток пищеварительного тракта и других органов
- Сильное влияние облучение влияет на наследственность, поражая гены в хромосомах
- Облучение живых организмов может оказывать и определенную пользу. Облучение раковых опухолей гамма-лучами радиоактивных препаратов, которые для этих целей более эффективны, чем рентгеновские

Доза излучения

- Поглощенная доза излучения – отношение поглощенной энергии E ионизирующего излучения к массе m облучаемого вещества

$$D = \frac{E}{m}$$

$$1\text{Гр} = \frac{1\text{Дж}}{1\text{кг}}$$

- Измеряется в грях (Гр). 1Гр равен поглощенной дозе излучения, при которой облученному веществу массой 1 кг. Передается энергия 1Дж
- Предельно допустимая доза в год 0,05 Гр - (5 Р)
- Доза излучения 3 – 10 Гр за короткое время, смертельна

Рентген

- Р - мера ионизирующей способности рентгеновского и гамма-излучения
- Число образующихся ионов связано с поглощаемой веществом энергией

$$1\text{Р} \approx 0,01 \text{ Гр}$$

- Характер воздействия излучения зависит не только от дозы поглощенного излучения, но и от его вида
- Коэффициент качества – k
 - рентгеновское и гамма излучение $k = 1$
 - альфа-излучение $k = 20$ (самое опасное)

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ДОЗА ПОГЛОЩЕННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ

- Произведение дозы поглощенного излучения на коэффициент качества:

$$H = D k$$

- Единица эквивалентной дозы **ЗИВЕРТ**
1 Зв – эквивалентная доза, при которой поглощенного гамма-излучения равна 1Гр
- Максимальная доза, после которой происходит поражение организма 0,5 Зв
- За счет естественного радиоактивного фона (космические лучи и радиоактивные изотопы в земной коре) –
2 мЗв в год

Защита организмов от излучения

- Удаление персонала от источника излучения на достаточно большое расстояние
- Ампулы с радиоактивными препаратами не следует брать в руки. Надо пользоваться специальными щипцами с длинной ручкой
- Используют преграды из поглощающих материалов:
 - свинец для гамма-лучей и нейтронов
 - бор и кадмий для медленных нейтронов
 - графит для быстрых нейтронов
- Все люди должны иметь представление об этой опасности и мерах защиты от нее

ВОПРОСЫ

- Что такое доза излучения?
($D=E/m$)
- Чему (в рентгенах) равен естественный фон радиации?
(0,2 Р)
- Чему (в рентгенах) равна предельно допустимая за год доза излучения для лиц, работающих с радиоактивными препаратами?
(5 Р)