


Упражнение 9

На рисунке показаны ось координат, четыре тела и их скорости.



Запишите уравнение координаты для каждого тела. Аналитически и графически найдите:

1-й вариант: где и когда 1-е тело догонит 2-е;

2-й вариант: где и когда 1-е тело встретит 3-е;

3-й вариант: где и когда 4-е тело догонит 3-е;


4-й вариант: где и когда 4-е тело встретит 2-е.



Равномерное движение



Средняя и мгновенная скорость



$$v_{\text{средняя}} = \frac{S_{\text{все}}}{t_{\text{все}}}$$



Мгновеннаа скорость – скорость в
данний момент времени

$$v = 0$$

$$v = 4 \text{ м/с}$$

$$v = 8 \text{ м/с}$$

$$v = 12 \text{ м/с}$$



$$2\text{с}$$



$$2\text{с}$$



$$2\text{с}$$



каждые 2 с скорость увеличивается на 4 м/с

Движение, при котором скорость тела за любые равные промежутки времени увеличивает скорость на одинаковую величину, называют **равноускоренным**.



$$v = 12 \text{ м/с}$$



$$v = 8 \text{ м/с}$$



$$v = 4 \text{ м/с}$$



$$v = 0$$



каждые 2 с скорость уменьшается на 4 м/с

Движение, при котором скорость тела за любые равные промежутки времени уменьшает скорость на одинаковую величину, называют **равнозамедленным**.



Характеристика быстроты изменения скорости - ускорение


Ускорение = $\frac{\text{изменение скорости}}{\text{Время, за которое это изменение произошло}}$



$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{\Delta t}$$

$$\left[a = \frac{m/c}{c} = \frac{m}{c^2} \right]$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{\Delta t}$$



$$v = v_0 + at$$




*Уравнение
скорости*


Уравнение перемещения

Известно:
равномерное

равноускоренное



s_x — площадь
прямоугольника



$s_x = \Sigma \Delta s_x$
 s_x — численно площадь
трапеции $OABC$

$$s_x = \frac{OA + BC}{2} OC$$

$$s_x = \frac{v_{0x} + v_x}{2} t;$$

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

$$s_x = v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}$$

Уравнение координаты

$$x = x_0 + s_x$$

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$$

Формула перемещения без t

$$s_x = \frac{v_x + v_{0x}}{2} t, \text{ но } t = \frac{v_x - v_{0x}}{a_x}; \quad s_x = \frac{v_x + v_{0x}}{2} \cdot \frac{v_x - v_{0x}}{a_x}$$

$$s_x = \frac{v_x^2 - v_{0x}^2}{2a_x}$$

Направление ускорения $\vec{a} \uparrow \uparrow \Delta \vec{v}$

Вектор ускорения сонаправлен с вектором движения $\Delta \vec{v}$




$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{\alpha}t$$

$$\vec{s} = \vec{v}_0 t + \frac{\vec{\alpha}t^2}{2}$$

$$v^2 - v_0^2 = \pm 2as$$




ГРАФИКИ ДВИЖЕНИЯ



4





Графическое описание движения



Упражнение 16

Используя данные, приведенные на рисунке, запишите для каждого тела уравнение скорости; определите скорости тел через 2 с; постройте графики скорости; по графикам определите скорости через 2 с; сравните полученные результаты с результатами аналитического расчета.






Упражнение 17

По графикам зависимости проекции скорости от времени определите для каждого тела начальную скорость и ускорение; запишите уравнение скорости; определите скорость всех тел через 5 с. Через сколько времени скорости всех тел будут равны 6 м/с?

Упражнение 19

Прочтайте график, показанный на рисунке. Определите характер движения тела на каждом участке.



Д/З 9,11, 12,13,14. Упр. 3

