

Угольная промышленност ь

Запасы угля больше запасов нефти и природного газа.

Добыча его обходится дороже, чем нефти и природного газа. Поэтому после открытий месторождений нефти и газа доля угля сократилась с 59%(в 50-е гг.ХХ в.) до 9%.



ЗАПАСЫ УГЛЯ

В России более 200 угольных бассейнов и месторождений. Их общие запасы превышают 6 трлн. т.(около 20% мировых запасов, 2 место после США)

Добыча составляет более 350 млн. т.(3 место по добыче бурого угля и 5 место по добыче каменного)

Бурый уголь:

Суббитуминозный (бурый) уголь является плотной, камнеподобной углистой массой от почти чёрного до светло-бурого цвета, всегда с бурой чертой. В нём нередко заметна растительная древесная структура; излом раковистый, землистый или деревянный. Легко горит коптящим пламенем, выделяя неприятный своеобразный запах гари.

Каменный уголь:

Каменный уголь — твёрдое
горючее полезное ископаемое,
промежуточный между бурым
углём и антрацитом.

Антрацит

**самый древний из ископаемых углей,
уголь наиболее высокой
степени углефикации (метаморфизма).**

До 1980-х годов антрацит относительно редко употребляли для технологических целей, в основном же антрацит разновидности standard grade использовался как топливо в энергетике, на транспорте и в быту. В настоящее время антрацит, помимо использования в энергетике, применяется для чёрной и цветной металлургии, а также для производства адсорбентов, электродов, электрокорунда, микрофонного порошка.

Уголь используется:

- Часть угля $\frac{3}{4}$ используется как топливо для промышленности и тепловых электростанций
- Уголь коксующийся служит сырьем промышленности (черная металлургия, химическая).



Способы добычи угля:

- подземный



- открытый (60 %)




Открытый способ

- Образуются карьеры
- Образуются отвалы пустой породы
- Уничтожается плодородный слой (почва)







Подземный способ

- Образуются терриконы – отвалы пустой породы
- Запыленность территории



Техника



Основные районы добычи угля:

Кузнецкий бассейн (Кузбасс) - 60 %

Канско-Ачинский бассейн


Печорский бассейн

Характеристики бассейнов:

Бассейн	Доля подземной добычи %	Средняя глубина добычи м	Мощность пластов м	Калорийность угля кал/кг	Добыча млн. т
Кузнецк ий	60	190	2	0,9	180
Печорский	100	300	1,5	0,8	13
Канско- Ачинский	- -	- -	15 -100	0,5	35

КУЗБАСС

Основные районы
добычи угля



Проблемы угольной промышленности

- Загрязнение атмосферы при сжигании
- Образование терриконов, карьеров
- Удаленность многих бассейнов
- Истощение ресурсов
- Дорогая добыча в Заполярье

Углефикация

природный процесс структурно-молекулярного преобразования (метаморфизации) органического вещества угля под влиянием высокого давления и температур. Углефикация — фаза углеобразования, в которой находящийся в недрах Земли торф последовательно преобразуется (при соответствующих условиях) сначала в бурый, потом в каменный уголь и антрацит. При этом повышается содержание углерода, снижается выход летучих веществ, увеличивается отражательная способность гелифицированных компонентов.