

Тема урока: Морское
побережье и его
хозяйственное освоение.



Побережье Азовского моря:



Берега моря низкие, песчано-ракушечные или песчано-глинистые. Климат умеренный, средняя температура в июле +23, в январе – 0..-3 градуса, осадков выпадает от 400 до 500 мм в год.



Bolts of Lightning

Открытые участки Азовского побережья подвержены влиянию сильных ветров. Часто над морем возникают смерчи.





Начиная от Темрюка и вплоть до Приморско-Ахтарска, прибрежная полоса Азовского моря состоит сплошь из лиманов, плавней и небольших озер. Около ста пятидесяти километров непроходимой местности, где ни дорог, ни коммуникаций. Сплошной камыш и ночные крики сов.



Плавни — это заросли тростника, рогоза, осоки, ив и других растений на затапливаемых поймах и в дельтах крупных рек. Площадь территории, занятой плавнями, в крае составляет 380 тыс. га. Выделяют Закубанские, Адыгейские и Приазовские плавни. Плодородные почвы после осушения используют для выращивания сельскохозяйственных культур (риса, кукурузы, огородных культур и др.).

На плодородных лугово-чернозёмных почвах в дельте Кубани выращивают овощи и бахчёвые культуры.



ЖИВОЙ МИР ЛИМАНОВ И ПЛАВНЕЙ



Лебедь кликун.



Дикие утки



Лысуха



Кулик - сорока



Баклан



Каравайка



Редкие птицы: пеликан и фламинго



Ондатра.

водяная крыса



Разные виды рыб: судак, сазан, окунь, сом.



Птицы занесённые в Красную книгу: кудрявый и розовый пеликаны



Каравайка



www.zaeco.ru

КАРАВАЙКА (*Plegadis falcinellus*)

Заповедная россия

Колпица



Плавни – основная зона
рисосеяния. Более 80% сбора
зерна приходится на наш край.




В ст.Фёдоровской построен
гидротехнический узел для
орошения рисовых полей.



фото В. Гроздева

Черноморское побережье:




Климат – субтропический. Лето – жаркое, зима сравнительно тёплая. Довольно часто возникают смерчи.



Бора – сильный ветер



Наиболее крупные реки: Мзымта, Псоу, Сочи, Пшада, Туапсе, Вулан. Они берут начало в горах большого Кавказа и несут свои воды в Чёрное море.



Озеро Абрау. Его глубина чуть более 10 м.

© Igor Torgachkin



© Игорь Торгачкин

Растительность.

Остатки прежних лесов из дуба, клёна, берёзы, сосны, можжевельник, боярышник.



Иглица понтийская



Сассапариль высокий



ЕНОТ



шакал



Сколопендра



итальянский скорпион



