

Степи Липецкой области



Терн



Степная вишня



Миндаль низкий



Зопник



Зопник клубяносный © 2010 И. Шмидтов

Синеголовник



Костер безостый



Василек
шероховатый



Ковыль перистый

Эспарцет песчаный



Шалфей луговой



Клевер горный



Адонис весенний (горлицвет)



Первоцвет весенний



Лапчатка белая



Осоки



Мох туидиум



Таблица 8. Листостебельные мхи (бокоплодные):

1 — фонтиналис противопожарный (*Fontinalis antipyretica*); 2 — туидиум тамарисковидный (*Thuidium tamariscinum*); 3 — миуроклада Максимовича (*Myuroclada maximoviczii*); 4 — каллиергон лозовидный (*Calliergon sarmentosum*); 5 — неккера курчавая (*Neckera crispa*); 6 — леукодон повислый (*Leucodon pendulus*); 7 — климациум японский (*Climacium japonicum*); 8 — ортотециум золотистый (*Orthothecium chryseum*); 9 — дрепанокладус отвернутый (*Drepanocladus revolvens*); 10 — птилиум гребенчатый, или сраисово перо (*Ptilium crista-castrensis*).

Лунь степной



Слепыш



Сурок-байбак



Приятного аппетита – Евразка! :-)

А. Куцкий © 2005

mir.chukotka.ru

Большой тушканчик



Дрофа



Степная гадюка



Шмель степной

