

Электролитическая диссоциация

8класс

Неорганическая химия

Учитель химии ГБОУ ООШ п.Приморский Ахметвалиева
Н.М.

•История ТЭД


Теория электролитической диссоциации (ТЭД).




Сванте
Аррениус

В 1887г. Шведский учёный С.Аррениус для объяснения особенностей водных растворов веществ предложил теорию электролитической диссоциации. В дальнейшем эта теория была развита многими учёными, в том числе И.А. Каблуковым и В.А. Кистяковским.


- Процесс распада электролита на ионы называется электролитической диссоциацией.



Вещества,




- Раствор электрический ток-
- ЭЛЕКТРОЛИТЫ




- Растворы ,которых не проводят электрический ток-
- НЕЭЛЕКТРОЛИТЫ

Диссоциация веществ с ионной связью



Диссоциация веществ с ковалентной полярной связью



Степень диссоциации



Отношение числа частиц , распавшихся на ионы (N_d) к общему числу растворенных частиц (N_p)

Степень электролитической диссоциации принято выражать либо в долях единицы, либо в процентах.

Электролиты со степенью диссоциации больше 0,3 (30%) обычно называют сильными, со степенью диссоциации от 0,03 (3%) до 0,3 (30%)—средними, менее 0,03 (3%)—слабыми электролитами.

Степень электролитической диссоциации электролита в водных растворах зависит от природы электролита, его концентрации и температуры.

Электролиты условно делятся:

- **Сильные электролиты** диссоциируют практически полностью ($\alpha = 1$).

- **Слабые электролиты** диссоциируют на ионы в очень малой степени, в растворах они находятся, в основном в недиссоциированном состоянии (в молекулярной форме). Для слабых электролитов устанавливается равновесие между недиссоциированными молекулами и ионами.

К сильным электролитам относятся

1) кислоты (H_2SO_4 , HCl , HNO_3 , HBr , HI , HClO_4 , HMnO_4);

2) основания – гидроксиды металлов первой группы главной подгруппы (щелочи) – LiOH , NaOH , KOH , RbOH , CsOH , а также гидроксиды щелочноземельных металлов – Ba(OH)_2 , Ca(OH)_2 , Sr(OH)_2 ;

3) соли, растворимые в воде

К слабым электролитам относятся:

- 1) неорганические кислоты (H_2CO_3 , H_2S , HNO_2 , H_2SO_3 , HCN , H_3PO_4 , H_2SiO_3 , HNS , HClO_2 и др.);
- 2) вода (H_2O);
- 3) гидроксид аммония (NH_4OH);
- 4) большинство органических кислот (например, уксусная CH_3COOH , муравьиная HCOOH);
- 5) нерастворимые и малорастворимые соли и гидроксиды некоторых металлов

Тест по теме "Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена"

- **1. К неэлектролитам относится:**
- 1) нитрат калия 2) гидроксид бария 3) хлорид кальция 4) оксид азота(II)
- **2. К хорошо растворимым электролитам относится:**
- 1) бромид натрия 2) гидроксид цинка 3) карбонат кальция 4) гидроксид магния
- **3. В водном растворе наибольшее количество сульфат-анионов образуется при**
- **диссоциации 1 моль:**
- 1) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 2) PbS 3) CaSO_4 4) K_2SO_4

Тест по теме

"Электролитическая диссоциация"

- 4. Катионы металла и анионы кислотного остатка образуются при диссоциации:
 - 1) оксидов 2) кислот 3) солей 4) оснований
- 5. Выберите верную запись правой части уравнения диссоциации карбоната калия:
 - 1) $= K^+ + CO_3^-$ 2) $= K^+ + CO_3^{2-}$ 3) $= 2K^+ + CO_3^{2-}$ 4) $= 2K^+ + HCO_3^-$
- 6. Наибольшее количество анионов образуется при диссоциации 1 моль:
 - 1) $AlCl_3$ 2) $Zn(OH)_2$ 3) $Al(OH)_3$ 4) $Zn(NO_3)_2$

Использованные материалы:



<u>Тест по теме «Электролитическая диссоциация. Реакции ...»</u>
www.edu.murmansk.ru/www/to_teacher/gia/chemistry/.../ted.doc
http://900igr.net/prezentatsii/khimija
<u>Теория электролитической диссоциации</u>
a-nomalia.narod.ru/100otkr/28.htm
О.С.Габриелян Химия.8 класс М., Дрофа,2010