

Исследование защитных свойств зубных паст.

Автор работы- ученик 11 Б класса Гиря


Научный руководитель- Якимова М.А.

МОУ Южно-российский лицей казачества и
народов Кавказа г.Железноводск.

Цель исследования.

- Целью исследования явилось изучение защитных свойств рекламируемых зубных паст.



- 
- **Здоровье зубов - важнейший фактор здорового и полноценного образа жизни. Нельзя найти человека, ни разу в жизни не посещавшего стоматолога по поводу больных зубов . Чаще всего виновником разрушения зубов становится кариес . По некоторым данным кариесом страдает большинство людей от 80 до 90 % .**

Профилактика кариеса.



Самым простым способом борьбы с кариесом является профилактика , которая включает 3 основных компонента :
правильная чистка зубов , экзо- и эндогенная профилактика . Одним из основных средств экзогенной профилактики являются зубные пасты. Правильный выбор зубной пасты во многом определяет здоровье зубов . С помощью паст можно осуществлять гигиену полости рта .

Гипотеза исследования.

Нами была выдвинута гипотеза: если предварительно обработать скорлупу куриного яйца зубной пастой, то разрушительные действия кислоты на скорлупу проявляется в меньшей степени .

Результаты анкетирования.

С **1 по 15 ноября 2008 г**
мы проводили среди
учащихся 9-11 классов
анкетирование с целью
выявления наиболее
популярных у
молодежи видов
зубных паст.

Опрашивали 185
человек, всем был
задан один вопрос:
**«Какую зубную пасту
вы предпочитаете?»**

Результаты
анкетирования
представим в виде
таблицы:

Название пасты	Число учащихся	процент
Blend-a- med	63 ученика	34%
Colgate	52 ученика	28,2%
Новый жемчуг	46 учеников	26 %
Лесной бальзам	8 человек	4,3 %
Аквафреш	12 человек	6,5%
Парадонтол	2 человека	1,1 %

Классификация зубных паст.

Существует 4 вида зубных паст:

1. Гигиенические
2. Лечение - профилактические.
3. Профессиональные.
4. Медицинские.



Причина кариеса.



Развитию кариеса способствует избыточное потребление продуктов, содержащих большое количество углеводов ; и не только сахара и конфет, но и хлеба, печенья и т.п .Данный факт можно объяснить тем что, глюкоза $C_6H_{12}O_6$, содержащаяся во всех сладостях или образующаяся при гидролизе сахарозы $C_{12}H_{22}O_{11}$ или крахмала $(C_6H_{10}O_5)_n$, легко подвергается процессу молочнокислого брожения :



Причины кариеса.



Сахароза

глюкоза

фруктоза.



глюкоза

молочная кислота

Остатки сладкой пищи в полости рта превращаются в молочную кислоту, которая изменяет pH на поверхности эмали зубов до **4,5 -5,0**, это разрушает зубную эмаль.

Состав зубных паст.



Противокариесные зубные пасты - самая распространённая группа лечебно - профилактических зубных паст. Они содержат не только противокариесный компонент – фтор, но и биологические добавки: водорастворимые витамины, экстракты трав, лечебные масла, что помогает снимать воспалительные процессы. В качестве противокариесного компонента, эффективного для профилактики кариеса, большинство зубных паст содержит фториды (в растворенном виде): фториды натрия и олово, монофторофосфат, подкисленный фторид натрия.

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения оптимальная концентрация фторид-иона в зубных пастах должна составлять **0,1%**




эффективно действующие зубные пасты содержат 1-3мг фторида 1 г пасты . Зубные пасты для взрослого населения **0,11-0,76 %** фторида натрия или **0,38-1,14 %** монофосфарита натрия . В детских зубных пастах фтористых соединений содержится меньше (до 0,023 %) .

Максимальное содержание фторид-ионов во фторосодержащих пастах **1-2 %.4**


Наиболее действенным соединением признан аминофторид .

Механизм действия зубных паст.

Фторид - ион, содержащийся в зубных пастах, замещает гидроксид - ион в составе зубной эмали. Процесс описывается уравнением:



При этом образуется менее растворимый фторапатит, который и обеспечивает защиту зубов .




Методы исследования.

- ☐ Анкетирование учащихся,
- ☐ Анализ литературы,
- ☐ Эксперимент,
- ☐ Наблюдение,
- ☐ Сравнение.

Ход работы.

- Намазываем три куриных яйца зубными пастами и выдерживаем 15 минут.
- Смываем пасту водой
- Опускаем яйца (три обработанных пастой и одно контрольное, не обработанное) в раствор уксусной кислоты. Время выдерживания яиц в растворе кислоты 15 минут.
- Осмотр опытных и контрольных проб.
- Описание полученных результатов.

Механизм реакции.



- При погружении яиц в раствор уксусной кислоты поверхность яиц покрывается пузырьками газа. Химическая реакция между скорлупой яйца и уксусной кислотой протекала в соответствии со следующим уравнением:





При нахождении в растворе уксусной кислоты **контрольное яйцо** сразу после погружения покрылось множеством пузырьков выделившегося углекислого газа. После пребывания в растворе уксусной кислоты **скорлупа контрольного яйца** приобрела рельеф (стала шершавая), на ней возникли большие углубления, она стала рыхлой, на ней в местах истончения скорлупы появились полупрозрачные пятна. Скорлупа разбивалась легко, но была тоньше, чем обычно.

Результаты исследования.

**Скорлупа яйца,
обработанного
пастой**

Colgate

**выглядела также
как скорлупа
контрольного
яйца**



Результаты исследования.

На скорлупе яйца, обработанного пастой Blend-a-med, пятнышки маленькие и более светлые, чем в предыдущем случае, поверхность скорлупы гладкая, но она разбивалась хуже, чем в других случаях.

Скорлупа яйца, обработанного пастой «Новый Жемчуг» (производитель «Невская косметика») резко отличалась от других, она была гладкая, блестящая, имела единичные мелкие пятнышки. Скорлупа толще, чем у других яиц, хорошо разбивается.

ВЫВОДЫ:

- Не все пасты в одинаковой степени оказывают защитное действие на зубную эмаль:
- Из трех выбранных паст две – **Blend- a- med** и **«Новый жемчуг»** могут защитить зубы от действия кислоты и укрепляют их;
- Наибольшими защитными свойствами обладает паста, которая практически не рекламируется - **«Новый жемчуг»**:
- Зубная паста **Colgate** не оправдала надежд, она не защищает в должной степени зубы от разрушающего действия кислот.