



Типы изомерии

1. Историческая справка
2. Изомерия. Изомеры.
3. Типы изомерии. Классификация изомеров.

Историческая справка



- Термин **изомерия** предложен в 1830 г. Шведским химиком И.

Берцелиусом.
Берцелиус Йенс Якоб
(1779-1848)



Историческая справка



- Русский химик А.М.Бутлеров предсказал существование двух изомерных бутанов C_4H_{10} , трех изомерных пентанов C_5H_{12} , четырех изомерных бутиловых спиртов C_4H_9OH .
- В 1860 -1870 гг., он вместе со своими учениками синтезировал предсказанные изомеры.

**Бутлеров Александр
Михайлович
(1828-1886)**



Вещества, которые имеют один и тот же качественный и количественный составы, но отличаются по своему строению и свойствам, называются *изомерами*, а явление существования таких веществ носит название *изомерии*



БУТАН (C₄H₁₀)

(t кип. = - 0,5 C)



**ИЗОБУТАН
(C₄H₁₀)**

(t кип. = -11,7 C)



Типы изомерии

Структурная



- Структурными называют изомеры, имеющие различный порядок соединения атомов в молекуле.

Пространствен ная


- Пространственные изомеры имеют одинаковые заместители у каждого атома углерода, но отличаются их взаимным расположением в пространстве.

Какие изомеры называют структурными?

- **Структурными** называют изомеры, имеющие различный порядок соединения атомов в молекуле.



n-бутан
($t_{\text{кип}} = -0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$)



изобутан
($t_{\text{кип}} = -11,7\text{ }^{\circ}\text{C}$)

Виды структурной изомерии



```
graph TD; A[Виды структурной изомерии] --> B[1. Изомерия углеродного скелета]; A --> C[2. Изомерия положения кратной связи (C=C, C≡C) или функциональной группы (ОН и др.)]; A --> D[3. Межклассовая изомерия];
```

1. Изомерия
углеродно
го скелета



2. Изомерия
положения кратной
связи ($C=C$, $C\equiv C$) или
функциональной
группы (ОН и др.)

3.
Межклассовая
изомерия


Виды структурной изомерии: 1.

Изомерия углеродного скелета

- Соединения отличаются порядком расположения углерод - углеродных (C-C) связей. **(АЛКАНЫ)**



n-бутан
($t_{\text{кип}} = -0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$)




изобутан
($t_{\text{кип}} = -11,7\text{ }^{\circ}\text{C}$)


Виды структурной изомерии.

2. Изомерия положения кратной связи или функциональной группы

- Определяет принадлежность соединения к тому или иному классу органических соединений.




бутен-1




бутен-2

АЛКЕНЫ

или



пропанол-1



пропанол-2


ОДНОАТОМН ЫЕ СПИРТЫ

Виды структурной изомерии:

3. Межклассовая изомерия

- Изомеры относятся к разным классам органических соединений.

$\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH}$ этиловый спирт
(ОДНОАТОМНЫЕ СПИРТЫ)




$\text{CH}_3\text{—O—CH}_3$
диметиловый эфир (ПРОСТЫЕ
ЭФИРЫ)

Виды пространственной изомерии (стереоизомерии)

Геометрическая


- Характерна для соединений с двойной углерод – углеродной связью, так как по месту такой связи молекула имеет **плоскостное строение**.



Модель молекулы
этилена

Оптическая



- Оптической изомерией обладают вещества, молекулы которых имеют **асимметрический**, или **хиральный**, атом углерода, связанный с четырьмя различными заместителями



Виды пространственной изомерии

Геометрическая



- Например, для бутена-2, если одинаковые группы атомов у атомов углерода при двойной связи находятся по одну сторону от плоскости C=C – связи, то молекула является **цис-** изомером. Если по ~~разные~~ стороны – **транс-** изомером.



Виды пространственной изомерии.

Оптическая

- Оптические изомеры являются зеркальным изображением друг друга, подобно двум ладоням, и не




С греческого **хирос** – рука – образец
нессимметричной фигуры

Виды пространственной изомерии.

Оптическая


- В виде двух оптических изомеров существует 2-оксипропановая (молочная) кислота, содержащая один асимметричный атом углерода.



Виды пространственной изомерии.

Оптическая

- У хиральных молекул возникают изомерные пары (зеркальные отображения).



Виды пространственной изомерии.

Оптическая

- Пара таких изомеров обладает одинаковыми химическими и физическими свойствами, за исключением оптической активности: если один изомер вращает плоскость поляризованного света по часовой стрелке (правовращающим), то другой — против (левовращающим) 

- Кто впервые предложил термин изомерия?



- Кто еще занимался изучением изомеров?



Что такое изомерия?

- явление существования изомерных соединений.

- **Какие виды изомерии
вы запомнили?**



Какие вещества называются изомерами?

- - вещества, имеющие одинаковый качественный и количественный состав, но разное строение и разные свойства.

Вывод:

- **Изомеры** – соединения, молекулы которых содержат атомы одних и тех же химических элементов, но отличаются своей формой и взаимным расположением атомов.

Источники информации

- **Химия. 10 класс. Базовый уровень:
учеб. для общеобразоват.
учреждений / О.С.Габриелян – М.:
Дрофа, 2010. – 189, (6) с. (с.18-20)**
- **Органическая химия. Весь школьный
курс в таблицах /сост. С.А.
Литвинова, Н.В.Манкевич. – Минск:
Современная школа: Кузьма, 2008, -
400 с. (с.148-149)**