


Водород





План:

1. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева
2. Строение атома и молекулы
3. Физические свойства
4. Химические свойства
5. Получение
6. Применение.

1. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева



1 -

Н -



1 -

Водород –

Н₂ -

2 -


2. Строение атома и молекулы



2. Строение атома и

Ковалентная неполярная связь

2. Строение атома и молекулы






3. Физические

свойства



Водород — газ без цвета и запаха, плохо растворим в воде, в 14,5 раз легче воздуха.



4. Химические






**Водород может быть
восстановителем, так и
окислителем**



?

?



4. Получение





Генри Кавендиш

Английский физик и химик. Является одним из создателей газовой химии. Наблюдал выделение водорода, приняв его за флогистон. Показал, что продуктом водорода является вода.

4. Получение

В лаборатории



4. Получение


В промышленности водород получают из водяного пара при взаимодействии его с коксом, который в основном состоит из углерода, из природного газа метана CH_4 и др.



5. Применение.




- ❖ Синтезе HCl и NH_3
- ❖ Резка, сварка и получении металлов
- ❖ Переработка нефти и жиров.



Задача.
**Определите, какое
количество вещества
водорода получится, если в
реакцию вступили натрий
и вода массой 3,6 г?**

II способ




$$x = \frac{3,6 \text{ г} \cdot 1 \text{ моль}}{36 \text{ г/моль}} = 0,1 \text{ моль H}_2.$$

О т в е т: образуется 0,1 моль водорода.

1 способ

1. Составляем уравнение реакции:



2. Находим количество вещества (ν) воды:

$$\nu(\text{H}_2\text{O}) = \frac{m(\text{H}_2\text{O})}{M(\text{H}_2\text{O})} = \frac{3,6 \text{ г}}{18 \text{ г/моль}} = 0,2 \text{ моль.}$$

3. Составляем и решаем пропорцию:

$$2 \text{ моль } \text{H}_2\text{O} \text{ — } 1 \text{ моль } \text{H}_2$$

$$0,2 \text{ моль } \text{H}_2\text{O} \text{ — } x \text{ моль } \text{H}_2$$

$$x = \frac{0,2 \cdot 1}{2} = 0,1 \text{ моль } \text{H}_2.$$

Спасибо
за внимание

