

Математика

Определенный интеграл

Определенный интеграл

1. Определенный интеграл как предел интегральных сумм.
2. Свойства определенного интеграла.
3. Формула Ньютона-Лейбница.
4. Основные методы интегрирования.
5. Приложения определенного интеграла.

Определенный интеграл как предел интегральных сумм

Пусть функция $y=f(x)$ определена на отрезке $[a; b]$, $a < b$. Выполним следующие действия.

1. С помощью точек $x_0=a, x_1, x_2, \dots, x_n=b$ разобьем отрезок $[a; b]$ на n *частичных отрезков* $[x_0; x_1], [x_1; x_2], \dots, [x_{n-1}; x_n]$.
2. В каждом частичном отрезке $[x_{i-1}; x_i]$, $i=1, 2, \dots, n$ выберем произвольную точку $c_i \in [x_{i-1}; x_i]$ и вычислим значение функции в ней, т. е. величину $f(c_i)$.

Определенный интеграл как предел интегральных сумм

3. Умножим найденное значение функции $f(c_i)$ на длину соответствующего частичного отрезка: $f(c_i)\Delta x$. Составим сумму S_n всех таких произведений:

$$S_n = f(c_1)\Delta x + f(c_2)\Delta x + \dots + f(c_n)\Delta x \quad (1)$$

Сумма вида. (1) называется *интегральной суммой* функции $y=f(x)$ на отрезке $[a; b]$. Обозначим через Δx длину наибольшего частичного отрезка: $(i = 1, 2, \dots, n)$.

Определенный интеграл как предел интегральных сумм

5. Найдем предел интегральной суммы (1), когда $n \rightarrow \infty$ что $\lambda \rightarrow 0$. Если при этом интегральная сумма S_n имеет предел I , который не зависит ни от способа разбиения отрезка $[a; b]$ на частичные отрезки, ни от выбора точек в них, то число I называется *определенным интегралом* от функции $y = f(x)$ на отрезке $[a; b]$ и обозначается $\int_a^b f(x) dx$. Таким образом,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \quad (2)$$

Определенный интеграл как предел интегральных сумм

Числа a и b называются соответственно *нижним и верхним пределом интегрирования*, $f(x)$ – *подынтегральной функцией*, $f(x)dx$ – *подынтегральным выражением*, x – *переменной интегрирования*, отрезок $[a; b]$ – *областью (отрезком) интегрирования*.

Функция $y = f(x)$, для которой на отрезке $[a; b]$ существует определенный интеграл, называется *интегрируемой* на этом отрезке.

Свойства определенного интеграла из определения (2)

1. Определенный интеграл не зависит от обозначения переменной интегрирования.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(z)dz$$

2. Определенный интеграл с одинаковыми пределами интегрирования равен нулю:

$$\int_a^a f(x)dx = 0$$

3. Для любого действительного числа c :
- $$\int_a^b cdx = c \cdot (b - a)$$

Свойства определенного интеграла

1. Постоянный множитель можно выносить за знак интеграла, т.е.

$$\int_a^b \alpha f(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx$$

где α - некоторое число.

Свойства определенного интеграла

2. Интеграл от алгебраической суммы двух функций равен такой же сумме интегралов от этих функций, т.е.

$$\int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

Свойства определенного интеграла

3. Если отрезок интегрирования разбит на части, то интеграл на всем отрезке равен сумме интегралов для каждой из возникших частей, т. е. при любых a, b, c :

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

Свойства определенного интеграла

4. Если на отрезке $[a, b]$, где $a < b$, $f(x) \leq g(x)$, то обе части неравенства можно почленно интегрировать:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

5.

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

Свойства определенного интеграла

Теорема о среднем. Если функция $y=f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, (где $a < b$), то найдется такое значение $[a, b]$, что

$$\int_a^b f(x)dx = f(c) \cdot (b - a)$$

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \quad \text{-среднее значение}$$

функции на $f(c)$ на отрезке $[a, b]$.

Формула Ньютона-Лейбница

Пусть функция $y = f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и $F(x)$ — любая первообразная для $f(x)$ на $[a, b]$. Тогда определенный интеграл от функции $f(x)$ на $[a, b]$ равен приращению первообразной $F(x)$ на этом отрезке, т.е.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Основные методы интегрирования.

Замена переменной.

Пусть функция $\varphi(t)$ имеет непрерывную производную на отрезке $[\alpha, \beta]$, $a = \varphi(\alpha)$, $b = \varphi(\beta)$ и функция $f(x)$ непрерывна в каждой точке x вида $x = \varphi(t)$, где $t \in [\alpha, \beta]$.

Тогда справедливо следующее равенство

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

Основные методы интегрирования.

Интегрирование по частям.

Пусть функции $u=u(x)$ и $v=v(x)$ имеют непрерывные производные на отрезке $[a,b]$.
Тогда

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$$


Приложения определенного интеграла.

Вычисление площадей плоских фигур. Пусть функция $y=f(x)$ неотрицательна и непрерывна на отрезке $[a, b]$. Тогда по геометрическому смыслу определенного интеграла площадь S под кривой $y=f(x)$ на $[a, b]$ численно равна определенному интегралу, т.е.

$$S = \int_a^b f(x)dx$$

Приложения определенного интеграла.

Если плоская фигура ограничена несколькими линиями (см рис.), то формула для вычисления площади такой фигуры имеет вид



$$S = \int_a^b (f(x) - \varphi(x)) dx$$

Приложения определенного интеграла.

Вычисление объемов тел вращения. Пусть на отрезке $[a, b]$ задана непрерывная знакопостоянная функция $y=f(x)$. Объемы тела вращения, образованного вращением вокруг оси Ox (или оси Oy) криволинейной трапеции, ограниченной кривой $y=f(x)$ ($f(x) \geq 0$) и прямыми $y=0$, $x=a$, $x=b$, вычисляются соответственно по формулам:

$$V_x = \pi \int_a^b y^2 dx$$

$$V_y = 2\pi \int_a^b xy dx, a \geq 0.$$

Приложения определенного интеграла.

Если тело образуется при вращении вокруг оси Oy криволинейной трапеции, ограниченной кривой $x=\varphi(y)$ ($\varphi(y) \geq 0$) и прямыми $x=0$, $y=c$, $y=d$, то объем тела вращения равен

$$V = \pi \int_c^d x^2 dy$$

Приложения определенного интеграла. Прирост численности популяции.

Прирост популяции равен определенному интегралу от скорости по интервалу времени ее размножения:

$$N(t) = \int_{t_0}^T v(t) dt$$

где $v(t)$ -скорость роста некоторой популяции,
 $N(t)$ -прирост численности за промежуток
времен t_0 до T .