

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ БИО-МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ

СЕРИЯ 8



Методы анализа выживаемости. Кривые Каплана-Майера. Сох-регрессия

Анализ данных выживаемости

- Статистические методы анализа продолжительных (во времени) данных, отражающих **наступление событий**
- К событиям относятся: смерть, травма, наступление заболевания, выздоровление (**бинарные показатели**), или переход через **пороговое значение** какой-либо интервальной переменной (например, снижение уровня лейкоцитов ниже нормы)
- Включает данные **рандомизированных контролируемых исследований** или исследований **когортного дизайна**

Зачем нужен анализ данных выживаемости?


- Почему нельзя сравнить время до наступления события в группах при помощи t-теста или линейной регрессии?
 - Если нет цензурирования, то так сделать можно, в противном случае – данные отсутствуют
- Почему нельзя сравнить частоты событий в группах при помощи риска/отношений шансов или логистической регрессии?
 - Такой подход игнорирует время до наступления события




- **Выживаемость:** вероятность прожить более n времени с момента события
- **Время до наступления события:** время с момента включения в исследование до наступления заранее оговоренного (и точно определенного) исхода
- **Цензурирование:** вариант развития событий, когда пациенты выбывают или исключаются из исследования до наступления интересующего исхода. В этом случае пациенты считаются живыми или с ненаступившим целевым исходом на момент последнего контакта

Кривые Каплана-Мейера


- Непараметрическая оценка функции выживания
 - Эмпирическая вероятность выжить после определенного времени (с учетом цензурирования)
 - Обычно используется для сравнения двух исследуемых популяций
 - Интуитивное графическое представление



Данные выживаемости



Соответствующая кривая Каплана-Мейера



Из теории вероятностей:

$P(A \& B) = P(A) * P(B)$ если A и B независимы

В анализе выживаемости: интервалы определяются наступлением событий (2 интервала, заканчивающиеся наступлением событий).

$P(\text{выжить в течение периодов 1 и 2}) = P(\text{выжить в течение периода 1}) * P(\text{выжить в течение периода 2})$
 $= 4/5 * 2/3 = .5333$

Кривые Каплана-Мейера

Ограничения:

- Оценки выживаемости могут быть **ненадежны** в **конце исследования**, когда остается малое количество пациентов с риском развития исхода
- Отсутствует контроль **ковариат**
- Требует для проведения сравнения **качественных** предикторов (независимых факторов)
- Не может включать предикторные (независимые) переменные, **изменяющиеся со временем**

Сох-регрессия

- Аналогична логистической регрессии
- Работает с факторами и ковариатами
- Есть варианты метода работающие с изменяющимися во времени переменными
- Обладает меньшей мощностью и сложнее в трактовке

Reports	▶
Descriptive Statistics	▶
Custom Tables	▶
Compare Means	▶
General Linear Model	▶
Generalized Linear Models	▶
Mixed Models	▶
Correlate	▶
Regression	▶
Loglinear	▶
Neural Networks	▶
Classify	▶
Dimension Reduction	▶
Scale	▶
Nonparametric Tests	▶
Forecasting	▶
Survival	▶
Multiple Response	▶
 Missing Value Analysis...	
Multiple Imputation	▶
Complex Samples	▶
 Simulation...	
Quality Control	▶
 ROC Curve...	
 Ranfor Prediction	
 RanFor Estimation...	
Spatial and Temporal Modeling...	▶
 Linear Programming	

[illegible]

Survival



Visible: 4 of 4 Variables

	RatID	FatLevel	TumorFreeTime	Censored	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var
1	1	1	140,00	0												
2	2	1	177,00													
3	3	1	50,00													
4	4	1	65,00													
5	5	1	86,00													
6	6	1	153,00													
7	7	1	181,00													
8	8	1	191,00													
9	9	1	77,00													
10	10	1	84,00													
11	11	1	87,00													
12	12	1	56,00													
13	13	1	66,00													
14	14	1	73,00													
15	15	1	119,00													
16	16	1	140,00													
17	17	1	200,00													
18	18	1	200,00													
19	19	1	200,00													
20	20	1	200,00	1												
21	21	1	200,00	1												
22	22	1	200,00	1												
23	23	1	200,00	1												

Life Tables

Time: TumorFreeTime Options...

Display Time Intervals
0 through 200 by 10

Status: Censored(0) Define Event...

Factor: FatLevel(1 3) Define Range...

By Factor: Define Range...

OK Paste Reset Cancel Help

Life Tables: Options

☒ Life table(s)

Plot

☒ Survival ☐ Log survival
☐ Hazard ☐ Density
☐ One minus survival

Compare Levels of First Factor

☒ None
☐ Overall
☐ Pairwise

Continue Cancel Help



	RatID	FatLevel	TumorFreeTime	Censored	var
1	1	1	140,00	0	
2	2	1	177,00	0	
3	3	1	50,00	0	
4	4	1	65,00	0	
5	5	1	86,00	0	
6	6	1	153,00	0	
7	7	1	181,00	0	
8	8	1	191,00	0	
9	9	1	77,00	0	
10	10	1	84,00	0	
11	11	1	87,00	0	
12	12	1	56,00	0	
13	13	1	66,00	0	
14	14	1	73,00	0	
15	15	1	119,00	0	
16	16	1	140,00	1	
17	17	1	200,00	1	
18	18	1	200,00	1	
19	19	1	200,00	1	
20	20	1	200,00	1	
21	21	1	200,00	1	
22	22	1	200,00	1	
23	23	1	200,00	1	

Kaplan-Meier: Compare Factor Levels

Test Statistics

☒ Log rank ☒ Breslow ☒ Tarone-Ware

☒ Linear trend for factor levels

☒ Pooled over strata ☐ Pairwise over strata

☐ For each stratum ☐ Pairwise for each stratum

Continue Cancel Help

Kaplan-Meier

Kaplan-Meier: Compare Factor Levels

Time: TumorFreeTime

Status: Censored(0)

Define Event...

Factor: FatLevel

Strata:

Label Cases by: RatID

OK Paste Reset Cancel Help

Compare Factor... Save... Options...



Visible: 4 of 4 Variables

	RatID	FatLevel	TumorFreeTime	Censored	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var
1	1	1	140,00	0											
2	2	1	177,00	0											
3	3	1	50,00	0											
4	4	1	65,00	0											
5	5	1	86,00	0											
6	6	1	153,00												
7	7	1	181,00												
8	8	1	191,00												
9	9	1	77,00												
10	10	1	84,00												
11	11	1	87,00												
12	12	1	56,00												
13	13	1	66,00												
14	14	1	73,00												
15	15	1	119,00												
16	16	1	140,00												
17	17	1	200,00												
18	18	1	200,00												
19	19	1	200,00												
20	20	1	200,00	1											
21	21	1	200,00	1											
22	22	1	200,00	1											
23	23	1	200,00	1											

Kaplan-Meier

Kaplan-Meier: Options

Statistics

- ☒ Survival table(s)
- ☒ Mean and median survival
- ☒ Quartiles

Plots

- ☒ Survival
- ☐ One minus survival
- ☒ Hazard
- ☒ Log Survival

Time:

TumorFreeTime

Status:

Censored(0)

Factor:

FatLevel


Strata:

Label Cases by:


RatID


OK Paste Reset Cancel Help

Compare Factor... Save... Options... Define Event...



</





Лирическое отступление

Доказательная медицина

- Несмотря на проблемы, доказательная медицина остается «золотым стандартом»
- С одной стороны: возможность искать причины заболеваний без глубокого понимания механизмов
- С другой стороны: упор на экстенсивное изучение факторов, предикторов и сравнение групп в ущерб изучению физиологии приводит к тому, что увеличивается количество данных, но не смысла

Доказательная медицина и причинно-следственные механизмы

- Все больше внимания к статистическим результатам, часто некритичного
- Предположение, что механизм *может* существовать достаточно, чтобы результаты исследования были некритически приняты
- Свидетельство того, что вмешательство работает – не говорит о том, что оно работает именно по этому механизму
- Отсутствие знания патофизиологических механизмов может тормозить разработку более эффективных методов вмешательства

Спасибо за внимание!

