


Вычисление площадей плоских фигур более сложного вида с помощью определенного интеграла

11 класс




Задание 1. Поставьте в соответствие фигуру и формулу нахождения ее площади.


1




2




3




4



5



6



$$a) S = \int_a^b f(x) dx$$

$$c) S = \pi a^2$$


$$e) S = \left| \int_a^b f(x) dx \right|$$

$$b) S = \frac{a+b}{2} b$$

$$d) S = ab$$

$$f) S = \frac{1}{2} ab$$

7




Правильные ответы к заданию 1.


- 1-d
- 2-e
- 3-нет формулы
- 4-f
- 5-b
- 6-c
- 7-a




Задание 2. По известным формулам попробуйте вычислить площади фигур, закрашенных синим цветом.



1



2



3

Задание 3. Что общего в нахождении площадей фигур задания 2?

Правильный ответ

Площадь S фигуры, ограниченной прямыми $x=a$, $x=b$ и графиками функций $y=f(x)$, $y=g(x)$, непрерывных на отрезке $[a;b]$ и таких, что для всех x из отрезка $[a;b]$ выполняется неравенство $g(x) \leq f(x)$, вычисляется по формуле

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$



Задание 4. Алгоритм нахождения площади плоских фигур более сложного вида с помощью определенного интеграла

- Графически построить фигуру, ограниченную заданными функциями
- Определить прямые $x=a$ и $x=b$, которые ограничивают данную фигуру (если не заданы, то найти абсциссы точек пересечения графиков функций)
- Определить график какой функции на отрезке $[a;b]$ выше – это и будет функция $y=f(x)$, а другая $y=g(x)$
- Применить формулу вычисления площади

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x))dx$$



Пример. Вычислите площадь фигуры, ограниченной прямой $y=x-2$ и параболой $y=x^2-4x+2$.

Графически построить фигуру, ограниченную графиками заданными функциями

Графиком функции $y=x-2$ является прямая, поэтому достаточно найти две точки.

$$y(2)=2-2=0 \quad (2;0)$$

$$y(6)=6-2=4 \quad (6;4)$$

Графиком функции $y=x^2-4x+2$ является парабола, ветви которой направлены вверх.

Вершина параболы: $y'=0$,


$$(x^2-4x+2)'=2x-4, \quad 2x-4=0, \quad x=2$$

$$y(2)=2^2-4 \cdot 2+2=-2 \quad (2;-2)$$

Ось симметрии $x=2$

$$y(3)=3^2-4 \cdot 3+2=-1 \quad (3;-1), (1;-1)$$

$$y(4)=4^2-4 \cdot 4+2=2 \quad (4;2), (0;2)$$



Пример. Вычислите площадь фигуры, ограниченной прямой $y=x-2$ и параболой $y=x^2-4x+2$.

Определить прямые $x=a$ и $x=b$

$$x^2 - 4x + 2 = x - 2$$


$$x^2 - 4x + 2 - x + 2 = 0$$

$$x^2 - 5x + 4 = 0$$

$$x_1 = 1, x_2 = 4$$

Определить график какой функции на отрезке $[a;b]$ выше – это и будет функция $y=f(x)$, а другая $y=g(x)$

График функции $y=x-2$ на отрезке $[1;4]$ располагается выше графика функции $y=x^2-4x+2$



Пример. Вычислите площадь фигуры, ограниченной прямой $y=x-2$ и параболой $y=x^2-4x+2$.

Применить формулу вычисления площади


$$S = \int_1^4 ((\tilde{o}-2) - (x^2 - 4\tilde{o} + 2)) dx = \int_1^4 (-\tilde{o}^2 + 5\tilde{o} - 4) dx = \left(-\frac{x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} - 4x \right) \Big|_1^4 =$$

$$= \left(-\frac{4^3}{3} + \frac{5 \cdot 4^2}{2} - 4 \cdot 4 \right) - \left(-\frac{1^3}{3} + \frac{5 \cdot 1^2}{2} - 4 \cdot 1 \right) = 4,5$$

Итог урока

- Как найти площади изображенных фигур?


Ответ:



1) Если $y=f(x)$ – непрерывная $f(x) \geq 0$ на $[a;b]$, то

$$S = \int_a^b f(x) dx$$

Ответ:




2) Если $y=f(x)$ – непрерывная $f(x) \leq 0$ на $[a;b]$, то

$$S = - \int_a^b f(x) dx = \left| \int_a^b f(x) dx \right|$$

Итог урока

- Как найти площади изображенных фигур?




Ответ:

3) Если $y=f(x)$, $y=g(x)$ – непрерывные на $[a, b]$, $f(x) \geq g(x)$ на $[a, b]$, то

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

Ответ:




4) Если $y=f(x)$, $y=g(x)$ – непрерывные на $[a, b]$, $f(x) \geq g(x)$ на $[a, b]$, то

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

Итог урока

- Как найти площади изображенных фигур?


Ответ:



5) Если $y=f(x)$, $y=g(x)$ – непрерывные на $[a,b]$, $f(x) \geq g(x)$ на $[c;b]$, где $c \in [a,b]$, $f(x) \leq g(x)$ на $[a;c]$, то

$$S = \int_a^c (g(x) - f(x)) dx + \int_c^b (f(x) - g(x)) dx$$


Ответ:



6) Если $y=f(x)$ – непрерывная на $[a;c]$, $y=g(x)$ – непрерывная на $[b;c]$, $f(x) \geq g(x)$ на $[a;c]$, где $c \notin [a;b]$, то

$$S = \int_a^c f(x) dx - \int_c^b g(x) dx$$

Ответ:



7) Если $y=f(x)$ – непрерывная на $[a;c]$, $y=g(x)$ – непрерывная на $[c;b]$, где $c \in [a;b]$, то

$$S = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b g(x) dx$$