


A photograph of a surgical team in an operating room. Three surgeons in blue scrubs and masks are performing an operation on a patient lying on a table. The patient is wearing a green surgical cap and has an oxygen mask over their face. The room is brightly lit with surgical lights. A purple text box is overlaid on the right side of the image.

Акушерські операції. Класифікація. Принципи і методи знеболення

Акушерські операції

- В акушерській практиці оперативне лікування застосовується досить широко і рішення про хірургічне лікування виноситься на підставі детального ретельного обстеження вагітної, роділлі, породіллі.



WWW.FOTOBANK.RU DV00-3600 Digital Vision RF
418 053


- Показаннями до оперативного лікування служать захворювання, ускладнення, що загрожують стану матері

- Як правило, всі акушерські операції проводяться лікарем, але у невідкладних випадках, коли лікаря немає і немає можливості перевезти породіллю в лікарню, акушерка зобов'язана відповідно до інструкції **МОЗ (від 29.07.54)** провести необхідну операцію з дотриманням правил асептики і антисептики без застосування загального наркозу





Показання до акушерських операцій-

- Це сукупність причин,що зумовляють потребу в проведенні певного оперативного втручання.
 - Виконувати операцію можна лише за певних умов.
- 

УМОВИ-

- Це сукупність обставин, які дають змогу проводити цю операцію.
- Існують **загальні умови**, а саме:
 - ✓ наявність операційної, відповідного обладнання та інструментарію
 - ✓ присутність хірурга, який володіє технікою операції
 - ✓ наявність анестезіологічно - реанімаційної служби
 - ✓ згода хворої (роділлі, породіллі) на операцію

Крім того існують **особливі умови** для кожної конкретної операції (*повне розкриття шийки матки для накладання акушерських щипців*)

Підготовка до акушерських операцій (планових)

- Готовність до роботи операційних (наявність стерильних наборів інструментів, апаратури, перев'язувального матеріалу, інфузійних засобів)
- Лабораторне, функціональне дослідження вагітної
- Підготовка кишечника, гоління
- Консультація анестезіолога, хірурга
- Згода жінки на операцію

Підготовка хворий (вагітною, роділлі, породіллі) до екстреної операції:

- гігієнічна обробка, промивання шлунка або зондування,
премедикація, катетеризація сечового міхура .



Класифікація акушерських операцій

- ❑ **Операції, що застосовують для переривання вагітності** (медикаментозне, оперативне переривання)
- ❑ **Операції, які зберігають вагітність** (при істміко-цервікальній недостатності- накладання швів на шийку матки)
- ❑ **Операції, що готують пологові шляхи** (перінео-, епізіотомія)
- ❑ **Операції, що виправляють положення плода** (акушерські повороти)
- ❑ **Розроджувальні операції** (кесарів розтин, акушерські щипці, вакуум-екстракція)
- ❑ **Плодоруйнівні операції**
- ❑ **Операції, що застосовують у послідовому та післяпологовому періоді**

Класифікація акушерських операцій

1 . Операції, які застосовуються під час вагітності:

А) зберігають вагітність	Б) переривають вагітність - при затримці менструації до 49 днів - у терміні до 12 тижнів - в терміні 13 - 22 тижнів	В) при порушеній позаматковій вагітності	Г) виправляють неправильне положення плоду
--------------------------	---	--	--

2 . Операції, які застосовуються в пологах:

А) підготовка родових шляхів (перінео-, епізіотомія)	Б) розроджувальні операції (кесарів розтин, акушерські щипці, вакуум-екстракція)	В) Плідоруйнівні операції	
--	--	---------------------------	--

3. Операції, які застосовуються в послідовно і ранньому післяпологовому періоді:

А) ручне відділення і виділення посліду	Б) ручне обстеження порожнини матки	В) перінео - епізіотомія	
---	-------------------------------------	--------------------------	--

Операції, які застосовуються під час вагітності


Операції, що зберігають вагітність

Застосовуються при істміко - цервікальній недостатності (ІЦН) ІЦН - неспроможність кругової мускулатури перешийка і кругових м'язових волокон, розташованих навколо внутрішнього зіву.


Лікування ІЦН при вагітності

- **хірургічне** - накладення на шийку матки циркулярного шва в області внутрішнього зіву

- **Зовнішній зів** зашивають зовнішніми кетгутовими швами.



Open cervix



Cerclage



Переривання вагітності проводиться в медичному закладі:

- **в ранні терміни до 4 - 6 тижнів** - міні – аборт проводиться методом - вакуум - аспірації без розширення шийки матки трубкою діаметром 5 - 7 мм протягом 15 - 20 сек. **Обсяг крововтрати 15 - 20 мл.**
- **До 12 тижнів** - штучний медичний аборт.
- **в пізні терміни 13 - 22 тижні.**

Показання для переривання вагітності:

- бажання жінки
- медичні показання і згода жінки
- соціальні показання і згода жінки

Медичні показання :

- захворювання,
- стану,
- загрозливі здоров'ю жінки.

Наказ № 302 МОЗ 28.12.93 містить інструкцію про порядок вирішення проведення операції медичного аборту - переривання вагітності за медичними показаннями та перелік захворювань і станів, що дозволяють перервати вагітність.

Вагітність переривається у разі:

- вродженої патології, встановленої методами пренатальної діагностики
- при ризику народження дитини з вродженою та спадковою патологією
- при прийомі препаратів, що мають ембріо - фетотоксичним дією під час вагітності (що підтверджується документально).
- стан фізіологічної незрілості - неповноліття - стан згасання репродуктивної функції - вік жінки 40 років і старше .

Протипоказання до переривання вагітності:

- запальні захворювання жіночих статевих органів
- запальні захворювання будь-якої етіології
- гострі інфекційні захворювання.


Ускладнення

- ❖ кровотеча
- ❖ запальні захворювання
- ❖ порушення менструального циклу
- ❖ безпліддя
- ❖ перфорація статевих органів, поранення органів черевної порожнини



Операції у зв'язку з позаматкової вагітністю


Позаматкова вагітність



При позаматкової вагітності плодове яйце імплантується і розвивається поза порожниною матки - в матковій трубці (в ампулярном, истмическом, интрамуральном відділі), шийці матки, додатковому розі матки, яєчнику, органах черевної порожнини (брижі кишечника, широка зв'язка, будь-який орган черевної порожнини).


Операції, що виправляють неправильне положення плода протягом вагітності та пологів.

Акушерський поворот - операція, що виправляє невігідне становище плода на інше сприятливіше з акушерської точки зору, але завжди поздовжнє.



Показання для акушерського повороту

- поворот для виправлення патологічного стану плода, коли пологи через природні родові шляхи неможливі
- поперечне положення плода




Методи знеболювання операцій



Catheter


Epidural space



Епідуральна анестезія - знеболюючий препарат вводиться досвідченим анестезіологом через тонку голку в простір поруч зі спинним мозком.



Загальна анестезія (наркоз) - стан, що характеризується тимчасовим відключенням свідомості, больової чутливості, рефлексів і розслабленням скелетних м'язів, викликане впливом наркотичних речовин на центральну нервову систему.



Місцеве знеболювання (місцева анестезія) - вид анестезії, сутність якого полягає в блокаді больових та інших імпульсів з області оперативного втручання шляхом переривання нервової передачі.

Дякую за увагу!

