



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
им. Н.И. ПИРОГОВА



АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ

А. М. Кулагина

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Термин «гипертоническая болезнь» был предложен Г.Ф.Лангом в 1948 г.

Под ГБ принято понимать хронически протекающее заболевание, основным проявлением которого является АГ, не связанная с наличием патологических процессов.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ

В целом, распространенность АГ находится в диапазоне 30–45% общей популяции, с резким возрастанием по мере старения

КЛАССИФИКАЦИЯ УРОВНЕЙ АД

<i>Категория артериального давления</i>	<i>САД</i>	<i>ДАД</i>	
Оптимальное	< 120	и	< 80
Нормальное	120-129	и/или	80-84
Высокое нормальное	130-139	и/или	85-89
Артериальная гипертония 1 степени	140-159	и/или	90-99
Артериальная гипертония 2 степени	160-179	и/или	100-109
Артериальная гипертония 3 степени	≥ 180	и/или	≥ 110
Изолированная систолическая артериальная гипертония	≥ 140	и	< 90

ФАКТОРЫ РИСКА

- Величина пульсового АД (у пожилых)
- Возраст (мужчины >55 лет; женщины >65 лет)
- Курение
- Дислипидемия: ОХС>5,0 ммоль/л (190 мг/дл)
или ХС ЛПНП>3,0 ммоль/л (115 мг/дл)
или ХС ЛПВП<1,0 ммоль/л (40 мг/дл) для мужчин
и <1,2 ммоль/л (46 мг/дл) для женщин
или ТГ>1,7 ммоль/л (150 мг/дл)
- Глюкоза плазмы натощак 5,6–6,9 ммоль/л
- НТГ
- Семейный анамнез ранних ССЗ (у мужчин <55 лет; у женщин <65 лет)
- АО (ОТ>102 см для мужчин и >88 см для женщин) при отсутствии МС

ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ МИШЕНЕЙ

ГЛЖ (ЭКГ, ЭхоКГ)

Сосуды

- УЗ-признаки утолщения стенки артерии (ТИМ > 0,9 мм) или атеросклеротические бляшки магистральных сосудов
- Скорость пульсовой волны от сонной к бедренной артерии > 12 м/с

Почки

- Небольшое повышение сывороточного креатинина: 115–133 мкмоль/л (1,3–1,5 мг/дл) для мужчин или 107–124 мкмоль/л (1,2–1,4 мг/дл) для женщин
- Низкая СКФ < 60 мл/мин/1,73 м² (MDRD-формула) или низкий клиренс креатинина < 60 мл/мин (формула Кокрофта-Гаулта)
- МАУ 30–300 мг/сут

АССОЦИИРОВАННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ

ЦВБ

- ишемический МИ
- геморрагический МИ
- ТИА

Заболевания сердца

- ИМ
- стенокардия
- коронарная реваскуляризация

Заболевания почек

- диабетическая нефропатия
- почечная недостаточность: сывороточный креатинин

75 г глюкозы $\geq 7,8$ и $\leq 11,1$ ммоль/л > 133 мкмоль/л (1,5 мг/дл) для мужчин и > 124 мкмоль/л

Заболевания периферических артерий

- расслаивающая аневризма аорты
- симптомное поражение периферических артерий

Гипертоническая ретинопатия

- кровоизлияния или экссудаты
- отек соска зрительного нерва

ОЦЕНКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА

**По Фрамингемской модели вероятность
развития ССО и смерти от них в течение
ближайших 10 лет:**

низкий риск - менее 15%,

средний риск – 15–20%,


высокий риск – 20–30%,

очень высокий риск – более 30%.

ОЦЕНКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА

ФР, ПОМ и СЗ	АД, мм рт. ст.		
	АГ 1-й степени 140–159/90–99	АГ 2-й степени 160–179/100–109	АГ 3-й степени $\geq 180/110$
Нет ФР	Низкий дополнительный риск	Средний дополнительный риск	Высокий дополнительный риск
1–2 ФР	Средний дополнительный риск	Средний дополнительный риск	Очень высокий дополнительный риск
≥ 3 ФР, ПОМ, МС или СД	Высокий дополнительный риск	Высокий дополнительный риск	Очень высокий дополнительный риск
АКС	Очень высокий дополнительный риск	Очень высокий дополнительный риск	Очень высокий дополнительный риск

ОЦЕНКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА



ОЦЕНКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА

По системе SCORE вероятность смерти в течение ближайших 10 лет:

низкий риск соответствует менее 1%,

средний риск – 1–4%,

высокий риск – 5–9%,

очень высокому риск – 10% и более.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ

	САД	ДАД
Перенесенный инсульт	< 140	<90
Сахарный диабет	< 130	< 80
Другие пациенты	< 120	< 80

ОСТРАЯ ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ИШЕМИЯ

- ▶ Длительная пероральная антигипертензивная терапия при вновь установленной ГБ должна начинаться не ранее 24 часов от дебюта заболевания
- ▶ Рестарт антигипертензивной терапии у пациентов, принимавших гипотензивные препараты до инсульта должен начаться спустя 24 часа после дебюта заболевания
- ▶ в первые 24 часа допустимо АД 220/110мм рт.ст.
- ▶ • во время тромболизиса и в первые 24 часа после него АД необходимо поддерживать ниже 185/110мм рт.ст.
- ▶ • целевая редукция составляет 15% в течение 24 часов (5-10мм.рт.ст. в час в первые 4 часа, затем 5-10мм.рт.ст. за каждые 4 часа)
- ▶ • нифедипин не применять из-за опасности резкого снижения АД


ОСТРАЯ ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ИШЕМИЯ

	МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ГБ анамнезе	220/110 мм.рт.ст.	180/100-105 мм.рт.ст.
ГБ нет в анамнезе	220/110 мм.рт.ст.	160-180/90-100 мм.рт.ст.
Планируется тромболизис	185/110 мм.рт.ст.	160-180/90-100 мм.рт.ст.

ВЫБОР СТАРТОВОЙ ТЕРАПИИ

Выбор стартовой терапии для достижения целевого уровня АД [1]

Определить степень сердечно-сосудистого риска



Препараты, предпочтительные в конкретных ситуациях

Клиническая ситуация	Препараты
Бессимптомное поражение органов-мишеней	
ГЛЖ	Ингибитор АПФ, антагонист кальция, БРА
Бессимптомный атеросклероз	Антагонист кальция, ингибитор АПФ
Микроальбуминурия	Ингибитор АПФ, БРА
Нарушение функции почек	Ингибитор АПФ, БРА
ССЗ	
Инсульт в анамнезе	Любой препарат, эффективно снижающий АД
Инфаркт миокарда в анамнезе	Бета-блокатор, ингибитор АПФ, БРА
Стенокардия	Бета-блокатор, антагонист кальция
Сердечная недостаточность	Диуретик, бета-блокатор, ингибитор АПФ, БРА, антагонисты минералокортикоидных рецепторов


ситуациях

Клиническая ситуация	Препараты
Аневризма аорты	Бета-блокаторы
Фибрилляция предсердий, профилактика	БРА, ингибитор АПФ, бета-блокатор или антагонист альдостерона
Фибрилляция предсердий, контроль ритма желудочков	Бета-блокаторы, недигидропиридиновый антагонист кальция
Терминальная ХБП/протеинурия	Ингибитор АПФ, БРА
Поражение периферических артерий	Ингибитор АПФ, антагонист кальция
ИСАГ (пожилой и старческий возраст)	Диуретик, антагонист кальция
Метаболический синдром	Ингибитор АПФ, БРА, антагонист кальция
Сахарный диабет	Ингибитор АПФ, БРА
Беременность	Метилдопа, бета-блокатор, АК

Негроидная раса

Диуретик, антагонист кальция

РАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМБИНАЦИИ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Таблица 12. Противопоказания к использованию антигипертензивных препаратов (адаптировано из ESC-ESH, 2013)

Препарат	Абсолютные противопоказания	Относительные противопоказания
Тиазидовые диуретики	Подагра	Метаболический синдром Нарушение толерантности к глюкозе Беременность Гиперкальциемия Гипокалиемия
Бета-адреноблокаторы	Бронхиальная астма Атриовентрикулярная блокада (2–3-й степени)	Метаболический синдром Нарушение толерантности к глюкозе Высокая физическая активность Хроническое обструктивное заболевание легких (кроме небиволола и карведилола)
Блокаторы кальциевых каналов (дигидропиридиновые)		Тахикардии Фракция изгнания левого желудочка < 40 % (кроме амлодипина и фелодипина)
Блокаторы кальциевых каналов (верапамил, дилтиазем)	Атриовентрикулярная блокада (2–3-й степени, трифасцикулярная) Фракция изгнания левого желудочка < 40 %	
Ингибиторы АПФ	Беременность Ангioneвротический отек Гиперкалиемия Двусторонний стеноз почечных артерий	Женщины детородного возраста
Сартаны	Беременность Гиперкалиемия Двусторонний стеноз почечных артерий	Женщины детородного возраста
Антагонисты минералокортикоидных рецепторов	СКФ < 30 мл/мин Гиперкалиемия	

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

<http://www.pirogov-center.ru>

