

Диагностика и лечение язвенно- некротического энтероколита

Выполнил: Нурлаев К

Группа:613-01р

Курс:6

План:

- Введение
- Диагностика
- Лечение

-
- **Что такое язвенно-некротический энтероколит????**

Стадии

```
graph TD; A[Стадии] --> B[Стадия 1]; A --> C[Стадия 2]; A --> D[Стадия 3];
```

Стадия
1


Стадия
2

Стадия
3

Диагностика

- Рентгенография органов брюшной полости


Рентгенологические признаки НЭК




1 ст.НЭК – парез кишечника




2 ст.НЭК –выпрямленные,
«ригидные» петли кишечника




3 ст.НЭК – гипопневматоз, гидроперитонеум



3 ст.НЭК – пневматоз кишечной стенки



3 ст.НЭК – газ в системе воротной вены (указан стрелкой)



4 ст.НЭК – пневмоперитонеум (указан стрелкой)

-
- **УЗИ органов брюшной полости:**
 - I стадия
 - II стадия
 - III стадия

Лечение

- **Антибактериальная терапия**
- **Коррекция КОС**
- **Коррекция гемостаза:**
- **Лечение болевого синдрома**
- **Хирургическое вмешательство**

Препарат	Пути введения	Разовые дозы (мг/кг)/интервалы между введением				
		Масса тела <1,2 кг	Масса тела 1,2-2 кг		Масса тела > 2 кг	
		0-4 дней	0-7 дней	>7 дней	0-7 дней	>7 дней
Пенициллины						
Ампициллин	В/в, в/м	25/12 ч	25/12 ч	25/6-8 ч	25/8 ч	25/6 ч
Аминогликозиды						
Гентамицин	В/в, в/м	2,5/18-24 ч	2,5/12-18 ч	2,5/12-18 ч	2,5/12 ч	2,5/8 ч
Гликопептиды						
Ванкомицин	В/в	15/18-36 ч	15/12-18 ч	15/8-12 ч	15/12 ч	15/8 ч
Нитроимидазолы						
Метронидазол	В/в, внутрь	7,5/48 ч	7,5/24 ч	7,5/12 ч	7,5/12 ч	15/12 ч
Цефалоспорины						
Цефуроксим	В/в	50/12 ч	50 /12 ч	50 /8 ч	50 /8 ч	50 /8 ч

Критерии оценки	Норма	Боль/возбуждение	
Плач, раздражительность	0 Плачет не много, спокойный	1 Иногда раздражительный, плачет, но можно успокоить	2 Громко плачет или плачет тихо, но постоянно
Поведение	0 Соответствует гестационному возрасту	1 Спит не спокойно, но можно успокоить	2 Постоянно бодрствует или минимально возбуждён (без седации)
Выражение лица	0 Расслаблен	1 Иногда болезненное	2 Постоянно болезненное
Мышечный тонус	0 Расслаблены кисти и стопы, тонус нормальный	1 Иногда пальцы сжаты или их держит веером, тело напряжено	2 Пальцы постоянно сжаты или веером, тело напряжено
Жизненно важные функции (ЧСС, ЧД, АД, SpO2)	0 На уровне базовых значений или соответствуют норме	1 >10-20%, SpO2 до 76-85%, во время стимуляции восстанавливаются быстро	2 >20%, SpO2 < 75%, во время стимуляции восстанавливаются медленно, нет синхронности с аппаратом ИВЛ

● Спасибо за внимание