


Кафедра нормальной физиологии КрасГМА

Проф. Ю.И. Савченков


Лекция 33

ФИЗИОЛОГИЯ АНАЛИЗАТОРОВ


Часть 1




Структура анализаторной системы




Этапы деятельности анализатора




Строение глаза



Мышцы глаза. А – вид спереди, Б – вид сверху




А




Б


Зрительные пути



Механизм аккомодации глаза



ПОКОЙ




НАПРЯЖЕНИЕ


Миопия



Аккомодация на дальнюю точку




Аккомодация на ближнюю точку



Аккомодация на дальнюю точку
с помощью корректирующей линзы


Гиперметропия



Аккомодация на дальнюю точку



Аккомодация на ближнюю точку




Аккомодация на дальнюю точку
с помощью корректирующей линзы




Аккомодация на ближнюю точку
с помощью корректирующей линзы

Схема строения сетчатки




2 вида фоторецепторов




Распределение палочек и колбочек в сетчатке




Схема образования и обесцвечивания родопсина




Восприятие цвета




Потенциалы фоторецептора



Потенциалы клеток сетчатки




Электроретинография



Примечание. Разность потенциалов между электродами 1 и 2 – 6 мВ.

А




Б


P_1 – компонент палочек; P_2 – реакция биполярных клеток;

P_3 – торможение в рецепторных клетках

Влияние адаптации к свету на ЭРГ




Механизм реакции палочек на фотон света



МРН-2 - метародопсин-2; Т - трансдуцин
ФДЭ - фосфодиэстераза

Перекрытие рецептивных полей соседних нейронов в зрительной коре




Рецептивные поля
соседних нейронов
в зрительной коре




Минимально различимое
расстояние

Организация рецептивных полей




Исследование цветового зрения с помощью таблиц Рабкина

Испытуемый с нормальным цветовым зрением
видит 26, протаноп -6, а дейтераноп м-2




Поле зрения для объектов разного цвета. Пунктир – белый цвет




Движения глаз при рассматривании лица.


ЭОГ. Испытуемый несколько минут рассматривал фото слева




БИНОКУЛЯРНОЕ ЗРЕНИЕ




Слуховая система




Слуховой анализатор




Среднее и внутреннее ухо в разрезе




Разрез улиткового хода




Кортиев орган




Функция клеток органа Корти




Потенциал улитки




Микрофонный потенциал улитки и потенциал действия, зарегистрированный у овального окна в ответ на щелчок







Блок-схема слухового анализатора




Слуховое поле





Вестибулярный аппарат






Система равновесия




КУПУЛА (А) И МАКУЛА (Б)



Макулы органов преддверия (утрикулус и саккулус)




ФУНКЦИИ ВОЛОСКОВЫХ КЛЕТОК ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА



ПОЛУКРУЖНЫЕ КАНАЛЫ



В ПОКОЕ



УСКОРЕНИЕ

Афферентные и эфферентные связи вестибулярного аппарата

