

Департамент здравоохранения г.Москвы
Государственное образовательное бюджетное учреждение
Среднего профессионального образования
Медицинский колледж №4

Фоновые и предраковые заболевания

2014 год

Злокачественным заболеваниям как правило способствуют патологические процессы, на фоне которых они возникают.

Выделяют:

□ Фоновые

□ Предраковые заболевания(наружных половых органов, влагалища, шейки матки, эндометрия, яичников).

Предраковые заболевания наружных половых органов и вагалища

Клиника:

Длительное бессимптомное течение, возможно появление ночного зуда.

Диагноз ставится на основании клинических проявлений, кольпоскопии, пробы Шиллера, биопсии, гистологии.

Лечение: комплексное.

1.Лейкоплакия – дистрофическое заболевание, в результате которого возникает изменение слизистой оболочки, сопровождающееся ороговением слизистой.

Характеризуется появлением в области наружных половых органов сухих белых бляшек различной величины, представляющие собой участки повышенного ороговения с последующим склерозом и сморщиванием тканей. Помимо наружных половых органов, лейкоплакия может локализоваться во влагалище и на влагалищной части шейки матки.

Клиника:

Длительное бессимптомное
течение, возможно появление
ночного зуда.

Диагноз ставится на основании
клинических проявлений,
кольпоскопии, пробы Шиллера,
биопсии, гистологии.

Лечение: комплексное.



2. Крауроз – атрофия малых и больших половых губ, клитора; патологическое сморщивание кожи слизистой оболочки наружных половых органов.

Стадии:

- Стадия клинических проявлений
- Стадия прогрессирования
- Стадия склерозирования

Возникают затруднения при половом акте, мочеиспускании, дефекации.

Диагноз ставится на основании клинических проявлений, кольпоскопии, пробы Шиллера, биопсии, гистологии.

Лечение: комплексное.

*Фооновые и
предраковые
заболевания шейки
матки.*

Фоновые заболевания

Фоновые процессы –

патологические состояния, врождённые или приобретённые, на фоне которых возникает предрак или рак шейки матки. Возникновению способствуют травмы, во время родов, аборты, воспаления.

3.Лейкоплакия – пограничное состояние зрелого метапластического эпителия с ороговением.

1.Эктопия (псевдоэрозия) –

смещение границы цилиндрического эпителия канала шейки матки и плоского эпителия на влагалищную поверхность шейки матки.

Сопровождается воспалительными процессами.

2.Эктропион шейки матки –

участок эктопии, покрытый цилиндрическим эпителием,. При осмотре: яркая гиперемия, зернистая или бархатистая поверхность, легко травмирующаяся при касании.

Полип шейки матки



4. Полип шейки матки – возникает из-за чрезмерного роста слизистой оболочки шеечного канала.

При осмотре: слизистая бледно-розовая, может быть багровая, полип свисает на ножке во влагалище.

Лечение: оперативное.

5. Эритроплакия шейки матки – участок истончённого плоского эпителия с его дискератозом.

Предраковые заболевания шейки матки

Диагноз ставится на
основании
клинических
проявлений, данных
осмотра, биопсии,
кольпоскопии.

Лечение:
Консервативное,
оперативное
(ампутация шейки
матки, удаление
матки).

Предраковые заболевания шейки матки
или дисплазия – заболевания, для
которых характерна атипия клеток
слизистой шейки матки и цервикального
канала. Различают три степени тяжести
заболевания. При последней степени
тяжести дисплазия часто переходит в
рак.



Диагностика фоновых и предраковых заболеваний шейки матки

Цервикальная биопсия

Небольшие образцы тканей берут из шейки матки для исследований



Шейка матки рассматривается через гинекологическое зеркало в положении пациента лежа

Предраковые заболевания эндометрия

Возникновению способствуют такие заболевания, связанные с нарушением обменных процессов, как: артериальная гипертензия, ожирение, сахарный диабет.

Диагноз ставится на основании жалоб, объективного исследования, цитологического исследования, гистероскопии.

Лечение:

Консервативное (гормоны),
оперативное.

Профилактика: своевременное лечение заболеваний, диспансерное наблюдение.

К предраковым заболеваниям эндометрия относятся:

Атипичическая гиперплазия, аденоматозные полипы, полипы эндометрия.

Заболевания возникают из-за нарушений гормонального фона.

Сопровождаются маточными кровотечениями после задержки менструации, реже возникают циклические.

Предраковые заболевания яичников

Выделяют:

- Доброкачественные - кисты (фолликулярные, жёлтого тела). Возникают при неправильной имплантации эндометрия.
- Пограничные — кистомы (способны переродиться в рак).

Жалобы на: тупая ноющая боль (в животе, пояснице).

Осложнения:

- Перекрут ножки
- Разрыв капсулы
- Кровоизлияние в полость

Лечение: оперативное (удаление).

Спасибо за внимание!