ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ.





900igr.net

ИППП-инфекции,передающиеся половым путем.

Основные факты.

- Ежегодно происходит 449 миллионов новых случаев излечимых инфекций, передаваемых половым путем (сифилиса, гонореи, хламидиоза и трихомониаза).
- Некоторые инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), протекают без симптомов.
- Среди беременных женщин с нелеченным сифилисом на начальной стадии 21% беременностей заканчивается рождением мертвого плода, а 9% — смертью новорожденного.
- ИППП являются одной из важных причин бесплодия у мужчин и женщин.
- Лекарственная устойчивость, особенно в случае гонореи, является серьезной угрозой для глобальной борьбы с ИППП.
- ИППП могут в три и более раз повышать риск приобретения ВИЧ-инфекции.

Различают:

Бактериальные инфекции:

- ✔ Сифилис(Treponema pallidum)
- ✔ Гонорея (Neisseria gonorrhoeae)
- ✔ Хламидийные инфекции(Chlamydia trachomatis)
- ✔ Мягкий шанкр(Haemophilus ducreyi)
- ✔ Паховая гранулема(Klebsiella granulomatis)

Сифилис.

Гонорея.

Мягкий шанкр.



Распространенные вирусные инфекции:

- Вирус иммунодефицита человека (вызывает СПИД)
- Вирус простого герпеса типа 1 и 2 (вызывает герпес половых органов)
- Вирус папилломы человека (вызывает остроконечные кондиломы, а некоторые подтипы приводят к развитию рака шейки матки у женщин)
- Вирус гепатита В (вызывает гепатит, а хронические случаи могут приводить к развитию рака печени)
- Цитомегаловирус (вызывает воспаление целого ряда органов, включая

  мозг, глаза и кишечник).

Генетальный герпес.

Гепатит В.



Протозойные инфекции.

- ✔ Трихомониаз (основное место обитания трихомониаза в мужском организме — уретра, предстательная железа и семенные пузырьки, в женском — влагалище)

Грибковые инфекции.

- ✔ Кандидоз

Паразитарные заболевания.

- ✔ Фтириаз(паразитарное венерическое заболевание кожи вызываемое лобковой вошью.)
- ✔ Чесотка(вызываемое микроскопическим паразитом — чесоточным клещом или чесоточным зуднем)

Трихомониаз.



Кандидоз.



Основными синдромами наиболее распространенных ИППП являются:

- выделения из мочеиспускательного канала;
- язвы на половых органах;
- припухлости в паху (бубоны в паховой области);
- припухлость мошонки;
- вагинальные выделения;
- боль внизу живота;
- неонатальные глазные инфекции (конъюнктивиты новорожденных).

Некоторые ИППП протекают бессимптомно. Например, подавляющее большинство женщин и значительная доля мужчин с хламидийной и/или гонококковой инфекциями не испытывают никаких симптомов.

Пути передачи.

- Распространение от человека к человеку при сексуальных контактах(более 30 видов передаваемых половым путем бактерий, вирусов и паразитов).
- Некоторые инфекции, в частности ВИЧ и сифилис, могут также передаваться от матери ребенку во время беременности и родов.
- при переливании продуктов крови и пересадке тканей.

Группа венерических ИППП передается при незащищенном половом контакте (включая орально-генитальные формы). Поцелуи, орально-половой контакт и использование сексуальных игрушек, многократно повышает риск инфицирования при защищенном с помощью презерватива половом акте.

- заразиться вирусом папилломы человека возможно при тесном бытовом контакте
- влагалищная трихомонада может длительное время сохранять свои инфекционные свойства во влажной среде (мокрые полотенца, гладкие поверхности).
- Возбудитель чесотки или лобковая вошь может передаваться контактно-бытовым путем через предметы обихода.

Основные синдромы:

- выделения из мочеиспускательного канала;
- язвы на половых органах;
- припухлости в паху (бубоны в паховой области);
- припухлость мошонки;
- вагинальные выделения;
- боль внизу живота;
- неонатальные глазные инфекции (конъюнктивиты новорожденных).
- Некоторые ИППП протекают бессимптомно.

Осложнения ИППП:

- ✔ Бесплодие
- ✔ Невынашивание
- ✔ Преждевременные роды
- ✔ Пороки развития плода
- ✔ Высокая заболеваемость новорожденных



www.endostur.narod.ru
YABALDE

MedUniver.com
все по медицине...

www.hvatitbuhat.info

Отдаленные осложнения ИППП.

- ✔ Поражение жизненно-важных органов, приводящее к инвалидности.

  (миокардиты, артриты, поражение мозга и др.)

- ✔ Онкологические заболевания (рак шейки матки, рак эндометрия, рак яичников у женщин, рак предстательной железы и мочевого пузыря у мужчин)
- ✔ Рост числа заболевших СПИДом.

Всемирной организацией здравоохранения в «Глобальной стратегии профилактики инфекций, передаваемых половым путем, и борьбы с ними на 2006—2011 годы» выделяется понятие «безопасного полового поведения», включающего в себя:

- Правильное и систематическое использование мужских и женских презервативов
- Правильное применение местных бактерицидных средств
- Периодическое обследование с помощью синдромной или лабораторной диагностики
- В случае диагностирования инфекции (или подозрения на её наличие) специализированное лечение
- Половое воздержание
- Уведомление половых партнеров
- Вакцинопрофилактика против онкогенных вирусов гепатита В и папилломовируса человека.

ИППП, чаще всего, является следствием раскованного полового поведения и образа жизни!!!

DENIX
Spectrum
MALL
FASHION BUG
ROSS

ЗАДУМАЙТЕСЬ О СВОЕМ БУДУЩЕМ И БУДУЩЕМ СВОИХ ДЕТЕЙ!!!