

ОСТРАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ОСН

- ❑ Декомпенсация ХСН
- ❑ Обострение ИБС (ОКС)
 - ❑ ИМ или НС с распространенной ишемией миокарда
 - ❑ механические осложнения ОИМ
 - ❑ ИМ ПЖ
- ❑ Гипертонический криз
- ❑ Остро возникшая аритмия
- ❑ Тяжелая патология клапанов сердца
- ❑ Тяжелый острый миокардит
- ❑ Тампонада сердца
- ❑ Расслоение аорты
- ❑ Несердечные факторы
 - ❑ недостаточная приверженность лечению
 - ❑ перегрузка объемом
 - ❑ инфекции, особенно пневмония и септицемия
 - ❑ тяжелый инсульт
 - ❑ обширное оперативное вмешательство
 - ❑ почечная недостаточность
 - ❑ бронхиальная астма
 - ❑ передозировка лекарственных средств
 - ❑ злоупотребление алкоголем
 - ❑ Феохромоцитома
- ❑ Синдромы высокого СВ
 - ❑ Септицемия
 - ❑ тиреотоксический криз
 - ❑ Анемия
 - ❑ шунтирование крови

ФАКТОРЫ РИСКА ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ГК

- Постинфарктный кардиосклероз;
- Порок сердца;
- Выраженная гипертрофия миокарда;
- Аневризма аорты с недостаточностью аортального клапана.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЖ ОСТРОЙ СН ПРИ ИМ (КИЛЛИП И УОЛК)

- 1 степень - отсутствие ВХ + ДЗЛА на верхней границе нормы;
- 2 степень – ВХ до середины лопаток + ДЗЛА и ДНЛЖ;
- 3 степень - Отек легких;
- 4 степень - Кардиогенный шок;
- + Правожелудочковая СН

КАРДИОГЕННЫЙ ШОК

- Транзиторная гипотония при болевом синдроме;
- Аритмогенный;
- Истинный;
- Шок при разрыве

КАРДИОГЕННЫЙ ШОК - КЛИНИКА

- АД - <90/60 мм рт.ст. и поддерживается только вазопрессорами;
- Кожа: холодная, мраморный рисунок, пот;
- Психика: заторможенность;
- Моча: нет;
- КОБ: Ацидоз (метаболический или смешанный)

ОСТРАЯ СН

