

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРИКАЗ
от 1 ноября 2012 г. N 572н**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ
"АКУШЕРСТВО**

**И ГИНЕКОЛОГИЯ (ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
РЕПРОДУКТИВНЫХ**



**VI. Порядок оказания
медицинской помощи
женщинам с ВИЧ-
инфекцией в период
беременности, родов
и в послеродовый период**

Выполнила: к\о Аскерова Д.С.

Лабораторное обследование беременных женщин на наличие в крови антител к вирусу иммунодефицита человека (далее - ВИЧ) проводится:

при постановке на учет по беременности

в **28-30** недель

Женщин, которые во время беременности употребляли парентерально психоактивные вещества и (или) вступали в половые контакты с ВИЧ-инфицированным партнером, рекомендуется обследовать дополнительно на **36** неделе беременности



молекулярно-биологическое исследование беременных на ДНК или РНК ВИЧ проводится:

при получении сомнительных результатов тестирования на антитела к ВИЧ, полученных стандартными методами (иммуноферментный анализ (далее - ИФА) и иммунный блоттинг);

результатов теста на антитела к ВИЧ, полученных стандартными методами в случае, если беременная женщина относится к группе высокого риска по ВИЧ-инфекции (употребление наркотиков внутривенно, незащищенные половые контакты с ВИЧ-инфицированным

**Беременных женщин с положительным
результатом лабораторного обследования
на антитела к ВИЧ врач направляет в Центр
профилактики и борьбы со СПИД субъекта
Российской Федерации для:**


**дополнительного
обследования**

**постановки на
диспансерный учет**

назначения химиопрофилактики

В период диспансерного наблюдения за беременной женщиной с ВИЧ-инфекцией

~~Инвазивные
процедуры:
(амниоцентез
, биопсия
хориона)~~



необследованная
беременная

The flowchart is set against a background of a microscopic view of blood and a large HIV virus particle. It shows two parallel paths. The left path starts with 'unexamined pregnant woman', leads to 'reception department', and then to 'express test'. The right path starts with 'express test', leads to 'antiretroviral therapy', and finally to 'HIV infection diagnosis', which is crossed out with a red X.

экспресс-
тест


приемное
отделение

антиретровир-
усная терапия

экспресс-
тест

~~диагноз
ВИЧ-
инфекция~~

**При ведении родов через
естественные родовые пути
проводится обработка влагалища
0,25% водным раствором
хлоргексидина .**



при поступлении на роды

**при наличии кольпита - при
каждом последующем
влагалищном исследовании
при безводном промежутке более 4
часов обработку влагалища
хлоргексидином проводят каждые 2
часа**

При живом плоде в родах противопоказано:

- 1) родостимуляция
- 2) перинео(эпизио)томия
- 3) амниотомия
- 4) наложение акушерских щипцов
- 5) вакуум-экстракция плода



**повышают
риск
инфицирован**

Плановое кесарево сечение: если



концентрация ВИЧ в крови матери (вирусная нагрузка) перед родами (на сроке не ранее 32 недели беременности) более или равна 1 000 коп/мл

вирусная нагрузка матери перед родами неизвестна

антиретровирусная химиопрофилактика не проводилась во время беременности (или проводилась в режиме монотерапии или ее продолжительность была менее 4 недель) или невозможно применить антиретровирусные препараты в родах

После родов:

1) у новорожденного осуществляется забор крови для тестирования на антитела к ВИЧ.

2) антиретровирусная профилактика новорожденного

3) гигиеническая ванна с раствором хлоргексидина (50 мл 0,25% раствора хлоргексидина на 10 литров



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!



**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**