

Правило составления формулы зубов

Подготовил студент
4курса,
педиатрического факультета
Насута Иван Вячеславович

формула.

- Правило составления формулы зубов – это записанное в виде специальных обозначений краткое описание зубной системы человека
- При записи зубной формулы используют сокращенные названия типов зубов гетеродонтной зубной системы: I (лат. dentes incisivi) — резцы; C (лат. d. canini) — клыки; P (лат. d. premolares) — предкоренные, или малые коренные, или премоляры; M (лат. d. molares) — коренные, или большие коренные, или моляры. За сокращенным названием типа зубов следует указание количества пар зубов данной группы: в числителе — верхней и в знаменателе — нижней челюсти.


Вид формулы

Эта запись означает: две пары резцов (I), одна пара клыков (C), две пары малых коренных (P) и три пары больших коренных зубов (M).

$$I \frac{2}{2} C \frac{1}{1} P \frac{2}{2} M \frac{3}{3} = 32$$

В практической стоматологии такие обозначения применяются редко, и зубы челюстей взрослого человека просто нумеруются от резцов к большому коренным (от 1 до 8)

Все зубы разделяются на 4 сектора (против часовой стрелки)



Формула у детей



В клинике полная формула временного прикуса записывается римскими цифрами, которые соответствуют порядковому номеру зуба каждой половины челюсти.

V	IV	III	II	I		I	II	III	IV	V
V	IV	III	II	I		I	II	III	IV	V

Не стоит забывать, что у детей формула зубов с возрастом меняется

Возраст	Зубная формула
6—7 месяцев	$\frac{1}{1}$
8—9 месяцев	$\frac{1}{1}$
10 месяцев	$\frac{21}{11}$
12 месяцев	$\frac{21}{21}$
12—15 месяцев	$\frac{321}{321}$
18—20 месяцев	$\frac{4321}{4321}$
20—30 месяцев	$\frac{54321}{54321}$

A close-up photograph of a person's mouth, showing a wide smile with bright white teeth and pink lips. The background is a soft, out-of-focus skin tone. At the bottom of the image, there are several white daisies with yellow centers, partially overlapping the mouth.

Спасибо за внимание.