

Тесты: РКИ.

1. Определите дизайн статьи по отрывку:

Все женщины (60 человек) были разделены на 2 подгруппы: 28 женщин получали Гинофлор Э таблетки вагинальные 1 раз в день 6 дней и 32 женщины не получали восстановительной терапии.

Рандомизация проходила на основании рандомизационного списка, разработанного сотрудниками медицинского отдела ООО «Инвар».

А. РКИ.

Б. Нерандомизированное контролируемое исследование.

В. Случай – контроль.

Г. Когортное исследование.

Д. Поперечное исследование.

2. Определите дизайн статьи по отрывку:

**Это исследование включило асимптоматические
одноплодные беременности от 20+0 до 31+6 недель
гестации с длиной шейки матки менее, чем 25 мм, и
преждевременными родами в анамнезе или
хирургическими манипуляциями на шейке матки, или
пороками развития матки, или применением
диэтилстилбестрола в пренатальном периоде.
Рандомизация предписала им получать (или не
получать) внутримышечно 500 мг 17-
альфагидроксипрогестерона капроата еженедельно
до 36 недель. Первичным исходом было время от
рандомизации до родов**

- А. РКИ.
- Б. Нерандомизированное контролируемое исследование.
- В. Случай – контроль.
- Г. Когортное исследование.
- Д. Поперечное исследование.

3. Определите дизайн статьи по отрывку:

Обследованы 86 пациентов в возрасте от 10 месяцев до 6 лет (средний возраст $41,4 \pm 7,2$ месяца) и массой тела от 8 до 25 кг (средняя масса тела $16,2 \pm 3,1$ кг). В зависимости от методики обеспечения проходимости дыхательных путей пациентов разделили на две группы: 1-я группа (41 ребёнок) - общая анестезия с применением пропофола, мышечного релаксанта суксаметония, интубация трахеи с последующим проведением ФБС; 2-я группа (45 детей) - общая анестезия с применением пропофола и мышечного релаксанта суксаметония с последующей установкой ларингеальной маски. Сделано заключение, что обеспечение проходимости дыхательных путей при бронхоскопии с установкой ларингеальной маски не уступает по своей эффективности интубации трахеи.

А. РКИ.

Б. Нерандомизированное контролируемое исследование.

В. Случай – контроль.

Г. Когортное исследование.

Д. Поперечное исследование.

4. Определите дизайн статьи по отрывку:

В разработку включено 697 новорожденных. Группа лечения (n=515) - ограничительная тактика АБТ, группа сравнения (n=182) - профилактическое назначение антибиотиков. В первую группу входили новорожденные с респираторным дистресс-синдромом (РДСН) и предполагаемой врожденной пневмонией с антибиотикорезистентностью микрофлоры, во вторую группу – только с РДСН.

- А. РКИ.
- Б. Нерандомизированное контролируемое исследование.
- В. Случай – контроль.
- Г. Когортное исследование.
- Д. Поперечное исследование.