

# Астана Медицина Университеті Наркология және Психиатрия кафедрасы

## ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Тақырыбы: Тәуелділік ауруларды психотропты заттармен емдеу, оның ерекшеліктері.



Орындаған:Шарапатова А.А

Топ: 516-ЖМ

Тексерген: Койшыбеков Т.Т.

Астана 2014 ж

# Жоспар:

Кіріспе

Негізгі бөлім

Психотропты препараттардың жіктелуі

Психотропты препараттардың әсер етуі

Қорытынды

# Кіріспе

- Психотропты препараттарды тағайындаудың негізгі мақсаты, алкоголизмы бар науқастардағы эмоциялық еркінің бұзылысын қалпына келтіру. Патологиялық қызығушылығын үзу.



**Нейролептиктер**

**Транквилизаторлар**

**Тимостабилизаторлар**

**Антидепрессанттар**

**Психостимуляторлар**

**Ноотроптар**

**Психодизлептиктер**



**Депрессанттар :**

- Нейролептиктер
- Транквилизаторлар
- Седативтілер

**Модилирующие :**

- Транквилизаторлар

**Белсендендіретін :**

- Психостимуляторлар
- Ноотропталар



# Нейролептиктер :

Қабылдаудың бұзылысын( галлюцинация), ойлаудың ( сандырақ), эмоциональді және еріктің бұзылыстарын ( қорқыныш,қозу, агрессия) жоюға қабілетті препараттар.



**Өте күшті  
антипсихикалық әсері  
бар:**



**Бутиферон (галоперидол)  
Пиперазин (трифлуоперазин)  
Дифенилбутилпиперидин  
(пимозид, флуспирилен)  
туындылары.**

**Күшті седативті және аз  
антипсихикалық әсері:**



**Фенотиазиннің алифатикалық  
туындысының (аминазин,  
левомепромазин),  
Раувольфиидің алкоиды  
(резерпин)**

**Аралас  
комбинирленген:**



**Фенотиазиннің пипериндік  
туындысы (тиоридазин),  
Тиоксантеннің алифатикалық  
туындылары ( хлорпротиксен)  
Дибензодиазепин (клозапин)  
Сульфамойлбензамид  
(сульпирид)**


|                                          |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Нейролептикалық<br/>эффект</b></p> | <p>Әлсіздік, апатия, психикалық тежелу, ұйқышылдық, сыртқы ортаға қызығушылығының төмендеуі, қозғалыстың тежелуі, психомоторлы қозуды тежелу.</p> |
| <p><b>Антипсихикалық<br/>эффект</b></p>  | <p>Тұлғалық және іс әсеректінің бұзылысын, галлюцинация, сандырақтарды жою.</p>                                                                   |
| <p><b>Вегетатропты эффект</b></p>        | <p>Құсыққа қарсы, икотаға қарсы әсері бар және гипотермия, АД коллапсқа дейін төмендетеді. Пиолороспазм ды жою.</p>                               |
| <p><b>Миорелаксикалық<br/>эффект</b></p> | <p>Бұлшықет тонусының төмендеуі мен моторлы белсенділікті шақырады.</p>                                                                           |
| <p><b>Аналгетикалық<br/>эффект</b></p>   | <p>Наркозға арналған.</p>                                                                                                                         |






## Көрсеткіштер:

- - Алкогольды делирия кезінде
- - Психопатикалық қозу
- - Галлюцинация, сандырақ.
- Абстинентті синдром
- Реактивті жағдайда, қорқыныш, үрей, мазасыздық.



## Кері әсерлері:

- Экстрапирамидалық бұзылыстар
  - Жүрек қан тамырларының бұзылысы
  - Гепатотоксикалық әсері бар
  - Аллергиялық реакция
  - Офтальмологиялық бұзылыстар
  - Гемопоздың бұзылыстары
  - Қатерлі нейролептикалық синдром
- 

# Транквилизаторлар:

- Невротикалық бұзылыс кезіндегі эмоциялық тұрақсыздықты, үрей, қорқынышты жою мақсатында қоладанады.



**Өте күшті әсері бар**



**Бензодиазепин  
туындылары:**

- Феназепам
- Сибазон
- Хлозепид
- Лоразепам
- Нозепам
- Альпразолам



**Басқалар:**  
Мепротан  
Амизил

**Күндізгі  
транквилизаторлар**



**Бензодиазепин  
туындылары:**

- Гидазепам
- Тофизопам
- Мезапам



**Басқалар:**  
Мебикар  
Фенибутон  
Триоксазан

# Фармакологиялық әсері:

**Анксиолитикалық**

**Психоз кезінде  
эффектінің болмауы**

**Белсенділік** **Психоседативті**

**Ұйқтататын**

**Дірілге  
қарсы**

**Амнестикал  
ық**

**миорелак  
сикалық**





# Қолданатын көрсеткіштер:

| Синдромдар                    | Препараттар                                      | Эффект                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Үрей, тітркенгіш, бұлшықеттің | Феназепам, сибазон, элениум, мепробамат          | Седативті                      |
| Фобиялық жағдай               | Феназепам, сибазон, элениум, мепробамат          | Седативті                      |
| Депрессия                     | Инсидон, грандаксин                              | Антидепрессивті                |
| Астения                       | Тазепам, триоксазин, рудотель, грандаксин        | Седативті, жеңіл стимульдайтын |
| Истерия, обссесия             | Феназепам, сибазон, грандаксин                   | Антиневротикалық               |
| Психовегетативті бұзылыстар   | Феназепам, сибазон, грандаксин, инсидон, атаракс | Вегетостабилиздейтін           |

# Жанама әсерлері:

1. Психикалық асқынулар: еңбекке қабілетінің және эмоцияның төмендеуі, ұйқышылдық, әлсіздік.
2. Физикалық асқынулар: бұлшықет әлсіздігі, қимылдың төмендеуі.
3. Тәуелділік: үйрену, дозаның көбеюі, абстинентті синдром.



# Седативті препараттар:

Жеңіл спецификалық  
емес тыныштандыратын  
және ұйқыны қалпына  
келтіретін әсері бар  
препараттар.





**Өсімдік  
препараттары:**  
Валериандар  
Пустырник  
Пиона

**Барбитураттар:**  
Фенобарбитал  
Барбитал натрий

**Бромидтер:**  
Натрия  
бромид  
Калия бромид

**ГАМК  
туындылары:**  
Натрия  
оксибутират  
Фенибут

**Комбинирленген :**  
Корвалол  
Микстура Кватера  
Валидол

## **Көрсеткіштер :**

- Невроздың алғашқы кезеңдерінде
- Ұйқының бұзылысы
- Жоғары дәрежедегі тітіркендіргіш
- Вегетативті невроз
- Психосоматикалық патология



## **Жанама әсерлері:**

- Аллергиялық көрініс
- Конъюктивит
- Есте сақтаудың төмендеуі
- Терінің қышуы





# Барбитураттардан бас тартудың негізгі себептері:

Тәуелділіктің тез дамуы мен  
толеранттылықтың  
жоғарылауы



Препараттың  
көбеюіндегі қауіпі  
жоғары



Жауап қайтару  
реакциясы  
ұйқысыздық



# АНТИДЕПРЕССАНТ ТАР.

Асқынған төмендеген көңіл күйді және психикалық іс әрекеттің тежелуін алдын алады.

**Астеникалық компоненті бар депрессия кезінде:**

- Нортриптилин
- Азафен
- Имизин
- Анафранил

**Үрейлі компоненті бар депрессия кезінде:**

- Амитриптилин
- Фторацизин
- Опипрамол
- Пиразидол
- Имизин

## **Көрсеткіштер:**

- Депрессия
- Астения ,  
ұйқының  
бұзылысы, невроз,
- Созылмалы  
ауырсыну  
синдромы
- Алкогольге  
қызығушылық

## **Жанама әсері:**

- Жүрек қан тамыр
- Психикалық қозу
- Токсико -  
аллергиялық  
реакция
- Холинолитикалық  
эффект

# Психостимуляторлар:

- Ойлаудың белсенділігі мен моторикасын жоғарылатып, шаршау сезімін жояды.

## **Фенилэтиламин туындысы:**

Фенамин

Дексердин

Центердин

Пемолин

Эфедрин

## **Адамантан туындысы:**

Бромантан

## **Орталық $\alpha_1$ -адреномиметиктар:**

Модафенил

## **Көрсеткіш :**

- Ақыл ойдың жұмысын белсендіру
- Физикалық күшті белсендіру
- Нервно-психикалық ауруларда: астения, адинамия, депрессия.
- Психоседативті эффектін төмендету: ұйқышылдық, еңбекке қабілетін төмендуі, депрессия элементтері.

## **Жанама әсері:**

Қозу

Мазасыздану

Ұйқының бұзылысы

Жүрек айну


Тахикардия

Аритмия

АД жоғарылауы

# Ноотропты препараттар

- Психикалық тонусты көтеріп, ойлау мен есте сақтау қабілетін жоғарылатады.





| Синдромдар                                                   | Препарат                                                 | эффeкт                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Шаршау,<br>тітіркендіргіш                                    | Фенибут, аминалон,<br>энцефабол                          | Нооторпты , жеңіл седативті     |
| Астения,<br>психоэмоционалды<br>бұзылыс                      | Пантогам, пирацетам,<br>деанол,                          | Белсендендіретін                |
| Есте сақтаудың,<br>зейіннің, еңбекке<br>қабілетінің бұзылысы | Пирацетам, этирацетам,<br>аминалон, лизин<br>вазопрессин | Жеңіл стимулдейтін              |
| Абстинентті синдром                                          | Фенибут, пантогам,<br>энцефабол, ацефен.                 | Нооторпты , жеңіл седативті     |
| Діріл синдромы                                               | Аминалон, энцефабол,<br>пантогам, деанол                 | Аз мөлшерде<br>белсендендіретін |

# Қорытында сұрақтар:

- 1 психотропты препараттарды тағайындаудың негізгі мақсаты?
- 2 психотропты препараттарды атап өтініз?
- 3 орталық жүйке жүйесін белсендендіретін препарат топтарын атаңыз?
- 4 алкогольды делирия кезінде жақсы әсер көрсететін препарат тобы?

# Жауабы :

- 1. Психотропты препараттарды тағайындаудың негізгі мақсаты, алкоголизмы бар науқастардағы эмоциялық еркіннің бұзылысын қалпына келтіру. Патологиялық қызығушылығын үзу.
- 2. Нейролептиктер, транквилизаторлар, ноотропты, тимостабилизаторлар, антидепрессанттар, психостимуляторлар.
- 3. Белсендендіретін психостимуляторлар, ноотроптала
- 4. Нейролептиктер