

Волгоградский  
государственный  
медицинский  
университет



Кафедра  
патологической  
анатомии

# Воспаление. Этиология. Медиаторы. Виды. Острое воспаление.

# План лекции

- 1. Общая характеристика воспаления. Этиология, местные и общие признаки воспаления.
- 2. Основные компоненты воспалительного процесса: альтация, нарушения микроциркуляции и пролиферация.
- 3. Альтерация в очаге воспаления, ее виды и значение. Медиаторы воспаления, их происхождение и участие в развитии воспаления.
- 4. Изменения регионарного кровообращения и микроциркуляции в очаге воспаления.
- 5. Экссудация, ее механизмы и значение. Виды экссудатов.
- 6. Эмиграция лейкоцитов и явления фагоцитоза при воспалении.
- 7. Нарушения обмена веществ в очаге воспаления.

# воспаление:

типовой  
(**неспецифический**)  
патологический  
процесс,  
развивающийся в  
**васкуляризованных**  
органах и тканях в ответ  
на любое местное  
повреждение и  
проявляющийся в виде  
поэтапных изменений  
микроциркуляторного  
русла, крови и стромы  
органа или ткани,  
направленных на  
локализацию,  
разведение, изоляцию и  
устранение агента,  
вызвавшего  
повреждение, и на  
восстановление  
поврежденной ткани.



- Г.З. Мовэт (1975)
- **воспаление** — это реакция живой ткани на повреждение, заключающаяся в определенных изменениях терминального сосудистого ложа, крови и соединительной ткани, направленных на уничтожение агента, вызывающего повреждение, и на восстановление поврежденной ткани.

- Биологический смысл воспаления заключается в отграничении и ликвидации очага повреждения и вызвавших его патогенных факторов, а также в репарации поврежденных тканей.

# **ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ОСТРОГО ВОСПАЛЕНИЯ**

## **Основные клинические признаки острого воспаления :**

- rubor (покраснение),
- color (увеличение температуры),
- tumor (припухлость),
- dolor (боль),
- functio laesa (нарушение функции).

## **Системные проявления:**

- Лихорадка,
- Лейкоцитоз,
- Белки острой фазы воспаления: С-реактивный белок,  $\alpha$ 1-антитрипсин, фибриноген, гаптоглобин и церулоплазмин.
- Ускорение СОЭ.

# Этиологические факторы воспаления

```
graph TD; A[Этиологические факторы воспаления] --> B[Внешние (экзогенные) факторы:]; A --> C[Внутренние (эндогенные) факторы:];
```

## Внешние (экзогенные) факторы:

1. микроорганизмы (грибы, бактерии, вирусы),
2. животные организмы (простейшие, гельминты, насекомые),
3. токсические вещества химической или какой-либо другой природы,
4. механические раздражители (холод, жар),
5. лекарственные вещества,
6. ионизирующее излучение.

## Внутренние (эндогенные) факторы:

1. продукты азотистого обмена,
2. продукты распада опухолей,
3. эффекторные иммунные клетки,
4. иммунные комплексы, преципитирующие в ткани.


- В воспаление вовлекаются гормоны, иммуноглобулины, нейропептиды, активирующие функции лейкоцитов и моноцитов через специфические рецепторы, т.е. в процесс включается не только микроциркуляция, но и иммунная, эндокринная и нервная системы. Поэтому **воспаление** следует охарактеризовать как *местное проявление общей реакции организма. Вместе с тем оно стимулирует включение в процесс других систем организма, способствуя взаимодействию местных и общих реакций при воспалении.*
- Другим проявлением участия всего организма в воспалении служит **синдром системного воспалительного ответа** — *SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome)*, развитие которого может закончиться появлением полиорганной недостаточности.
- Эта реакция проявляется **повышением температуры тела выше 38°C, частотой сердечных сокращений более 90 уд./мин, частотой дыхания более 20 в мин или рСО<sub>2</sub> менее 32 мм рт. ст., лейкоцитозом периферической крови более 12000 в мкл или лейкопенией менее 4000 мкл, возможно также появление более 10% незрелых форм лейкоцитов.** Для диагноза SIRS необходимо наличие не менее двух из этих признаков.



При этом возникает генерализованное **поражение микроциркуляторного русла** в виде неконтролируемого расширения микрососудов, что приводит к дистрофическим и некробиотическим изменениям различных органов, нарушению их функции и развитию синдрома полиорганной недостаточности, не зависящего непосредственно от причины воспаления.

**Полиорганная недостаточность** связана не только с поражением микроциркуляторного русла, но и с повреждением барьерной функции кишечника, а также с нарушением текучести клеточных мембран, особенно печени и почек, что отрицательно сказывается на их функциях. Клиническими проявлениями полиорганной недостаточности являются анемия, изменение формулы крови и развитие ДВС-синдрома, что приводит к геморрагиям, тромбозам, гемолизу и прогрессированию полиорганной недостаточности. Другими проявлениями этого синдрома могут быть респираторный дистресс-синдром взрослых, поражение желудочно-кишечного тракта и нервной системы, метаболические нарушения, в основном нарушения кислотно-щелочного равновесия и инсулинорезистентная гипергликемия. Все это, разумеется, выводит воспаление за рамки только местной реакции организма.

# Общая схема повреждения и воспаления



Этиологические факторы воспаления: биологические, химические, физические.  
Течение воспаления: острое, (подострое), хроническое.

- По течению воспаление делят на: **острое** и **хроническое**.
- Воспаление может быть с установленной (вирусной, бактериальной, грибковой и т.д.) и неустановленной этиологией.
- Воспаление бактериальной этиологии подразделяют на **банальное** и **специфическое**, которое характерно для туберкулеза, сифилиса, лепры, сапа, ринослеромы.

# фазы воспаления

- Выделяют три последовательные **фазы** воспалительной реакции: **альтерация, экссудация, пролиферация**.
- По преобладанию тканевой реакции в морфологической картине воспаление может быть **экссудативным** или **продуктивным**, разновидностью последнего является гранулематозное воспаление.

В зависимости от характера экссудата выделяют следующие виды экссудативного воспаления:

- серозное,
- фибринозное,
- гнойное,
- геморрагическое,
- смешанное

**катаральное**, локализирующее только на слизистых оболочках, гнилостное.

## Фазы воспаления

- Первая фаза - **альтерация** (повреждение) тканей и клеток (инициальные процессы) с выделением медиаторов - морфобиохимическая.
- Вторая фаза - **экссудация** - реакция микроциркуляторного русла с нарушением реологических свойств крови. проявлениями повышенной сосудистой проницаемости с виде плазматической экссудации и эмиграции клеток, фагоцитоза, образования экссудата.
- Третья фаза - **пролиферация** клеток с восстановлением ткани или образованием рубца.



# Альтерация

Основные процессы: альтерация, экссудация, пролиферация.

Проявления альтерации: дистрофия паренхимы и стромы вплоть до некроза, образование биологически активных веществ.



# Альтерация

- А.И. Струков предлагал различать *биохимическую и морфологическую фазы* альтерации. Воспаление начинается с биохимической фазы, т.к. в самом начале процесса имеют значение характер и выраженность именно биохимических изменений в зоне поврежденной ткани, которые заключаются в образовании *хемоаттрактантов*.




# Альтерация


- Гистамин вызывает острое расширение сосудов микроциркуляторного русла, что повышает сосудистую проницаемость и способствует отеку ткани, усиливает слизеобразование и сокращение гладкой мускулатуры.
- Серотонин также повышает сосудистую проницаемость и сокращение гладкомышечных клеток.

# Гиперемия при воспалении

Воспаление сопровождается последовательным развитием артериальной, венозной гиперемии, стаза и сладжа и может завершаться тромбозом



# Изменения гидродинамических сил при формировании отека




А – нормальный  
сосуд,



В – при воспалении



# Повреждение эндотелия



А – нормальный капилляр  
В – при воспалении  
С – стадия венозной гиперемии





3.1. Пиноцитоз в эндотелии сосуда при воспалении.

При электронной микроскопии видны мелкие пиноцитозные пузырьки, скапливающиеся на стороне эндотелиальной клетки, обращенной к просвету сосуда (препарат С.М. Секамовой).

# Медиаторы воспаления

```
graph TD; A[Медиаторы воспаления] --> B[Плазменные (циркулирующие) медиаторы:]; A --> C[Клеточные (локальные) медиаторы:];
```

## Плазменные (циркулирующие) медиаторы:

- 1) Калликреин-кининовая система:
  - Калликреин,
  - Кинины (брадикинин);
- 2) Система комплемента (C5a, C3a, C3b, комплекс C5a - C9a, C5a des Arg);
- 3) Свертывающая система крови (фактор Хагемана),
- 4) Фибринолитическая система крови.

## Клеточные (локальные) медиаторы:

- 1) Вазоактивные амины:
  - Гистамин,
  - Серотонин,
- 2) Метаболиты арахидоновой кислоты:
  - Простагландины,
  - Лейкотриены,
- 3) ФАТ (Фактор активации тромбоцитов),
- 4) Цитокины: ИЛ-1, ФНО ( $\alpha$ ,  $\beta$ ), ИЛ-8,  $\gamma$ -интерферон;
- 5) Содержимое лизосом.

# Клеточные медиаторы воспаления:

## вазоактивные амины

### Гистамин:

- Находится в гранулах тучных клеток, выделяется из них в ответ на физическое повреждение, иммунные реакции;
- Может выделяться тучными клетками, базофилами крови, тромбоцитами.
- Является главным м. (через  $H_1$ -рецепторы) немедленной фазы повышения сосудистой проницаемости, связанной с сокращением эндотелия венул и расширением промежутков между эндотелиоцитами.

### Серотонин:



- Сходен по действию с гистамином
- Содержится в тромбоцитах, энтерохромаффинных и тучных клетках.
- Выброс с. и гистамина из тромбоцитов – в процессе агрегации тромбоцитов после контакта с коллагеном, тромбином, АДФ и комплексами антиген-антитело.
- Агрегация и выброс с. стимулируется ФАТ, который выделяется из тучных клеток в процессе IgE-обусловленных реакций.
- Повышает проницаемость сосудов при иммунных реакциях.




## **Вторая фаза воспаления - экссудация**

- Повреждающее действие медиаторов на эндотелий капилляров и венул
  - ↓
  - Повышение сосудистой проницаемости
    - ↓
    - Выход плазмы крови (альбумины, глобулины, фибриноген) + эмиграция клеток
      - ↓
      - Образование экссудата
        - +
        - фагоцитоз


# Краевая адгезия нейтрофильных лейкоцитов






3.2. Эмиграция полиморфно-ядерных лейкоцитов через стенку сосуда при воспалении. При электронно-микроскопическом исследовании видно, как лейкоцит мигрирует сквозь сосудистую стенку в области межэндотелиальных контактов (1).

## MARGINATION









# Изменения крови при воспалении



ПМЯ







### CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS

- Acute inflammation
- Bacterial and foreign body phagocytosis

### PMN INFLAMMATORY MEDIATORS

- Reactive oxygen metabolites
- Lysosomal granule contents

#### -Primary granules

- Phospholipase A<sub>2</sub>
- Myeloperoxidase
- Cationic proteins
- Acid hydrolases
- Elastase
- Cathepsins

#### -Secondary granules

- Phospholipase A<sub>2</sub>
- Lysozyme
- Alkaline phosphatase
- Collagenase
- Lactoferrin
- Vitamin B<sub>12</sub> binding proteins


#### -Tertiary granules (C particles)

- Gelatinase
- Cathepsins

# Виды воспаления


в зависимости от преобладания одного из морфологических признаков воспаления:

- экссудативное,
- продуктивное.




# Экксудация при воспалении

- Проявления экссудации: изменение реологических свойств крови, воспалительная гиперемия, повышение проницаемости стенок микрососудов, эмиграция клеток крови, выход жидкости и белков плазмы.





## mediated vascular leakage



## Cellular mediators of acute inflammation

### Stored

Histamine

### Active synthesis

Prostaglandins

Leukotrienes

Platelet-activating factor

Cytokines

Nitric oxide

## Plasma-derived mediators of acute inflammation

Kinin system

Bradykinin

Clotting pathway

Activated Hageman factor

Fibrinolytic system

Plasmin



Complement pathway

C3a, C3b and C5a

- *Включение в воспалительный процесс сосудистого компонента сопровождается повышением локальной концентрации хемоаттрактантов — различных белков, полисахаридов, продуктов метаболизма жирных кислот и др.*




# Фагоцитоз



# Значение воспаления

Значение воспаления: компенсаторная и приспособительная реакция, направленная на ликвидацию причинного фактора, последствий его воздействия и восстановления поврежденных структур, уничтожение клеток с низкой резистентностью.





## Сосудистые изменения

Замедление тока крови, усиление сосудистой проницаемости



## Экссудация

Жидкость



Белки  
Фибриноген → фибрин

Нейтрофилы

Виды  
экссудата



# Серозный экссудат и транссудат







Катаральный колит.

**VASODILATION**

$H_2O$

**FIBRINOGEN**

**ALBUMIN**


**RBC**


**PMN**

**ENDOTHELIAL  
CONTRACTION**

$H_2O$

**EXUDATION**





При остром воспалении в крови увеличивается количество нейтрофильных лейкоцитов.



# Фибринозное воспаление

## подразделяют на

- дифтеритическое, характеризующееся наличием глубокого некроза и плотно спаянных фибринозных плёнок в органах, покрытых многослойным эпителием, например в ротоглотке при дифтерии,
- крупозное (в органах с выстилкой из однослойного эпителия при неглубоком некрозе ткани).




# Экссудативное воспаление



# Экссудативное воспаление




Фибринозное  
воспаление






# Острое фибринозное воспаление. Крупозная пневмония.

Окраска гематоксилином-эозином. (а) X 50. (б) X 200.



■ На микрофотограмме на малом (а) и большом (б) увеличениях светового микроскопа показано фибринозное крупозное воспаление в легких при пневмонии, которое характеризуется наличием в альвеолах **экссудата (Э)** богатого **фибрином (Ф)** с умеренным количеством полиморфно-нуклеарных **нейтрофильных лейкоцитов (НЛ)**. Отмечается резкое расширение сосудов микроциркуляторного русла – **воспалительная гиперемия (ВГ)** с **диapedезом (Д)** лейкоцитов.



Фибринозное  
воспаление.

**Вазодилатация. Экссудат с  
большим количеством  
фибрина и  
нейтрофильных  
лейкоцитов.**



# Гнойное воспаление

- характеризуется образованием гнойного экссудата (гноя), который образован жидкой частью, содержащей протеолитические ферменты, большим количеством нейтрофильных лейкоцитов, некротизированными клетками.

# формы гнойного воспаления:

- флегмонозное (флегмона),
- абсцесс
- эмпиема.




Абсцессы  
легкого при  
острой  
бронхо-  
пневмонии




**Стрелками показано образование абсцессов в верхней доле легкого. Колликвационный некроз в абсцессе хорошо различим, поскольку часть гноя дренируется через бронх. Такие абсцессы определяются при рентгенографии грудной клетки по уровню жидкости.**






**Вскрывшийся острый абсцесс легкого.**






**Абсцесс головного мозга.**

# Гнойное воспаление










# Гнойное воспаление







**Флегмонозное воспаление ожоговой раны.**

# Острое гнойное воспаление. Острый флегмонозный аппендицит.

Окраска гематоксилином-эозином. (а) X 50. (б) X 200.



■ На микрофотограмме показано флегмонозное воспаление в аппендиксе. В **слизистой оболочке (СО)** отмечаются признаки **некроза (Н)**, с деструкцией покровного эпителия и **крипт (К)**. Гнойный экссудат богатый полиморфно-нуклеарными **нейтрофильными лейкоцитами (НЛ)** диффузно распространяется из слизистой в **мышечную оболочку (МО)** червеобразного отростка.





# Острая бактериальная бронхопневмония. Окраска по Граму. X 1000.


- На изображенной микрофотограмме среза легкого при острой бронхопневмонии, окрашенного по Граму. В просветах альвеол имеется гнойный экссудат, в котором среди множества полиморфно-нуклеарных **нейтрофильных лейкоцитов (НЛ)** обнаруживаются небольшие скопления грам-позитивных **кокков (К)**. Отмечается разрушение стенок в части альвеол, что может привести к образованию абсцесса легкого.



# Острое гнойное воспаление. Острый абсцесс легкого.


Окраска гематоксилином-эозином. X 100.

- На микрофотограмме изображено строение абсцесса легкого при острой бронхопневмонии. Полость абсцесса заполнена **гнойным экссудатом (ГЭ)** и отграничена от сохранной ткани лёгкого **пиогенной мембраной (ПМ)**, внутренний слой которой представлен **грануляционной тканью (ГТ)** с многочисленными кровеносными сосудами, обильно инфильтрированной полиморфно-нуклеарными нейтрофильными лейкоцитами.







## Острое гнойное воспаление.



**Гнойный экссудат. Бактериальный гнойный менингит, вязкий кремового цвета экссудат имеется в субарахноидальном пространстве.**





# Экссудативное воспаление





# Клетки в очаге воспаления

Проявление пролиферации: увеличение количества клеток крови в зоне воспаления местного и гематогенного происхождения.





**Гной в полости  
сердечной сорочки.**





**Эмпиема плевры (мумифицированный макропрепарат).**

## **Третья фаза - пролиферация клеток с восстановлением ткани или образованием рубца**

- В итоге в очаге воспаления остается одна клетка - фибробласт.
- Фибробласты осуществляют фибрилlogenез и далее превращаются в фиброциты,
- воспалительный процесс заканчивается образованием зрелой волокнистой соединительной ткани, количество которой может быть различным в зависимости от глубины повреждения.

# РЕГУЛЯЦИЯ ВОСПАЛЕНИЯ

- осуществляется с помощью гормональных, нервных и иммунных факторов.
- **Провоспалительные гормоны** - усиливают воспалительную реакцию – минералокортикоиды, соматотропный гормон гипофиза, гипофизарный тиреостимулин, альдостерон.
- **Противовоспалительные гормоны** - уменьшают воспалительную реакцию - глюкокортикоиды и адренокортикотропный гормон (АКТГ) гипофиза. Эти гормоны блокируют сосудистый и клеточный феномен воспаления, ингибируют подвижность лейкоцитов, усиливают лимфоцитоллиз.
- Холинергические вещества, стимулируя выброс медиаторов воспаления, действуют подобно провоспалительным гормонам,
- а адренергические, угнетая медиаторную активность, ведут себя подобно противовоспалительным гормонам.
- На выраженность воспалительной реакции, темпы ее развития и характер влияет состояние иммунитета.
- Особенно бурно воспаление протекает в условиях антигенной стимуляции (сенсibilизации). В таких случаях говорят об **иммунном, или аллергическом, воспалении**.



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**