

ВСЕ
о ИППП

«Здоровья когда нет,-
мудрость молчит,
искусство не рождает,
сила спит,
богатство беспомощно,
разум бессилён».

СЕНЕКА

Инфекции передаваемые половым путем

- ❑ Сифилис
- ❑ Гонорея (триппер)
- ❑ Урогенитальный хламидиоз
- ❑ Трихомоноз
- ❑ Ано-генитальный герпес,
- ❑ Генитальный кандидоз,
- ❑ Гепатиты В, С,
- ❑ Ано-генитальные остроконечные кондиломы
- ❑ и другие (всего более 20 заболеваний).

Многие из возбудителей ИППП поражают детородные органы, вызывая бесплодие, импотенцию, возникновение внематочной беременности, выкидыши. Сифилис, если его не лечить, приводит к тяжелым изменениям внутренних органов, центральной нервной системы, передается потомству. Некоторые ИППП могут стать причиной злокачественных опухолей.

Признаки при ИППП

У женщин и мужчин:

- язвочки, пузырьки, узелки на коже и слизистых оболочках половых органов, в области прямой кишки, на слизистых полости рта;
- жжение и боль при мочеиспускании или испражнении;
- выделения из прямой кишки;
- зуд, отечность половых органов;
- озноб, ломота в теле, высыпания на коже.

У женщин:

- необычные выделения из влагалища с неприятным запахом;
- боли в низу живота;
- кровянистые выделения из влагалища в период между менструациями;
- боли в глубине влагалища во время полового акта.

У мужчин:

- выделения из мочеиспускательного канала.



Ulcus induratum.



Ulcus induratum.



Сифилис & ivoko



Профилактика ИППП

- ✓ Воздержание от секса до брака
- ✓ Исключение случайных половых контактов.
- ✓ Соблюдение верности любимому человеку.
- ✓ Использование презерватива.