


**КАК ОСВАИВАЛИ
СУШУ ПЕРВЫЕ
ПОЗВОНОЧНЫЕ?**


ПРЕДКАМИ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ БЫЛИ КИСТЕПЁРЫЕ РЫБЫ



- Свое название кистеперые рыбы получили за строение плавников, имевших мясистое основание.



ЛАТИМЕРИЯ- «ЖИВОЕ ИСКОПАЕМОЕ»




**Около 350 млн. лет назад
появились земноводные**




Ихтиостега




□ У ихтиостеги были конечности с пальцами, позволявшие передвигаться по земле. Ихтиостеги имели хвостовой плавник, жабры. Тело их было покрыто мелкими чешуйками.



СТЕГОЦЕФАЛ - ВЫМЕРШЕЕ ХИЩНОЕ ЗЕМНОВОДНОЕ С ПЯТИПАЛЬНЫМИ КОНЕЧНОСТЯМИ



КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ПЕРИОД (ОКОЛО 300 МЛН. ЛЕТ НАЗАД)






ГИГАНТСКИЕ СТРЕКОЗЫ




ПЕРВЫЕ РЕПТИЛИИ



- ▣ **Сеймурия – древнее пресмыкающееся**





ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ §

17

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ СТР.

26-27 № 96-101.