

ВИЧ-инфекция:

**наша жизнь
в условиях
пандемии**



Целевая группа – студенты. Причины?

- 1. Социальная активность**
- 2. Сексуальная активность**
- 3. Вероятные рискованные модели поведения**
- 4. Профессиональные риски**


Цели взаимодействия

1. Предоставление достоверной информации
2. Изменение поведения слушателей в сторону менее рискованного
3. Распространение полученной информации
4. Формирование толерантного отношения к ВИЧ (+) людям

Концепция ВОЗ (2001 г.)

Особенности развития ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С


1. Длительный инкубационный период
2. Длительный бессимптомный период
3. Невозможность постановки точного лабораторного диагноза сразу после инфицирования



Концепция ВОЗ (2001 г.)

Всемирная организация здравоохранения
в целях профилактики распространения
ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С

предлагает считать
всё население
условно инфицированным
ВИЧ-инфекцией
и гепатитами В и С.



ВИЧ-инфекция -

медленно развивающееся
инфекционное заболевание,
вызываемое

**Вирусом Иммунодефицита
Человека (ВИЧ)**

с поражением клеток
иммунной и нервной систем.
Передаётся только от человека
к человеку.



СПИД





СИНДРОМ ПРИБРЕТЕННОГО ИММУНО-

ДЕФИЦИТА - заключительная стадия ВИЧ-инфекции, развивается через **7-15** лет от момента заражения ВИЧ.


СПИД - необратимое поражение иммунитета с развитием тяжелых неизлечимых болезней, приводящих к смертельному исходу

Что такое вирус?

- Это микроорганизм, ведущий паразитарный образ жизни за счет клеток хозяина, в результате чего эти клетки погибают.
- В своем строении вирус имеет только генетический аппарат и белково-липидную оболочку с рецепторами.



Строение ВИЧ



- Вирус в диаметре не более 100 нм (молекула H_2O – 0,29 нм)
- Вирион – внутренняя частица содержит: геном вируса – 2 молекулы РНК, внутренние белки, 3 фермента: обратная транскриптаза (ревертаза), интеграза и протеаза, прочно связанные с капсидными белками p24, p7 и p9), нуклеокапсид, матрикс (основное содержимое)
- Наружная мембрана (суперкапсид) – двухслойная липидная оболочка
- Суперкапсид пронизан 72 гликопротетитиновыми шипами
- GP120 локализованы в выступающей части шипа и взаимодействуют с клетками CD4,

Стадии ВИЧ-инфекции

Инкубационный период – от момента заражения до **4-6** недель

ВИЗУАЛЬНО
ОПРЕДЕЛИТЬ ВИЧ-инфицированного
НЕВОЗМОЖНО

ДИАГНОСТИКА
в скрининге НЕВОЗМОЖНА

СТАДИЯ ОСТРОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ



- Бессимптомно – **80%**
- Симптомы - у менее **20%** заразившихся могут развиваться через **1-1,5 мес.** после заражения
- Недомогание, боли в суставах
- Повышение температуры
- Сыпи на коже
- Боли в горле
- Жидкий стул

Визуально определить заражённого невозможно

Диагностика возможна только через **2-3** месяца после заражения!

СТАДИЯ БЕССИМПТОМНОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ




- Начинается через год после заражения
- Отсутствие клинических проявлений, однако иммунитет медленно, но неуклонно снижается.
- Длится от **5** до **15** лет

ВИЗУАЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ
ВИЧ-инфицированного НЕВОЗМОЖНО

ДИАГНОСТИКА ДОСТОВЕРНА

СТАДИЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ



- Развивается через **5 -10** лет от момента заражения
- В начале стадии – кожные поражения, частые вирусно – бактериальные и грибковые заболевания, которые неплохо поддаются лечению

ВИЗУАЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ ЗАРАЖЁННОГО
НЕВОЗМОЖНО

ДИАГНОСТИКА ДОСТОВЕРНА

СТАДИЯ РАЗВЁРНУТЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ

- Через **10-12-15** лет после заражения
- Симптомы имеют выраженный, рецидивирующий характер
- По мере снижения иммунитета возникают тяжелые заболевания : туберкулез, токсоплазмоз, цитомегало-вирусная инфекция, онкозаболевания и др.
(30 нозологий)

При осмотре можно определить
наличие иммунодефицита

ДИАГНОСТИКА ДОСТОВЕРНА



СТАДИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ



- Последняя стадия ВИЧ-инфекции – **СПИД**, для неё характерны тяжелейшие заболевания, практически не поддающиеся терапии и приводящие к смерти.


**ВЫРАЖЕННЫЕ ПРИЗНАКИ
ИММУНОДЕФИЦИТА!!!**

СТАТИСТИКА ПО МИРУ



- БОЛЕЕ **76** МЛН. ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
- ИЗ НИХ **2,1** МЛН. ВЫЯВЛЕНЫ В **2016г.**
- ЕЖЕДНЕВНО ЗАРАЖАЕТСЯ ОКОЛО **20** ТЫС. ЧЕЛОВЕК
- УМЕРЛИ – БОЛЕЕ **41** МЛН.

Глобальная картина ВИЧ-инфекции



СТАТИСТИКА в РФ

Население России – **146** млн. чел.



Выявлено с диагнозом ВИЧ **более 1 500 000** человек

Ежедневно выявляется **270-300** чел.

ЕЖЕГОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
120 - 130 ТЫСЯЧ

УМЕРЛИ за период эпидемии
СВЫШЕ **250** ТЫСЯЧ

ЕЖЕГОДНО УМИРАЕТ ОТ ВИЧ/СПИДА
БОЛЕЕ **20** ТЫСЯЧ

Высокая пораженность ВИЧ-инфекцией (до **1%**
от популяции) зарегистрирована в **30**
крупных и экономически успешных регионах (где

СТАТИСТИКА в РФ

A photograph showing a woman in a purple patterned dress and a young child in a red shirt walking past a large blue billboard. The billboard has white text that reads: "ONE WAY TO STOP AIDS USE CONDOMS WHILE HAVING SEX". The woman is holding the child's hand. The background is a clear blue sky.

ONE
WAY TO
STOP
AIDS
USE CONDOMS
WHILE HAVING
SEX

Доклад ООН
по профилактике СПИДа
(ЮНЭЙДС) 2016г.: Россия -
**эпицентр эпидемии
ВИЧ.**

По данным экспертов,
РФ опередила по скорости
заражения печально
известные Танзанию,
Зимбабве, Мозамбик,
Уганду и Кению.

СТАТИСТИКА по ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

01.01.2017. - 3590

ВИЧ-инфицированных

Рост регистрации – 62% (2015 -2016 г.)

01.12.2017. –

4200 ВИЧ-инфицированных


Рост регистрации – 66% (аппг.)

Большинство заразившихся –
в возрасте от 15 до 40 лет.



ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫЕ

- ШКОЛЬНИКИ – **20**
- УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ – **2**
- УЧАЩИЕСЯ ПРОФУЧИЛИЩ – **11**
- УЧАЩИЕСЯ ТЕХНИКУМОВ – **14**
- СТУДЕНТЫ ВУЗОВ - **26**



СТАТИСТИКА в РФ

НА КАЖДОГО
ВЫЯВЛЕННОГО
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОГО
ЧЕЛОВЕКА ПРИХОДИТСЯ
от **3** до **5**
НЕВЫЯВЛЕННЫХ



ГДЕ присутствует ВИРУС?

ВИРУС ЕСТЬ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ ЗАРАЖЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.

слюна, моча, пот, слёзы –
единицы вирусов на **1** мл биосубстрата:

заражение при контакте невозможно

Концентрации вируса, ОПАСНЫЕ для заражения

- **КРОВЬ** – от сотен до миллионов вирусов в **1** мл
- **СПЕРМА** - сотни вирусов в **1** мл
- **ВАГИНАЛЬНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ** – сотни в **1** мл
- **ГРУДНОЕ МОЛОКО** – тысячи в **1** мл

3 ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ



**ПОЛОВОЙ
(ИНТИМНЫЕ
КОНТАКТЫ
БЕЗ ПРЕЗЕРВАТИВА
С ВИЧ-инфицированным
партнёром)**



**ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЙ
(ЧЕРЕЗ ЗАРАЖЁННУЮ
КРОВЬ)**



**ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
(ОТ МАТЕРИ К ПЛОДУ)**

ПОЛОВОЙ ПУТЬ ЗАРАЖЕНИЯ



через любые варианты
ИНТИМНЫХ КОНТАКТОВ

35% заражённых



ЗАЩИТА ОТ ВИЧ

- осознанное воздержание от интимных контактов
- дифференцированный выбор полового партнёра
- взаимная верность в паре
- **знать ВИЧ-статус свой и партнёра (обследование в паре)**
- **Правила использования презерватива**
 - при каждом половом контакте
 - правильно (инструкция)
 - срок годности
 - приобретать в аптеке (**t** режим)
 - цена

ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЙ ПУТЬ ЗАРАЖЕНИЯ



- при введении инъекционных наркотиков — около **60%** ВИЧ-инфицированных
- пирсинг и татуировки нестерильными инструментами (редко)

ЗАЩИТА ОТ ВИЧ



- **не применять наркотики, особенно внутривенно!**
- **для наркопотребителей: использовать всегда только индивидуальные одноразовые шприцы и все приспособления**

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПУТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ



- ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОЙ ЖЕНЩИНЫ - К РЕБЕНКУ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И КОРМЛЕНИЯ ГРУДНЫМ МОЛОКОМ

НЕВОЗМОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ



- В БЫТУ
- ПРИ УКУСАХ НАСЕКОМЫХ
- В БАССЕЙНЕ, КАФЕ, СПОРТЗАЛЕ, ТРАНСПОРТЕ, МАГАЗИНЕ И Т.Д.
- ПРИ ПОЦЕЛУЯХ И ОБЪЯТИЯХ ДАЖЕ С ЗАВЕДОМО ИНФИЦИРОВАННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ



- Существуют противовирусные препараты, **только** продлевающие жизнь ВИЧ-инфицированным пациентам

- Препаратов, **излечивающих** **полностью** - **нет.**



- Вакцины, предотвращающей заражение, **нет** и в ближайшее время **не ожидается.**

ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ



- МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ - **5 МЛ КРОВИ ИЗ ВЕНЫ.**
- В КРОВИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИСУТСТВИЕ АНТИТЕЛ К ВИЧ.
- АНТИТЕЛА В КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПОЯВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ **2-3** МЕСЯЦА ПОСЛЕ ЗАРАЖЕНИЯ
- ДО ЭТОГО АНАЛИЗ БУДЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ,
НО ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ЗАРАЗИТЬ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА
после собственного заражения!!!

Что делать при аварийной ситуации

- Аварийная ситуация – порез, укол, любая травма загрязнённым инструментом; попадание крови на слизистые глаз, рта, носа.
- Смыть кровь большим количеством воды (не тереть), обработать любым спиртосодержащим препаратом.
- Быстро обратиться в Центр СПИД для обследования и назначения противовирусных препаратов

ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 38
ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ
ДЛЯ ГРАЖДАН РФ БЕСПЛАТНО



ОБСЛЕДОВАНИЕ:

Центр СПИД

**Ярославль,
проспект Октября, д.71**

«горячая линия»

ВИЧ/СПИД

32 82 94

Поколение без ВИЧ
начинается с ТЕБЯ!



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!