

Красная книга Кубани

ЖИВОТНЫЕ, РЫБЫ И ПТИЦЫ

**Красная книга Кубани – это книга
в которую вносят редкие и
исчезающие
виды растений и животных
обитающих в нашем крае.**

**Красные книги бывают
разного уровня -
международные,
национальные и
региональные.**



ЖИВОТНЫЕ

Рысь

Отряд Хищные Семейство Кошачьи


- **Статус.** Редкий вид.
- **Краткое описание.** В Краснодарском крае обитает рысь кавказская – животное средних размеров с коротким туловищем и высокими ногами. мех грубый, низкий, рыжего цвета с ярким рисунком из чёрных пятен и полосок. Обитатель глухих лесов, встречается на безлесых склонах среди скал до 2500 м над уровнем моря. Охотится в сумерках и ночью. Питается грызунами, зайцами, нападает на косуль.
- **Распространение и среда обитания.** Встречается в горных районах, предпочитая лес с густым, труднопроходимым подлеском. Обитает на территории Северского, Абинского, Горячеключевского, Апшеронского, Туапсинского Мостовского, Лабинского, Отрадененского районов и в Кавказском государственном биосферном заповеднике.
- **Численность и тенденция её изменения.** Численность продолжает сокращаться.



Переднеазиатский леопард

Отряд Хищные Семейство Кошачьи

- **Статус.** Исчезающий вид.
- **Краткое описание.** Крупная кошка. Туловище сильно вытянутое, конечности низкие, Лицевой отдел головы сильно вытянутый. Уши невысокие, широко расставленные, округлые на вершинах. Волосяной покров низкий и мягкий. Основной цвет серовато – охристый (серовато – жёлтый). Пятна обычно буроватые, редкие. Летом мех светлее. Питается различными копытными и другими мелкими млекопитающими, птицами.
- **Распространение и среда обитания.** В субальпийском и альпийском поясах до 3500 м над уровнем моря могут попадаться особи из сопредельных районов.
- **Численность и тенденция её изменения.** В 1983 г. леопард отмечен на территории Головинского заказника и на хребте Аишхо.



ПТИЦЫ

Розовый пеликан

Отряд Веслоногие Семейство Пеликановые

- **Статус.** Вид находится под угрозой исчезновения.
- **Краткое описание.** Крупная птица с размахом крыла до 3 м и массой 8 – 11 кг. Оперение бледно - розовое. Маховые крылья чёрные с белыми стержнями. Вокруг глаз жёлтое кольцо. На голове хохолок из перьев. Все пальцы на коротких и сильных ногах жёлтого цвета соединены перепонками. Длина клюва до 60 см. Питается рыбой. Гнездится небольшими колониями в труднодоступных местах среди камыша. Гнездо сооружает из веток, сучьев, палок, травы и стеблей камыша. Откладывает яйца в мае. В кладке не более 3 белого цвета яиц с толстым известковым налётом. Насиживание 33 дня. Птенцы находятся с родителями 14 месяцев. Зимуют пеликаны в Индии, Иране, Египте, Турции, Болгарии.
- **Распространение и среда обитания.** В Краснодарском крае – в дельте Кубани, в Ахтарско – Гривенской системе лиманов.



Дрофа

Отряд Журавлеобразные Семейство Дрофиные

- **Статус.** Вид находится под угрозой исчезновения.
- **Краткое описание.** Крупная птица, масса до 11 – 12 кг. Оперение самца охристо – рыжее с поперечными чёрными полосами. Голова и пучки перьев – усы по бокам головы – пепельные. Самка меньше самца, у неё отсутствуют усы. Перелётная птица. Гнездится на открытых участках. В кладке 2 – 3 яйца. Насиживание около месяца. Воспитанием потомства занимаются самки. Самцы держатся отдельно, собравшись в небольшие табуны. Легко переносит низкую температуру, может доставать корм даже из – под снега, пока он не глубок. В суровые зимы улетает на южный берег Чёрного моря. Питается мелкими грызунам, ящерицами, насекомыми и их личинками, плодами, семенами, почками и другими съедобными частями травянистых и кустарниковых растений. В последнее время гнездится на посевах злаков, но из – за ранних сельскохозяйственных работ не успевает вывести потомство и воспитать птенцов.
- **Распространение и среда обитания.** В Краснодарском крае – в районах Азово – Кубанской низменности.



Кавказский тетерев

Отряд Курообразные Семейство Тетеревиные

- **Статус.** Редкий вид.
- **Краткое описание.** Похож на обыкновенного тетерева, но мельче, самец чёрной окраски с загнутыми вниз концами рулевых перьев. Самка бурая с чёрными поперечными полосами. Осёдлый вид. Гнёзда на земле. В кладке 5 – 6 яиц, которые самка насиживает в течение 25 дней. Питается растительной пищей: шишкоягодами можжевельника, почками берёзы, ягодами брусники, черники, водяники.
- **Распространение и среда обитания.** В Краснодарском крае населяет всю высокогорную его часть. Типичные местообитания – верхняя граница леса, субальпийские кустарники, высокогорные луга.



Чёрный аист

Отряд Аистообразные Семейство Аистовые

- **Статус.** Исчезающий вид.
- **Краткое описание.** Крупная, до 3 кг, птица, чёрного цвета, с белым брюхом, красным клювом и лапками. Перелётный вид. Гнёзда на скалах или на деревьях. Откладка яиц с начала апреля до середины мая. В кладке от 2 до 6 яиц (в среднем 4), длительности насиживания 32 – 38 дней. Питается земноводными, рыбами, водными беспозвоночными.
- **Распространение и среда обитания.** В Краснодарском крае – в равнинных и низкогорных лесах с пологими склонами, высокими скальными обрывами юго – восточной части, по долинам рек. В период миграций останавливается у различных водоёмов: озёр, лиманов, в равнинной части края у побережий Азовского и Чёрного морей.




Рыбы

Стерлядь

Отряд Осетрообразные Семейство Осетровые

- **Статус.** Исчезающий вид.
- **Краткое описание.** Речная рыба. Боковых жучек у стерляди более 50, нижняя губа прервана посередине. Самая мелкая рыба из осетровых. К 10 годам вырастает до 75 см и массы 1700 г. На зиму залегает в ямы, весной поднимается вверх по реке к месту икрометания. Нерест в апреле – мае на галечном грунте при температуре воды 10°C и выше. Плодовитость колеблется от 38 до 108 тыс. икринок. Питается личинками комаров, мелкими рыбами.
- **Распространение и среда обитания.** Река Кубань очень редко.




Осётр атлантический

Отряд Осетрообразные Семейство Осетровые

- **Статус.** Исчезающий вид.

- **Краткое описание.** Длина до 3,5 м, масса до 300 кг. Большую часть жизни проводит в морской воде. На нерест заходит в реки, поднимаясь от устья на 120 – 130 км. Икрометание при температуре воды от 8 до 22 °С. Клейкую икру откладывает на каменисто – галечный грунт в местах с быстрым течением. Плодовитость от 200 тыс до 6,7 мл икринок. Инкубация от 3 до 13 суток. Личинки на активное питание переходят при длине 16 – 18 мм. К осени молодь скатывается в море. Взрослые особи питаются мелкой рыбой, ракообразными. Миграции совершают небольшими группами или в одиночку.

- **Распространение и среда обитания.** В настоящее время единичные особи отмечены у побережья Краснодарского края. Предпочитает шельфовую зону.



Речной угорь

Отряд Осетрообразные Семейство Речные угри

- **Статус.** Редкий вид.
- **Краткое описание.** Тело змеевидно удлинённое, сжатое с боков в хвостовой части, покрыто мелкой чешуёй. Длина 50 - 100 см, масса до 6 кг. Размножается в Саргасовом море на глубине более 1000 м. В возрасте 3 лет входит в реку, где живёт 5 – 8 лет. Питаются мелкой рыбой, лягушками, ракообразными, моллюсками. Миграции совершают небольшими группами или в одиночку.
- **Распространение и среда обитания.** Чёрное и Азовское моря.

