

БОБР



Иванова Алёна
Михайловна




- ◎ **Обыкновенный бобр, или речной бобр** (лат. *Castor fiber*) — полуводное млекопитающее отряда грызунов.



Средней величины околотоводный зверь (длина тела 75-120 см), очень массивный, с плоским лопатообразным хвостом, покрытым роговыми щитками. Глаза и уши маленькие, между пальцами задних лап — плавательные перепонки. Окраска коричневая.

В крутых берегах строят норы, а там, где берега плоские — хатки из скрепленных илом сучьев высотой до 3-5 м с подводным входом. В местах с непостоянным уровнем воды строят плотины из стволов и веток, скрепленных илом и глиной.






В случае опасности ныряют, подав сигнал тревоги — громкий шлепок хвостом по воде.



Зимой активность бобров резко снижается, и они значительную часть времени проводят в полусне — дреме.

Для строительства и заготовки корма бобры валят деревья, подгрызая их у основания, отгрызают ветки, затем разделяют ствол на части. Ствол подгрызенного бобром дерева приобретает характерную форму «песочных часов».






Бобры
превосходно
плавают и ныряют.
Большие лёгкие и
печень
обеспечивают им
такие запасы
воздуха и
артериальной
крови, что под
водой бобры могут
остаться 10–15
минут, проплывая
за это время до
750 м. На суше
бобры довольно
неуклюжи.


Живут бобры поодиночке или семьями. Бобры строго растительноядны. Питаются они корой и побегами деревьев, предпочитая осину, иву, тополь и берёзу, а также различными травянистыми растениями.





- Потомство приносят 1 раз в год. Детёныши (1–6 в выводке) рождаются в апреле – мае. Они полузрячие, хорошо опушённые, весят в среднем 0,5 кг. Через 1–2 суток они уже могут плавать; мать обучает бобрят, буквально выталкивая их в подводный коридор. В возрасте 3–4 недель бобрята переходят на питание листьями и мягкими стеблями трав, но мать продолжает подкармливать их молоком до 3 месяцев. Подросток обычно ещё 2 года не покидает родителей.

Бобры издавна добываются ради своего красивого и прочного меха. Поваленные бобрами деревья служат кормом для зайцев и многих копытных, которые обгладывают кору со стволов и ветвей. Сок, вытекающий весной из подточенных деревьев, любят бабочки и муравьи, вслед за которыми появляются птицы.



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**

