

Ядовитые грибы Южного Урала



- **Выполнила**
- **ученица 3 «б» класса**
- **МБОУ школа 33**
- **Иванова Ксения**

БЛЕДНАЯ ПОГАНКА

Самый ядовитый пластинчатый гриб из рода мухомор. Шляпка зеленая или зеленоватая до белой, с белыми пластинками. Ножка с пленчатым кольцом и мешковидным влагалищем. Встречается в лиственных, реже хвойных лесах.



Бледная поганка.

МУХОМОР, род пластинчатых грибов порядка агариковых.

Плодовое тело молодых мухоморов заключено в т. н. покрывало, которое разрывается и остается в виде пленки или чешуек на поверхности шляпки.

Ок. 100 видов, распространены широко. Многие мухоморы ядовиты, особенно бледная поганка и красный мухомор.





Дождевик настоящий(Википедия)

Плодовые тела замкнутого строения, округлые, грушевидные, часто с хорошо выраженной ложной ножкой, мелкие или средних размеров.

В осеннюю пору дождевик может разбросать до нескольких миллиардов спор. Иногда их называют «волчьим табаком», «дедушкин табак» или порховками.



Свинушка тонкая – произрастает в лесах разного типа, чаще всего во влажных, тенистых местах, иногда даже на стволах деревьев. Свинушка встречается группами реже одиночно. Гриб опасен при регулярном многократном употреблении. Он относится к грибам, вызывающим образование в крови специфических антител (аглютининов). Длительное время свинушки считались условно съедобными грибами. Но после нескольких случаев смертельного отравления, в них был обнаружен яд мускарин, не разрушающийся при отваривании.



Часто в наших лесах встречаются и *ложные опята, род пластинчатых грибов*. Растут они, как и съедобные, тесными группами на пнях или около них. Шляпка ложноопёнка сначала выпуклая, потом полураспростёртая, в центре часто с бугром желтая, в центре более тёмная с красноватым или оранжевым оттенком. Серо-жёлтый опёнок имеет споры зеленоватого цвета, ложноопёнок кирпично-красный характеризуется тёмно-фиолетовым споровым порошком.

