



ПУШНОЕ ЖИВОТНОЕ

СОБОЛЬ

А.

СОСНОВСКАЯ Н.



МЕХ ПЫШНЫЙ, ШЕЛКОВИСТЫЙ, С БЛЕСТЯЩЕЙ ОСТЬЮ. ОБЩАЯ ОКРАСКА МЕХА ИЗМЕНЯЕТСЯ ОТ СВЕТЛОЙ ЖЕЛТОВАТО-БУРОЙ ДО ТЕМНОЙ ЧЕРНОВАТО-КОРИЧНЕВОЙ.

ДЛИНА ТЕЛА У СОВУЛЕИ
ПОДВЕРЖЕНА ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ
КОЛЕБАНИЯМ: У САМЦОВ ОНА
КОЛЕБЛЕТСЯ ОТ 40 ДО 56 СМ, У
САМОК — ОТ 35 ДО 47 СМ. ХВОСТ С
КОНЦЕВЫМИ ВОЛОСАМИ
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО РАВЕН $1/3$ ДЛИНЫ
ГОЛОВЫ И ТУЛОВИЩА И ЕДВА
ВЫДАЕТСЯ ЗА КОНЦЫ ВЫТЯНУТЫХ
ЗАДНИХ НОГ; ЧИСЛО ХВОСТОВЫХ
ПОЗВОНКОВ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 16.
ПОДОШВЫ ЛАП ПОКРЫТЫ ГУСТЫМИ,
ЖЕСТКИМИ ВОЛОСАМИ.



Соболь — зверок оседлый; лишь значительный неурожай кормов, пожары, рубка леса и другие подобные факторы вызывают его переселения.

НА УЧАСТКЕ ОБИТАНИЯ СОБОЛЬ
ПРОДЕЛЫВАЕТ ЗВЕЗДООБРАЗНО
РАСПОЛОЖЕННЫЕ СУТОЧНЫЕ ХОДЫ.
ЗИМОЙ СОБОЛЬ УДАЛЯЕТСЯ ОТ
ГНЕЗДА НА 2-3 КМ, ПРИЧЕМ КАЖДЫЙ
ЗИМНИЙ ВЫХОД, ЗВЕРКА
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОЛЬЦО С
ВОЗВРАЩЕНИЕМ К ГНЕЗДУ. РАЗМЕРЫ
УЧАСТКА ОБИТАНИЯ КАЖДОГО
СОБОЛЯ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ,
ЗАВИСЯТ ОТ КОРМОВЫХ УГ



Соболь питается как животной, так и растительной пищей.

В различные сезоны года видовой состав кормов изменяется. Круглогодичными кормами соболя являются различные виды мышевидных грызунов, обитающих в тайге. Дополнительными кормами в течение года служат белки, зайцы, куриные птицы и кедровые орехи (зимой). Летом состав кормов соболя разнообразнее, так как он поедает, кроме грызунов, яйца птиц и пресмыкающихся, различные ягоды. Особенно хорошо он ест бруснику и рябину.



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
СОБОЛЯ НЕИЗВЕСТНА. В ОДНОМ
ЗВЕРОСОВХОЗЕ САМКА В
ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ РОДИЛА ЕЩЕ
ДВУХ СОБОЛЯТ. ПРОЦЕСС ЛИНЬКИ
У СОБОЛЯ ИЗУЧЕН
НЕДОСТАТОЧНО. СЧИТАЕТСЯ, ЧТО
СОБОЛИ ЛИНЯЮТ ДВА РАЗА В
ГОД—ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ

Выделанные шкурки соболей употребляются для изготовления высокоценных меховых изделий — воротников, горжеток и головных уборов. Шкурки темной расцветки употребляются в натуральном виде. Шкурки светлой окраски обычно подкрашиваются под темные.



www.zooexpo.plJPG,
ferrettips.tumblr.comJPG,
mojafretka.blox.plJPG,
totallylegit.wordpress.comJPG,
vk.comJPG,
Fishing.kz