

Дизартрия.

Дизартрия — это нарушение членораздельной речи:

- нарушение звукопроизношения
- нарушение просодики

Дизартрия.

Обусловлена нарушением
иннервации речевого
аппарата.

Дизартрия.

Дизартрия — это симптом
органического поражения
ЦНС.

Дизартрия.

Дефекты при дизартрии:

- голосовые
- просодические
- артикуляционно-фонетические

Анартрия.

Анартрия — тяжелая степень дизартрии, когда речь почти невозможна.

Анартрия.

Причина анартрии:
- полный паралич
речедвигательных мышц.

Стёртая дизартрия.

Стертая дизартрия — это легкая
степень псевдобульбарной
дизартрии.

Стёртая дизартрия.

Проявляется преимущественно
в артикуляционно-
фонетических нарушениях.

Причины дизартрии:

- асфиксия родов
- родовая травма
- поражение нервной системы при гемолитической болезни
- инфекции нервной системы
- черепно-мозговые травмы
- нарушения мозгового кровообращения
- опухоли головного мозга

Смешанный характер дизартии.

Дизартрия часто сочетается с другими речевыми расстройствами:

- ЗРР
- ОНР
- моторная алалия
- заикание

Формы дизартрии.

- Бульбарная дизартрия
- Псевдобульбарная дизартрия
- Подкорковая дизартрия
- Мозжечковая дизартрия
- Кортиковая дизартрия

Клинические признаки дизартрии:

- Нарушение мышечного тонуса в речевой мускулатуре
- Ограниченная возможность произвольных артикуляционных движений из-за параличей и парезов мышц артикуляционного аппарата
- Нарушение голосообразования и дыхания

Симптомокомплекс при дизартрии.

Моторика

артикуляционного аппарата.

- Обдумывание позы
- Затруднено создание артикуляционной позы (вверх-вниз, влево-вправо)
- Снижена амплитуда движения (не в полном объеме)
- Не удерживает позу
- Нарушено переключение с одной позы на другую

Общий мышечный тонус.

- Спастический
- Паретический
- Дистония

Дыхание.

- Короткий вдох и выдох
- Короткий речевой выдох
- Нарушена согласованная работа отделов речевого аппарата

Голос.

- Глухой
- Низкий
- Нозализованный
- Сдавленный

Просодика.

- Темп речи нарушен:
- Брадилалия — замедленная речь
- Тахилалия — быстрая речь
- Ритм нарушен
- Интонация скудная

Звукопроизношение.

- Чаще наблюдается искажение звуков.
- Реже замены или отсутствие.
- Смешение звуков носит вторичный характер.

Легкая форма
псевдобульбарной дизартрии.

ЭТО СТЕРТАЯ ДИЗАРТРИЯ
(стертая форма дизартрии) —
чаще всего встречается в
нашей работе.

Легкая форма псевдобульбарной дизартрии.

Механизм её проявления и
признаки.

Легкая форма псевдобульбарной дизартрии.

Первопричина:
нарушение проводимости путей
черепно-мозговых нервов.

Легкая форма псевдобульбарной дизартрии.

В следствие этого нарушается
ОБЩАЯ МОТОРИКА:

- ТОНУС МЫШЦ
- координация движений
- скорость переключения

Легкая форма псевдобульбарной дизартрии.

Нарушается
МЕЛКАЯ МОТОРИКА:

- ТОНУС МЫШЦ
- осязание
- движения пальцев

Легкая форма псевдобульбарной дизартрии.

Нарушается
АРТИКУЛЯЦИОННАЯ МОТОРИКА:

- ТОНУС МЫШЦ
- ГИПЕРКИНЕЗЫ
- СИНКИНЕЗИИ

Легкая форма псевдобульбарной дизартрии.

Нарушается дыхание:

- короткий вдох и выдох
- короткий речевой выдох
- слюнотечение

Легкая форма псевдобульбарной дизартрии.

Вследствие всего
вышесказанного нарушается
звукопроизношение и
фонематический слух.