


§ Плоскость

1. Общее уравнение плоскости

ЗАДАЧА 1. Записать уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$, перпендикулярно вектору $\vec{N} = \{A, B, C\}$

Вектор, перпендикулярный плоскости, называют **нормальным вектором** этой плоскости.



Уравнения $(\bar{\mathbf{r}} - \bar{\mathbf{r}}_0, \bar{\mathbf{N}}) = 0$ (1*)

и $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ (1)

называют *уравнением плоскости, проходящей через точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$ перпендикулярно вектору $\bar{\mathbf{N}} = \{A, B, C\}$* (в векторной и координатной форме соответственно).

Уравнения $(\bar{\mathbf{r}}, \bar{\mathbf{N}}) + D = 0$ (2*)

и $Ax + By + Cz + D = 0$ (2)

называют *общим уравнением плоскости* (в векторной и координатной форме соответственно).

ВЫВОДЫ:


- 1) Плоскость является поверхностью первого порядка. В общем случае она задается уравнением $Ax + By + Cz + D = 0$, где A, B, C, D – числа.
- 2) Коэффициенты A, B, C не обращаются в ноль одновременно, так как с геометрической точки зрения это координаты вектора, перпендикулярного плоскости.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕГО УРАВНЕНИЯ ПЛОСКОСТИ

Если в уравнении $Ax + By + Cz + D = 0$ все коэффициенты A, B, C и D отличны от нуля, то уравнение называют **полным**; если хотя бы один из коэффициентов равен нулю – **неполным**.

1) Пусть общее уравнение плоскости – полное. Тогда его можно записать в виде $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ (3)

С геометрической точки зрения a, b и c – отрезки, отсекаемые плоскостью на координатных осях Ox , Oy и Oz соответственно. Уравнение (3) называют **уравнением плоскости в отрезках**.



2) Пусть в общем уравнении плоскости коэффициенты A , B и C – ненулевые, а $D = 0$, т.е. уравнение плоскости имеет вид


$$Ax + By + Cz = 0.$$

Такая плоскость проходит через начало координат $O(0;0;0)$

$\ell_1: By + Cz = 0$ (пересечение с плоскостью Oyz)

$\ell_2: Ax + Cz = 0$ (пересечение с плоскостью Oxz)

$\ell_3: Ax + By = 0$ (пересечение с плоскостью Oxy)




3) Пусть в общем уравнении плоскости один из коэффициентов A , B или C – нулевой, а $D \neq 0$, т.е. уравнение плоскости один из следующих трех видов:

а) $Ax + By + D = 0$ б) $Ax + Cz + D = 0$ в) $By + Cz + D = 0$.



Эти уравнения можно записать соответственно в виде

$$\text{а) } \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

а) плоскость отсекает на осях Ox и Oy отрезки a и b соответственно и параллельна оси Oz ;



- б) плоскость отсекает на осях Ox и Oz отрезки a и c соответственно и параллельна оси Oy ;
- в) плоскость отсекает на осях Oy и Oz отрезки b and c соответственно и параллельна оси Ox .




Вывод: плоскость, в уравнении которой отсутствует одна из координат, параллельна оси отсутствующей в уравнении координаты.

4) Пусть в уравнении плоскости (2) два из трех коэффициентов A , B или C – нулевые, а $D \neq 0$, т.е. уравнение плоскости имеет вид: а) $Ax + D = 0$ или б) $By + D = 0$ или в) $Cz + D = 0$.

Эти уравнения можно записать соответственно в виде:


$$\text{а) } \frac{x}{a} = -1$$

а) плоскость отсекает на оси Ox отрезок a и параллельна осям Oy и Oz (т.е. параллельна плоскости Oyz);




- б) плоскость отсекает на Oy отрезок b и параллельна осям Ox и Oz (т.е. параллельна плоскости Oxz);
- в) плоскость отсекает на Oz отрезок c и параллельна осям Ox и Oy (т.е. параллельна плоскости Oxy).

б) $\frac{y}{b} = 1$



в) $\frac{z}{c} = 1$






Вывод: плоскость, в уравнении которой отсутствуют две координаты, параллельна координатной плоскости, проходящей через оси отсутствующих в уравнении координат.

5) Пусть в общем уравнении плоскости (2) $D = 0$ и один из коэффициентов A , B или C тоже нулевой, т.е. уравнение плоскости имеет вид:

а) $Ax + By = 0$ или б) $Ax + Cz = 0$ или в) $By + Cz = 0$.

Вывод: Плоскость проходит через начало координат и ось отсутствующей в уравнении координаты.



6) Пусть в общем уравнении плоскости (2) три коэффициента равны нулю, т.е. уравнение плоскости имеет вид

$$\text{а) } Ax = 0 \quad \text{или} \quad \text{б) } By = 0 \quad \text{или} \quad \text{в) } Cz = 0.$$

Эти уравнения можно записать соответственно в виде:

а) $x = 0$ – уравнение координатной плоскости Oyz ;

б) $y = 0$ – уравнение координатной плоскости Oxz ,

в) $z = 0$ – уравнение координатной плоскости Oxy .

2. Другие формы записи уравнения плоскости

Другие формы записи:


Уравнение плоскости, проходящей через точку параллельно двум неколлинеарным векторам;

Уравнение плоскости, проходящей через три точки;

**Уравнение плоскости, проходящей через точку
параллельно двум неколлинеарным векторам**

ЗАДАЧА 2. Записать уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$, параллельно неколлинеарным векторам

$$\vec{r}_1 = \{m_1; n_1; p_1\} \text{ и } \vec{r}_2 = \{m_2; n_2; p_2\}$$



Уравнения

$$(\bar{\mathbf{r}} - \bar{\mathbf{r}}_0, \bar{\mathbf{p}}_1, \bar{\mathbf{p}}_2) = 0 \quad (4^*)$$


и

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ m_1 & n_1 & p_1 \\ m_2 & n_2 & p_2 \end{vmatrix} = 0 \quad (4)$$

называют **уравнениями плоскости, проходящей через точку параллельно двум неколлинеарным векторам** (в векторной и координатной форме соответственно).

Уравнение плоскости, проходящей через три точки, не лежащие на одной прямой – частный случай уравнения (4)

Пусть плоскость проходит через три точки $M_1(x_1; y_1; z_1)$, $M_2(x_2; y_2; z_2)$ и $M_3(x_3; y_3; z_3)$ не лежащие на одной прямой.



Уравнения $(\vec{r} - \vec{r}_1, \vec{r}_2 - \vec{r}_1, \vec{r}_3 - \vec{r}_1) = 0$ (5*)

и
$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$
 (5)

называют **уравнениями плоскости, проходящей через три точки** $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$ и $M_3(x_3, y_3, z_3)$ (в векторной и координатной форме соответственно).

3. Взаимное расположение плоскостей

В пространстве две плоскости могут:

а) быть параллельны, б) пересекаться.

Пусть плоскости λ_1 и λ_2 заданы общими уравнениями:

$$\lambda_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$


$$\lambda_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

Тогда:

$\overline{\mathbf{N}}_1 = \{A_1; B_1; C_1\}$ – нормаль к λ_1 ;

$\overline{\mathbf{N}}_2 = \{A_2; B_2; C_2\}$ – нормаль к λ_2 ;



1) Пусть плоскости параллельны:



Вывод: *плоскости λ_1 и λ_2 параллельны тогда и только тогда, когда в их общих уравнениях координаты нормальных векторов пропорциональны, т.е.*

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$$

2) Пусть плоскости пересекаются



$$\cos \psi_{1,2} = \pm \frac{|\overline{\mathbf{N}}_1, \overline{\mathbf{N}}_2|}{|\overline{\mathbf{N}}_1| \cdot |\overline{\mathbf{N}}_2|} = \pm \frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2|}{\sqrt{(A_1)^2 + (B_1)^2 + (C_1)^2} \cdot \sqrt{(A_2)^2 + (B_2)^2 + (C_2)^2}},$$

где знак плюс берется, когда надо найти величину острого угла, а знак минус – когда надо найти величину тупого угла.

Частный случай – **плоскости перпендикулярны**, т.е.

$$\psi_1 = \psi_2 = 90^\circ$$

$$\Rightarrow \cos \psi_1 = \cos \psi_2 = 0$$

$$\Rightarrow \cos \psi_{1,2} = \pm \frac{|\overline{\mathbf{N}}_1, \overline{\mathbf{N}}_2|}{|\overline{\mathbf{N}}_1| \cdot |\overline{\mathbf{N}}_2|} = 0$$

$$(\overline{\mathbf{N}}_1, \overline{\mathbf{N}}_2) = A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0$$

***(критерий перпендикулярности плоскостей,
заданных общими уравнениями)***


4. Расстояние от точки до плоскости

ЗАДАЧА 3. Пусть плоскость λ задана общим уравнением

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

$M_0(x_0; y_0; z_0)$ – точка, не принадлежащая плоскости λ .

Найти расстояние от точки M_0 до плоскости λ .



$$d = \frac{|(\bar{N}, \overline{M_1 M_0})|}{|\bar{N}|} = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

§ Прямая в пространстве

1. Уравнения прямой в пространстве

Пусть $A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$ и $A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$ – уравнения любых двух различных плоскостей, содержащих прямую ℓ . Тогда координаты любой точки прямой ℓ удовлетворяют одновременно обоим уравнениям, т.е. являются решениями системы


$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases} \quad (1)$$

Систему (1) называют **общими уравнениями прямой в пространстве**.

Другие формы записи уравнений прямой в пространстве – **ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ и КАНОНИЧЕСКИЕ** уравнения.

ЗАДАЧА 1. Записать уравнение прямой в пространстве, проходящей через точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$, параллельно вектору $\vec{p} = \{p_x; p_y; p_z\}$

Вектор, параллельный прямой в пространстве, называют **направляющим вектором** этой прямой.



Уравнение

$$\bar{\mathbf{r}} = \bar{\mathbf{r}}_0 + t\bar{\mathbf{d}}, \quad (2^*)$$

и систему уравнений

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cdot m, \\ y = y_0 + t \cdot n, \\ z = z_0 + t \cdot p. \end{cases} \quad (2)$$

называют **параметрическими уравнениями прямой в пространстве** (в векторной и координатной форме соответственно).


Уравнения

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p} \quad (3)$$

называют **каноническими уравнениями прямой в пространстве**.

Частным случаем канонических уравнений являются
**УРАВНЕНИЯ ПРЯМОЙ, ПРОХОДЯЩЕЙ ЧЕРЕЗ ДВЕ
ЗАДАННЫЕ ТОЧКИ.**

Пусть прямая проходит через точки $M_1(x_1, y_1, z_1)$ и $M_2(x_2, y_2, z_2)$.



Уравнения
$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1} \quad (4)$$

называют **уравнениями прямой, проходящей через две точки** $M_1(x_1, y_1, z_1)$ и $M_2(x_2, y_2, z_2)$.

2. Переход от общих уравнений прямой к каноническим

Пусть прямая ℓ задана общими уравнениями:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases} \quad (1)$$


Чтобы записать канонические (параметрические) уравнения этой прямой, необходимо найти ее направляющий вектор и координаты какой-нибудь точки $M_0(x_0; y_0; z_0)$ на прямой.

а) Координаты точки M_0 – это одно из решений системы (1).

б) Направляющий вектор

$$\bar{\Pi} = [\bar{\mathbf{N}}_1, \bar{\mathbf{N}}_2]$$

где $\bar{\mathbf{N}}_1 = \{A_1; B_1; C_1\}$ и $\bar{\mathbf{N}}_2 = \{A_2; B_2; C_2\}$ – нормальные векторы к плоскостям λ_1 и λ_2 , уравнения которых входят в общие уравнения прямой.



3. Взаимное расположение прямых в пространстве


В пространстве две прямые могут:

а) быть параллельны, б) пересекаться, в) скрещиваться.

Пусть прямые ℓ_1 и ℓ_2 заданы каноническими уравнениями:

$$\bar{\ell}_1: \frac{x_1}{m_1} = \frac{y_1}{n_1} = \frac{z_1}{p_1}, \quad \bar{\ell}_2: \frac{x_2}{m_2} = \frac{y_2}{n_2} = \frac{z_2}{p_2}.$$

1) Пусть прямые ℓ_1 и ℓ_2 параллельны:




Вывод: прямые параллельны $\Leftrightarrow$ их направляющие векторы $\bar{\ell}_1 = \{m_1; n_1; p_1\}$ и $\bar{\ell}_2 = \{m_2; n_2; p_2\}$ коллинеарные,

т.е. выполняется условие:

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}. \quad (6)$$

2) Пусть прямые ℓ_1 и ℓ_2 пересекаются:



$$(\overrightarrow{M_1M_2}, \vec{r}_1, \vec{r}_2) = 0, \quad (7^*)$$

Вывод: прямые ℓ_1 и ℓ_2 пересекаются $\Leftrightarrow$ они не параллельны и для них выполняется условие компланарности векторов (7*) или, в координатной форме,

$$\begin{vmatrix} x_1 - x_2 & y_1 - y_2 & z_1 - z_2 \\ m_1 & n_1 & p_1 \\ m_2 & n_2 & p_2 \end{vmatrix} = 0. \quad (7)$$

3) Если для прямых ℓ_1 и ℓ_2 не выполняется условие (6) и (7) ((7*)), то прямые скрещиваются.

4. Задачи, связанные с возможным взаимным расположением прямых

Возможное расположение прямых в пространстве приводит к следующим задачам:

- 1) параллельные прямые → расстояние между прямыми (т.е. расстояние от точки до прямой)?
- 2) пересекающиеся прямые → а) угол между прямыми?
б) точка пересечения прямых?
- 3) скрещивающиеся прямые → а) угол между прямыми?
б) расстояние между прямыми?

Пусть даны две прямые:


$$\Pi_1: \frac{x - x_1}{m_1} = \frac{y - y_1}{n_1} = \frac{z - z_1}{p_1} \quad \text{и} \quad \Pi_2: \frac{x - x_2}{m_2} = \frac{y - y_2}{n_2} = \frac{z - z_2}{p_2}.$$

$\vec{\Pi} = \{m_i; n_i; p_i\}$ – направляющий вектор прямой Π_i ,

$$M_i(x_i, y_i, z_i) \in \Pi_i \quad (i = 1, 2).$$

ЗАДАЧА 2. Найти угол между пересекающимися (скрещивающимися) прямыми в пространстве.

ОПР. Углом между двумя скрещивающимися прямыми ℓ_1 и ℓ_2 называется угол между прямой ℓ_1 и проекцией прямой ℓ_2 на любую плоскость, проходящую через прямую ℓ_1 .



Т.е., угол между скрещивающимися прямыми – это угол между двумя пересекающимися прямыми, параллельными данным:

$$\cos \varphi_{1,2} = \pm \frac{|(\bar{\ell}_1, \bar{\ell}_2)|}{|\bar{\ell}_1| \cdot |\bar{\ell}_2|} = \pm \frac{|m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}},$$

где знак плюс берется для острого угла, а знак минус – для тупого.


Пусть дана прямая $\bar{l}: \frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$ и $M_1(x_1, y_1, z_1)$ – точка, не принадлежащая этой прямой.

ЗАДАЧА 3. Найти расстояние от точки до прямой в

пространстве. Обозначим: $\bar{l} = \{m, n, p\}$ – направляющий вектор прямой $\bar{l}$,

$M_0(x_0, y_0, z_0)$ – точка на прямой $\bar{l}$,

d – расстояние от точки M_1 до $\bar{l}$.



$$d = \frac{|\left[\bar{l}, \overrightarrow{M_0M_1}\right]|}{|\bar{l}|}.$$


Пусть даны две скрещивающиеся прямые:

$$\ell_1: \frac{x-x_1}{m_1} = \frac{y-y_1}{n_1} = \frac{z-z_1}{p_1} \quad \text{и} \quad \ell_2: \frac{x-x_2}{m_2} = \frac{y-y_2}{n_2} = \frac{z-z_2}{p_2}.$$

$\vec{\ell}_i = \{m_i; n_i; p_i\}$ – направляющий вектор ℓ_i ,
 $M_i(x_i, y_i, z_i) \in \ell_i$


ЗАДАЧА 4. Найти расстояние между скрещивающимися прямыми.

ОПР. Расстоянием между двумя скрещивающимися прямыми называется длина их общего перпендикуляра.



$$d = \frac{|Ax_2 + By_2 + Cz_2 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

где $Ax + By + Cz + D = 0$ – общее уравнение плоскости λ ,
 $M_2(x_2; y_2; z_2)$ – любая точка на прямой ℓ_2 .



Тогда d – высота пирамиды (параллелепипеда), опущенная из точки M_2 .
Следовательно:

$$d = \frac{3 \cdot V_{d\check{c}\check{d}}}{S_{ini}} = \frac{3 \cdot \frac{1}{6} \cdot |(\bar{\square}, \bar{\square}_2, \overline{M_1 M_2})|}{\frac{1}{2} \cdot |[\bar{\square}, \bar{\square}_2]|} = \frac{|(\bar{\square}, \bar{\square}_2, \overline{M_1 M_2})|}{|[\bar{\square}, \bar{\square}_2]|}$$

Пусть даны две пересекающиеся прямые

$$\square_1: \frac{x - x_1}{m_1} = \frac{y - y_1}{n_1} = \frac{z - z_1}{p_1} \quad \text{и} \quad \square_2: \frac{x - x_2}{m_2} = \frac{y - y_2}{n_2} = \frac{z - z_2}{p_2}.$$

ЗАДАЧА 5. Найти точку пересечения прямых.

Пусть $M_0(x_0; y_0; z_0)$ – точка пересечения прямых. Тогда $(x_0; y_0; z_0)$ – решение системы уравнений

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{x - x_1}{m_1} = \frac{y - y_1}{n_1} = \frac{z - z_1}{p_1}, \\ \frac{x - x_2}{m_2} = \frac{y - y_2}{n_2} = \frac{z - z_2}{p_2}, \end{array} \right. \quad \text{или} \quad \left\{ \begin{array}{l} x = x_1 + t \cdot m_1, \\ y = y_1 + t \cdot n_1, \\ z = z_1 + t \cdot p_1, \\ x = x_2 + \tau \cdot m_2, \\ y = y_2 + \tau \cdot n_2, \\ z = z_2 + \tau \cdot p_2. \end{array} \right.$$

5. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве

Пусть в пространстве заданы плоскость λ и прямая ℓ . Они могут

- 1) быть параллельны;

- 2) прямая может лежать в плоскости;




- 3) прямая и плоскость могут пересекаться в одной

точке.

Пусть $\lambda: Ax + By + Cz + D = 0$ и $\ell: \frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$.

Тогда $\bar{\mathbf{N}} = \{A; B; C\}$ – нормальный вектор плоскости,

$\bar{\mathbf{r}} = \{m; n; p\}$ – направляющий вектор прямой.



а) Если прямая параллельна плоскости или прямая принадлежит плоскости, то

$$(\bar{N}, \bar{s}) = 0 \quad (10)$$

или в координатной форме

$$Am + Bn + Cp = 0. \quad (11)$$


Если условие (10) (условие (11)) не выполняется, то прямая и плоскость пересекаются в одной точке.

б) Если прямая принадлежит плоскости, то координаты любой ее точки удовлетворяют уравнению плоскости, и, следовательно, кроме условия (10) ((11)) выполняется условие

$$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0,$$


где $M_0(x_0; y_0; z_0)$ – любая точка прямой.

Частным случаем пересечения прямой и плоскости в одной точке является перпендикулярность прямой и плоскости



В этом случае $\vec{N} \parallel \vec{\boxed{N}}$ т.е. $\frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p}$.

ОПР. Углом между прямой ℓ и плоскостью λ называется угол φ между прямой ℓ и ее проекцией на плоскость λ .
Из определения следует, что угол между прямой и плоскостью всегда острый.



Следовательно,

$$\sin \varphi = \cos \psi = \frac{|(\bar{\mathbf{N}}, \bar{\boldsymbol{\ell}})|}{|\bar{\mathbf{N}}| \cdot |\bar{\boldsymbol{\ell}}|}$$