





Катетеризация мочевого пузыря



У женщин с помощью пинцета

Показания:

- острая задержка мочи, промывание мочевого пузыря и введение в него лекарственных препаратов, для взятия мочи на исследование.



Противопоказания:

- травмы органов мочевой системы, механическое препятствие самостоятельному выведению мочи (опухоли, камни) и др.



Оснащение:

- стерильный пинцет, стерильный катетер в упаковке, стерильный лоток, стерильные ватные шарики, тёплый раствор антисептика, стерильный глицерин, ёмкость для сбора мочи, ёмкость для использованного материала, перчатки, салфетки, клеёнка, пелёнка или одноразовая пелёнка.





- Информировать пациента о предстоящей процедуре, получить его согласие.
- Надеть перчатки.
- Помочь пациентке лечь на спину и раздвинуть ноги, согнув их в коленях, подстелить под пациентку клеёнку, сверху пелёнку.



- Раздвинуть 1 и 2 пальцами левой руки большие и малые половые губы, обнажив наружное отверстие мочеиспускательного отверстия.
- Обработать его стерильным раствором 00,2% фурацилина.
- Вскрыть пакет со стерильным катетером, осторожно поместить катетер в стерильный лоток, полить внутренний конец катетера глицерином.



- Правой рукой пинцетом взять катетер за внутренний конец на 5 - 6см от конца, наружный конец удерживать между 4 и 5 пальцами.
- левой рукой раздвинуть большие и малые половые губы.
- Ввести катетер в мочеиспускательный канал на 3 – 5см, опустить катетер в ёмкость для сбора мочи.



- Извлечь катетер по окончании выделения мочи.
- Придать пациентке удобное положение, поправить постель, укрыть.
- Отнести использованный материал, снять перчатки, вымыть руки.
- Сделать отметку о выполнении процедуры в медицинской карте.

Проблемы:

- инфицирование мочевой системы;
- травмирование и кровотечение;
- НЕВОЗМОЖНОСТЬ введения катетера (камни, опухоли).



Последовательность действий при катетеризации женщины



Обработка уретры
антисептиком



Обработка катетера
стерильным глицерином



Введение катетера



Извлечение катетера



Запомните!

- 1. Если при ведении катетера ощущается препятствие, не пытайтесь преодолеть его насильственно, так как это может вызвать повреждение слизистой оболочки мочеиспускательного канала.
- 2. Строго соблюдайте правила асептики и антисептики чтобы не инфицировать мочевыводящие пути.